

Estadística Inferencial

Capítulo VIII - Ejercicio 21

Aaric Llerena Medina

Una empresa de cerveza tiene tres fábricas, una en Cusco, otra en Arequipa y una en Alemania. El 40 % de la cerveza es producida en la fábrica de Cusco, el 50 % en la de Arequipa y el resto en la de Alemania. La cantidad de cerveza en cada botella es una variable aleatoria X , que para la fábrica de Cusco se distribuye normal con media 620 mililitros y una desviación estándar de 3 mililitros, para la fábrica de Arequipa se distribuye normal con media 623 mililitros y una desviación estándar de 5 mililitros, mientras que para la fábrica de Alemania se distribuye normal con media 621 mililitros y una desviación estándar de 3.5 mililitros.

Se rechaza una cerveza que tenga menos de 615 mililitros o más de 630 mililitros.

- ¿Con qué probabilidad es rechazada una botella de cerveza?
- Calcule la probabilidad de que en 50 cajas de cerveza, menos de 40 botellas sean rechazadas.

Solución:

La cantidad de cerveza en cada botella es una variable aleatoria X , cuya distribución depende de la fábrica:

- **Cusco:** $X \sim (620, 3^2)$.
- **Arequipa:** $X \sim (623, 5^2)$
- **Alemania:** $X \sim (621, 3.5^2)$

- La probabilidad de rechazo $P(R)$ se calcula usando el teorema de la probabilidad total:

$$P(R) = P(R | \text{Cusco}) \cdot P(\text{Cusco}) + P(R | \text{Arequipa}) \cdot P(\text{Arequipa}) + P(R | \text{Alemania}) \cdot P(\text{Alemania})$$

Donde:

- $P(\text{Cusco}) = 0.40$.
- $P(\text{Arequipa}) = 0.50$.
- $P(\text{Alemania}) = 0.10$.

Ahora, se calcula $P(R | \text{Fábrica})$ para cada fábrica:

■ **Cusco:**

$$P(R \mid \text{Cusco}) = P(X < 615 \mid \text{Cusco}) + P(X > 630 \mid \text{Cusco})$$

Estandarizando:

- Para $X = 615$:

$$Z = \frac{615 - 620}{3} = \frac{-5}{3} \approx -1.67$$

- Para $X = 630$:

$$Z = \frac{630 - 620}{3} = \frac{10}{3} \approx 3.33$$

Usando la tabla de la distribución normal estándar:

- $P(Z < -1.67) \approx 0.0475$.
- $P(Z > 3.33) \approx 1 - 0.9996 = 0.0004$.

Por lo tanto:

$$P(R \mid \text{Cusco}) = 0.0475 + 0.0004 = 0.0479$$

■ **Arequipa:**

$$P(R \mid \text{Arequipa}) = P(X < 615 \mid \text{Arequipa}) + P(X > 630 \mid \text{Arequipa})$$

Estandarizando:

- Para $X = 615$:

$$Z = \frac{615 - 623}{5} = \frac{-8}{5} = -1.6$$

- Para $X = 630$:

$$Z = \frac{630 - 623}{5} = \frac{7}{5} = 1.4$$

Usando la tabla de la distribución normal estándar:

- $P(Z < -1.6) \approx 0.0548$.
- $P(Z > 1.4) \approx 1 - 0.9192 = 0.0808$.

Por lo tanto:

$$P(R \mid \text{Arequipa}) = 0.0548 + 0.0808 = 0.1356$$

■ **Alemania:**

$$P(R \mid \text{Alemania}) = P(X < 615 \mid \text{Alemania}) + P(X > 630 \mid \text{Alemania})$$

Estandarizando:

- Para $X = 615$:

$$Z = \frac{615 - 621}{3.5} = \frac{-6}{3.5} \approx -1.71$$

- Para $X = 630$:

$$Z = \frac{630 - 621}{3.5} = \frac{9}{3.5} \approx 2.57$$

Usando la tabla de la distribución normal estándar:

- $P(Z < -1.71) \approx 0.0436$.
- $P(Z > 2.57) \approx 1 - 0.9949 = 0.0051$.

Por lo tanto:

$$P(R \mid \text{Alemania}) = 0.0436 + 0.0051 = 0.0487$$

Sustituyendo en la fórmula de la probabilidad total:

$$P(R) = 0.0479 \times 0.40 + 0.1356 \times 0.50 + 0.0487 \times 0.10 = 0.09183$$

Por lo tanto, La probabilidad de que una botella de cerveza sea rechazada es aproximadamente 0.09183.

- b) Sea Y el número de botellas rechazadas en 50 cajas. Dado que cada caja contiene una botella, Y sigue una distribución binomial ($n = 50, p = 0.0919$). Dado que n es grande y p es pequeño, aproximamos esta distribución por una normal con:

- **Media:** $\mu_Y = n \cdot p = 50 \times 0.09183 = 4.5915$.
- **Varianza:** $\sigma_Y^2 = n \cdot p \cdot (1 - p) = 50 \times 0.0919 \times 0.9081 \approx 4.17$.
- **Desviación estándar:** $\sigma_Y = \sqrt{4.17} \approx 2.04$.

Se busca calcular $P(Y < 40)$ y estandarizando, se obtiene:

$$P(Y < 40) \approx P\left(Z < \frac{40 - 4.5915}{2.04}\right) = P\left(Z < \frac{35.4085}{2.04}\right) \approx P(Z < 17.36)$$

Usando la tabla de la distribución normal estándar:

$$P(Z < 17.36) \approx 1$$

La probabilidad de que en 50 cajas se rechacen menos de 40 botellas es prácticamente 1.