Doppelspalt und Quantenphysik

Einzelphotonen, Einzelelektronen, Superposition, Welcher-Weg, Komplementarität

Das können Sie nach diesem Skript

– den Aufbau des Quanten-Doppelspalts beschreiben
– das Auftreten einzelner Treffer und das entstehende Muster deuten
– Superposition und Wahrscheinlichkeitsinterpretation erklären
– Welcher-Weg-Information als Ursache des Interferenzverlusts begründen

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Klassisch: zwei Wellen 3
2 Quanten: ein Quant nach dem anderen 3
3 Superposition und Wahrscheinlichkeit 3
4 Welcher-Weg-Information 4
5 Unbestimmtheit 4
6 Aufgaben 5
7 Typische Fehler 6
8 Wiederholung 6

1 Klassisch: zwei Wellen

Beim Doppelspalt überlagern sich die Feldstärken beider Spalte. Die Intensität ist $I = |E_1 + E_2|^2$, also

$$I(\alpha) = I_0 \cos^2\left(\frac{\pi d \sin(\alpha)}{\lambda}\right) \tag{1}$$

Die Minima liegen bei $\Delta s = (2n+1)\lambda/2$. Das ist Wellenoptik, kein Quantenproblem.




Abbildung 1: Klassische Intensitätsverteilung: äquidistante Maxima, dazwischen Nullstellen.

Die Kurve fällt vom Zentralmaximum zu den Nullstellen bei $\Delta s = (2n+1)\lambda/2$ ab; die Lage der Maxima hängt nur vom Verhältnis d/λ ab.

2 Quanten: ein Quant nach dem anderen

Experiment

Aufbau. Lichtquelle so stark gedämpft, dass im Mittel nur ein Photon gleichzeitig unterwegs ist; Detektor (CCD/ Photomultiplier) registriert einzelne Treffer.

Durchführung. Treffer über längere Zeit aufsummieren, anschließend Elektronen dasselbe.

Beobachtung.

- Jeder Treffer ist ein **Punkt** – ganzzahlig, nicht verschmiert.
- Nach wenigen Treffern: kein Muster erkennbar.
- Nach Tausenden Treffern: das bekannte Streifenmuster.

Erklärung. Jedes Quant hat eine Wahrscheinlichkeitsverteilung; die Verteilung ist das Muster, der einzelne Treffer ist unvorhersagbar.

Bedeutung. Interferenz ist keine Folge vieler Quanten untereinander, sondern Eigenschaft des einzelnen Quants.

Achtung – typische Fehlerquelle

Das Muster entsteht **nicht**, weil sich Photonen gegenseitig stören. Es entsteht auch mit einzelnen Quanten. Wer „Interferenz = Wechselwirkung zwischen Wellen“ sagt, verfehlt den Punkt.

3 Superposition und Wahrscheinlichkeit

Der Zustand „durch Spalt 1 oder Spalt 2“ wird als Summe der beiden Möglichkeiten beschrieben:

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1 + \psi_2) \tag{2}$$

Die Wahrscheinlichkeitsdichte ist das Betragsquadrat:

$$P(x) = |\psi(x)|^2 = \frac{1}{2}\,|\psi_1 + \psi_2|^2 \tag{3}$$

Merksatz
Amplituden addieren sich, Wahrscheinlichkeiten nicht. Der Mischterm $2\mathfrak{R}(\psi_1^* \psi_2)$ erzeugt die Streifen – er verschwindet, sobald man weiß, welcher Weg genommen wurde.

4 Welcher-Weg-Information

Wird an den Spalten gemessen, durch welchen Spalt das Quant ging, verschwindet das Muster:

Messung	Zustand	Muster
keine Weginformation	$\psi_1 + \psi_2$	Streifen
Weg bekannt (Detektor, Polarisator)	entweder ψ_1 oder ψ_2	keine Streifen
Information gelöscht (Quantenradierer)	$\psi_1 + \psi_2$ wieder	Streifen kehren zurück

Definition
Komplementarität: Wellen- und Teilchenverhalten schließen sich nicht aus, aber sie sind nicht gleichzeitig vollständig beobachtbar. Je mehr Weginformation, desto weniger Interferenzkontrast – quantitativ $V^2 + D^2 \leq 1$ mit Visibilität V und Unterscheidbarkeit D.

5 Unbestimmtheit

Ort und Impuls sind keine gleichzeitig scharfen Größen:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi} \tag{4}$$




Abbildung 2: Wellenpaket: Je schmaler der Ort, desto breiter die Impulsverteilung. Das ist keine Messungenauigkeit, sondern Eigenschaft des Zustands.

Im Bild ist das Wellenpaket schmal im Ort und breit im Impuls; verkleinert man die Ortsbreite, wird die Impulsverteilung breiter.




Abbildung 3: Wellenfunktion und Betragsquadrat: Nur $|\psi|^2$ ist messbar (Aufenthaltswahr scheinlichkeit).

Die obere Kurve ist die Wellenfunktion selbst, die untere ihr Betragsquadrat; nur die untere gibt an, wo das Teilchen mit welcher Wahrscheinlichkeit gefunden wird.

Achtung – typische Fehlerquelle
Δx ist die **Streuung** der Messwerte bei vielen gleichen Präparationen, nicht der Fehler eines einzelnen Experiments. „Das Elektron ist unbestimmt“ heißt: Es hat keinen scharfen Ort – nicht: „wir wissen ihn nur nicht“.

6 Aufgaben

Aufgabe 1 10 P.

Ein Doppelspalt ($d = 1{,}0\ \mu\text{m}$) wird mit einzelnen Photonen ($\lambda = 633\ \text{nm}$) beleuchtet, Schirmabstand $e = 1{,}0\ \text{m}$.

1. Berechnen Sie den Streifenabstand.
2. Nach 100 Treffern ist kein Muster zu sehen. Erklären Sie.

Lösung

(1) $a = \frac{\lambda e}{d} = \frac{633 \cdot 10^{-9} \cdot 1{,}0}{1{,}0 \cdot 10^{-6}} = 0{,}63\ \text{mm}$.

(2) Die Treffer sind statistisch verteilt; um 0,63 mm Struktur von der Zufallsstreuung zu unterscheiden, braucht man viele Treffer. Bei 100 Treffern verteilen sich im Mittel etwa 5 auf ein Maximum – zu wenig für ein erkennbares Bild.

Aufgabe 2 12 P.

Ein Quantenradierer-Aufbau wird so verändert, dass eine Polarisationsmessung an den Spalten möglich ist.

1. Beschreiben Sie die Beobachtung.
2. Erklären Sie sie mit dem Superpositionsprinzip.
3. Beurteilen Sie die Aussage: „Die Messung stört das Quant.“

Lösung

(1) Die Streifen verschwinden; es bleibt eine breite Verteilung ohne Modulation.

(2) Mit Polarisationsmarkierung sind die beiden Möglichkeiten unterscheidbar, also $\psi = \psi_1 + \psi_2$ geht in ein Gemisch über; der Mischterm und damit die Streifen fallen weg.

(3) Die Formulierung ist zu grob. Die Messung muss das Quant nicht „anstoßen“; es genügt, dass die Weginformation im Prinzip verfügbar ist. Wird sie durch einen Quantenradierer wieder gelöscht, kehren die Streifen zurück.

7 Typische Fehler

Fehler	Richtig
„Photonen stören sich gegenseitig“	Interferenz tritt auch bei einzelnen Quanten auf
Wahrscheinlichkeiten addieren	Amplituden addieren, dann Betragsquadrat
Unbestimmtheit als Messfehler	Streuung des Zustands, nicht Gerätefehler
Wegmessung „zerstört“ das Quant	Weginformation macht die Möglichkeiten unterscheidbar

8 Wiederholung

Kern	Aussage
Einzeltreffer	punktuell, unvorhersagbar
Muster	Wahrscheinlichkeitsverteilung vieler Quanten
Superposition	$\psi_1 + \psi_2$, Amplituden addieren
Messbar	$\lvert\psi\rvert^2$
Welcher-Weg	Information vorhanden $\rightarrow$ keine Streifen
Komplementarität	$V^2 + D^2 \leq 1$
Unbestimmtheit	$\Delta x \cdot \Delta p \geq h/(4\pi)$

Verstehen, nicht auswendig: warum einzelne Treffer und ein Muster zusammenpassen; warum Weginformation die Streifen löscht, ohne das Quant zu „treffen“.

Quellen.
- Unterrichtsmaterialien Gymnasium Westerstede: https://www.physik.gym-wst.de, Jahrgang 12/13.
- Kerncurriculum Physik Niedersachsen 2022 (https://cuvo.nibis.de/).
- Grafiken: eigene Erstellung (`build/make_figures.py`).