Spektren und Franck-Hertz

Linienspektren, Termschema, Röntgen, Franck-Hertz-Versuch

Das können Sie nach diesem Skript

– Spektrenarten unterscheiden
– Linien aus einem Termschema berechnen (längste, kürzeste, Ionisation)
– die Franck-Hertz-Kurve auswerten
– Anregung durch Photonen und durch Elektronen abgrenzen

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Spektrenarten . . . 3
2 Energieniveaus lesen . . . 3
3 Röntgenspektrum . . . 4
4 Resonanzabsorption und Fluoreszenz . . . 4
5 Franck-Hertz-Versuch . . . 4
6 Aufgaben . . . 5
7 Typische Fehler . . . 6
8 Wiederholung . . . 6

1 Spektrenarten

Typ	Entstehung	Aussehen
kontinuierlich	thermische Strahlung, Glühkörper	alle Wellenlängen
Emissionslinien	angeregte Atome leuchten	einzelne helle Linien
Absorptionslinien	weißes Licht durch kaltes Gas	dunkle Linien auf Kontinuum
Bandspektren	Moleküle	breite Banden

Merksatz
Linienspektren sind der direkteste Beweis für diskrete Energieniveaus: Nur die Differenzen $E_m - E_n$ sind als Photonen zugänglich.

2 Energieniveaus lesen

Das Termschema ist ein Energie-Lineal. Nach oben (Richtung $E = 0$) wird der Abstand zwischen den Niveaus kleiner; $E = 0$ ist die Ionisationsgrenze.




Abbildung 1: Wasserstoff: Pfeile nach unten sind Emissionen. Eingezeichnet sind vier Balmer-Linien ($n = 2$ als Ziel) und die Lyman-α-Linie $2 \to 1$.

Die eingezeichneten Pfeile enden bei $n = 2$; ihre Länge ist die Photonenenergie, und je kürzer der Pfeil, desto größer die Wellenlänge.

Frage im Abitur	Vorgehen
Energie des Photons	$\Delta E = \lvert E_m - E_n \rvert$
Wellenlänge	$\lambda = 1239{,}8 \text{ eV nm } / \Delta E_{[\text{eV}]}$
längste Wellenlänge	kleinster Sprung, also benachbarte Niveaus
kürzeste Wellenlänge einer Serie	größter Sprung innerhalb der Serie, Startniveau $n \to \infty$ bzw. oberstes gegebenes
Ionisationsenergie	Energie von n bis $E = 0$
Anregungsenergie	Energie vom Grundzustand bis zum Zielniveau
Seriengrenze	$\lambda_{\text{min}} = 1239{,}8 / \lvert E_{\text{Ziel}} \rvert$

Herleitung

Balmerformel aus dem Termschema

1. Rydberg-Formel mit $n > m$:
$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right) \tag{1}$$
2. Für $m = 2$ (Balmer) und $n = 3$:
$$\frac{1}{\lambda} = R \cdot \frac{5}{36} \quad \Rightarrow \quad \lambda = 656\ \text{nm} \quad (\text{H-alpha, rot}) \tag{2}$$
3. Seriengrenze $n \to \infty$:
$$\frac{1}{\lambda} = \frac{R}{4} \quad \Rightarrow \quad \lambda = 364{,}6\ \text{nm} \tag{3}$$

Achtung – typische Fehlerquelle

Seriengrenze und Ionisationsgrenze sind verschieden: Die Seriengrenze gehört zur Serie (Ziel m fest, Start $n \to \infty$), die Ionisationsgrenze zum Grundzustand ($n = 1 \to \infty$).

3 Röntgenspektrum

Bestandteil	Ursache
Bremsspektrum (kontinuierlich)	Abbremsung der Elektronen, $eU_B = hc/\lambda_{\min}$
charakteristische Linien	Übergänge in den inneren Schalen des Anodenmaterials

$$\lambda_{\min} = \frac{hc}{eU_B} = \frac{1239{,}8\ \text{eV nm}}{U_B} \tag{4}$$

Mit der Moseley-Beziehung $\sqrt{f} \sim (Z - 1)$ lässt sich das Anodenmaterial bestimmen.

4 Resonanzabsorption und Fluoreszenz

Ein Gas absorbiert genau die Wellenlängen, die es auch emittieren kann (Energieerhaltung, Resonanz). Fluoreszenz: Absorption im UV, Emission sichtbar – die Emission hat **kleinere** Energie, weil ein Teil als Wärme abgegeben wird (Stokes-Verschiebung).

5 Franck-Hertz-Versuch

Experiment

Aufbau. Evakuierte Röhre mit Hg-Dampf (oder Ne), Glühkathode, beschleunigende Gitter- spannung U, Gegenfeld U_G zwischen Gitter und Auffänger, Amperemeter.
Durchführung. U von 0 auf 30 V erhöhen, Strom I messen.
Beobachtung. Im idealisierten Modell fällt I bei 4,9 V, 9,8 V, 14,7 V … wieder ab (Periodizität $\Delta U \approx 4{,}9$ V); im realen Versuch verschiebt die Kontaktspannung die Minima auf 10,4 V, 15,3 V, 20,2 V … – der Abstand bleibt 4,9 V. Bei Ne leuchtet das Gas in einer orangeroten Schicht.
Erklärung. Elektronen geben bei Stößen genau $\Delta E = e \cdot 4{,}9$ V an Hg-Atome ab; ihre Restenergie reicht nicht mehr über das Gegenfeld. Nach dem Stoß beginnt die Beschleunigung erneut – daher die Periodizität.
Bedeutung. Direkter Nachweis diskreter Anregungsenergien ohne Spektroskopie.




Abbildung 2: Franck-Hertz-Kurve (idealisiert, ohne Kontaktspannung): Der Abstand der Minima ist die Anregungsspannung $\Delta U \approx 4{,}9$ V.

Im idealisierten Modell liegen die Minima bei 4,9 V, 9,8 V und 14,7 V; mit der Kontaktspannung $U_\mathrm{K} \approx 5{,}5$ V erscheinen sie bei 10,4 V, 15,3 V und 20,2 V. Der konstante Abstand ist der Beweis, dass die Atome nur feste Energiebeträge aufnehmen.

Herleitung

Anregungsenergie und Emissionswellenlänge

1. Minima liegen bei $U_n = n \cdot \Delta U + U_\mathrm{K}$ (U_K: Kontaktspannung).
2. Also U_n gegen n auftragen: Steigung ΔU, Achsenabschnitt U_K.
3. Anregungsenergie $\Delta E = e \cdot \Delta U = 4{,}90$ eV.
4. Die beim Zurückfallen emittierte Wellenlänge:

$$\lambda = \frac{1239{,}8}{4{,}90} = 253 \text{ nm} \tag{5}$$

5. Diese UV-Linie ist bei Hg bekannt – die Bestätigung, dass Elektronenstöße dieselben Niveaus anregen wie Photonen.

Anregung durch	Bedingung
Photonen	$hf = \Delta E$ exakt; kein Überschuss möglich
Elektronen	kinetische Energie $\geq \Delta E$; Überschuss bleibt als E_kin

6 Aufgaben

Aufgabe 1 12 P.

Die Franck-Hertz-Kurve mit Quecksilber zeigt Minima bei 10,4 V, 15,3 V, 20,2 V und 25,1 V.

1. Bestimmen Sie Anregungsspannung und Kontaktspannung.
2. Berechnen Sie die Wellenlänge der emittierten Strahlung.
3. Erklären Sie, warum das Gas beim Versuch leuchtet.

Lösung

(1) U_n gegen n: Steigung 4,90 V, Achsenabschnitt 5,50 V. Also $\Delta U = 4{,}90$ V (Anregung) und $U_\mathrm{K} = 5{,}50$ V (Kontaktspannung).

(2) $\Delta E = 4{,}90$ eV, $\lambda = 1239{,}8/4{,}90 = 253$ nm – die bekannte Hg-UV-Linie.

(3) Ein Teil der Hg-Atome wird durch Stöße angeregt und fällt unter Emission sichtbarer Linien zurück. Bei Neon ist das Leuchten besonders auffällig, weil viele der anschließenden Übergänge im Sichtbaren liegen; dort sieht man die Leuchtschicht direkt.

Aufgabe 2 10 P.

Ein Wasserstoffgas wird mit weißem Licht durchstrahlt.

1. Skizzieren Sie das beobachtete Spektrum.
2. Berechnen Sie die Grenzwellenlänge der Lyman-Serie.
3. Begründen Sie, warum die Balmer-Linien schwächer sind.

Lösung

(1) Kontinuierliches Spektrum mit dunklen Linien bei 121,6 nm, 102,6 nm … (Lyman) und 656 nm, 486 nm … (Balmer).

(2) Seriengrenze $n \to \infty$: $\Delta E = 13{,}6$ eV, $\lambda = 1239{,}8/13{,}6 = 91{,}2$ nm.

(3) Im Grundzustand sind die Atome meist in $n = 1$; Übergänge nach $n = 2$ verlangen bereits angeregte Atome. Daher sind Balmer-Absorptionen bei Raumtemperatur schwach.

7 Typische Fehler

Fehler	Richtig
Seriengrenze = Ionisationsgrenze	Serie: Ziel m fest, Start $n \to \infty$
Energie in eV und Wellenlänge in m ohne Umrechnung	λ in nm mit $hc = 1239{,}8$
„Franck-Hertz zeigt, dass Elektronen Wellen sind“	er zeigt diskrete Anregungsenergien
Minimaabstand als Kontaktspannung gedeutet	Achsenabschnitt ist U_K, Steigung ΔU
Absorptionslinien als hell beschrieben	Absorption = dunkle Linien

8 Wiederholung

Kern	Formel / Aussage
Photonenenergie aus λ	$E = 1239{,}8\ \text{eV nm}\ /\lambda$
Übergang	$\Delta E = E_m - E_n$
Seriengrenze	$\lambda_\text{min} = 1239{,}8/\ \lvert E_\text{Ziel}\rvert$
Röntgengrenze	$\lambda_\text{min} = 1239{,}8/U_B$
Franck-Hertz	$U_n = n\Delta U + U_\mathrm{K}$
Anregungsenergie	$\Delta E = e\Delta U$
Photon oder Elektron	Photon exakt, Elektron mindestens ΔE

Verstehen, nicht auswendig: warum die Minima periodisch sind; warum die Emission langwelliger als die Absorption sein kann; warum Linien diskret sind.

Prüfungsrelevanz

Das musst du können:

- **erklären**, wie Emissions-, Absorptions- und kontinuierliche Spektren entstehen;
- **erklären**, warum der Franck-Hertz-Strom periodische Einbrüche zeigt;
- **berechnen**: Übergangsenergie, Wellenlänge, Seriengrenze und λ_min im Röntgenspektrum;
- **begründen**, warum die Linien diskret sind und die Bremsstrahlung kontinuierlich;
- **skizzieren**: Franck-Hertz-Kurve und Röntgenspektrum mit Grenzwellenlänge.

Quellen.

- Unterrichtsmaterialien Gymnasium Westerstede: https://www.physik.gym-wst.de, Jahrgang 13.
- Kerncurriculum Physik Niedersachsen 2022 (https://cuvo.nibis.de/).
- CODATA 2018; Rydberg-Konstante $R = 1{,}097 \cdot 10^{7}$ 1/m.