STOA

PIEDS OPTIMAUX

PROTOCOLE PRATIQUE



TOUS LES JOURS - 10 MIN

- Étirement des orteils
- Mollet et soléaire
- Levées et écartement des orteils
- Pied court

3 FOIS PAR SEMAINE

- Serviette et élévations du talon
- Cheville en quatre directions
- Coquille et équilibre sur un pied

Mouvement lent. Aucune douleur vive. Pas d'aggravation le lendemain.

STOA

Libérer les tissus



01 ÉTIREMENT DES ORTEILS

2 x 30 s / pied - tous les jours

1. Assis, posez la cheville sur le genou opposé.
2. Ramenez les orteils vers le tibia, surtout le gros orteil.
3. Sentez la tension sous la voûte sans provoquer de douleur vive.






02 MOLLET ET SOLÉAIRE


2 x 30 s / position

1. Face au mur, reculez une jambe et gardez le talon au sol.
2. Genou arrière tendu : étirez le mollet.
3. Genou arrière fléchi : étirez le soléaire.

STOA

Réveiller les orteils





03 LEVÉES D'ORTEILS

2 x 10 / variante

1. Gardez talon et avant-pied au sol.
2. Levez le gros orteil en laissant les quatre autres au sol.
3. Inversez : gros orteil au sol, quatre autres levés.



04 ÉCARTEMENT ACTIF

2 x 10 - maintien 5 s

1. Posez les orteils à plat, sans les recroqueviller.
2. Écartez-les en éventail ; éloignez le gros orteil du deuxième.
3. Aidez le mouvement avec les doigts si nécessaire.




05 PIED COURT

3 x 20 s / pied

1. Gardez au sol le talon et la base du premier et du cinquième orteil.
2. Rapprochez l'avant-pied du talon sans plier les orteils.
3. La voûte se soulève ; relâchez lentement.

STOA

Renforcer le pied



06 FROISSEMENT DE SERVIETTE

2 x 45 s / pied - 3 fois / semaine

1. Posez une serviette à plat et gardez le talon stable.
2. Ramenez-la vers vous avec les orteils.
3. Relâchez complètement entre chaque prise ; arrêtez si une crampe apparaît.





07 ÉLÉVATION DU TALON

3 x 8 à 15 - 3 fois / semaine

1. Gardez la base du gros et du petit orteil en contact.
2. Montez lentement sans basculer sur le bord externe.
3. Progressez : deux jambes, une jambe, puis sur une marche.




08 AUTO-MASSAGE À LA BALLE


60 à 90 s / pied - pression modérée

1. Placez une balle souple sous la voûte.
2. Roulez lentement du talon vers l'avant-pied.
3. Évitez toute zone douloureuse, engourdie ou inflammatoire.

STOA

Stabiliser la chaîne







09 CHEVILLE : 4 DIRECTIONS

2 x 12 / direction - 3 fois / semaine

1. Placez l'élastique autour de l'avant-pied.
2. Tirez vers vous, poussez, tournez dedans puis dehors.
3. Gardez le genou immobile et contrôlez le retour.





10 COQUILLE

2 x 12 à 15 / côté

1. Allongez-vous sur le côté, genoux fléchis, pieds joints.
2. Ouvrez le genou du dessus sans rouler le bassin en arrière.
3. Progressez avec un élastique léger au-dessus des genoux.



11 ÉQUILIBRE TRIPODE

3 x 30 à 45 s / pied

1. Ancrez talon, base du gros orteil et base du petit orteil.
2. Tenez sur une jambe sans agripper le sol avec les orteils.
3. Progressez avec de petits squats ou un support légèrement instable.

STOA

Séparateurs d'orteils



SILICONE OU LAINE

1. Choisissez un séparateur en silicone ou en laine.
2. Le silicone écarte mieux les orteils, se lave facilement et coûte généralement moins cher.
3. La laine existe aussi : elle est plus chère et moins efficace car elle se comprime et se déplace davantage.
4. Commencez 10 à 15 minutes au repos.
5. Ajoutez 5 à 10 minutes tous les 3 à 4 jours si la peau et la sensibilité restent normales.
6. Ne dormez pas avec et ne l'utilisez pas pendant le sport.
7. Retirez-le si douleur, engourdissement, frottement ou changement de couleur.

Progression sur 8 semaines

1-2 — **MOBILITÉ ET CONTRÔLE**

Routine quotidienne. Renforcement 2 fois par semaine. Séparateurs 10 à 20 min.

3-4 — **VOÛTE ET APPUI**

Renforcement 3 fois par semaine. Pied court debout. Équilibre sur une jambe.

5-6 — **FORCE**

Élévations sur une jambe. Élastique plus ferme. Séparateurs jusqu'à 45 à 60 min si tolérés.

7-8 — **INTÉGRATION**

Marche lente avec appui tripode. Maintenez la routine qui améliore réellement vos symptômes.