

## 4.12.6

AI25BTECH11001 - ABHISEK MOHAPATRA

September 21, 2025

$$|G| = \begin{vmatrix} \|\mathbf{a}\|^2 & \mathbf{a}^\top \mathbf{b} & \mathbf{a}^\top \mathbf{c} \\ \mathbf{b}^\top \mathbf{a} & \|\mathbf{b}\|^2 & \mathbf{b}^\top \mathbf{c} \\ \mathbf{c}^\top \mathbf{a} & \mathbf{c}^\top \mathbf{b} & \|\mathbf{c}\|^2 \end{vmatrix} \quad (1)$$

$$= \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 \|\mathbf{c}\|^2 \left( 1 - (\cos \alpha)^2 - (\cos \beta)^2 - (\cos \gamma)^2 + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma \right) \quad (2)$$

$$= \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 \|\mathbf{c}\|^2 \left( \begin{array}{c} 1 - (\cos \alpha)^2 - (\cos \beta)^2 + (\cos \alpha)^2 (\cos \beta)^2 \\ - (\cos \alpha)^2 (\cos \beta)^2 + (\cos \gamma)^2 - 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma \end{array} \right) \quad (3)$$

$$= \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 \|\mathbf{c}\|^2 \left( \begin{array}{c} 1 - (\cos \alpha)^2 - (\cos \beta)^2 \left( 1 - (\cos \alpha)^2 \right) \\ - (\cos \alpha \cos \beta - \cos \gamma)^2 \end{array} \right) \quad (4)$$

$$\leq \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 \|\mathbf{c}\|^2 \quad (5)$$

$$\implies \left(1 - (\cos \alpha)^2 - (\cos \beta)^2 \left(1 - (\cos \alpha)^2\right) - (\cos \alpha \cos \beta - \cos \gamma)^2\right) \leq 1 \quad (6)$$

$$\implies \left((\cos \alpha)^2 + (\cos \beta)^2 \left(1 - (\cos \alpha)^2\right) + (\cos \alpha \cos \beta - \cos \gamma)^2\right) \geq 0 \quad (7)$$

Equality holds when,

$$\cos \alpha = 0, \cos \beta = 0, \cos \alpha \cos \beta - \cos \gamma = 0 \quad (8)$$

Or,

$$\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = 0 \quad (9)$$

Hence  $\mathbf{a}^\top \mathbf{b} = \mathbf{b}^\top \mathbf{c} = \mathbf{c}^\top \mathbf{a} = 0$  to hold equality.