

2.10.48

EE25BTECH11019 - Darji Vivek M.

Question:

If $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1$ and $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{j} - \mathbf{k}$, then \mathbf{b} is

(a) $\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$

(c) \mathbf{i}

(b) $2\mathbf{j} - \mathbf{k}$

(d) $2\mathbf{i}$

Solution:

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (1)$$

Dot product condition:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = x + y + z = 1 \quad (2)$$

Cross product:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \end{vmatrix} \quad (3)$$

$$= (z - y)\mathbf{i} + (x - z)\mathbf{j} + (y - x)\mathbf{k} \quad (4)$$

Comparing with $\mathbf{j} - \mathbf{k}$:

$$z - y = 0 \implies z = y \quad (5)$$

$$x - z = 1 \implies x = z + 1 \quad (6)$$

$$y - x = -1 \implies y = x - 1 \quad (7)$$

Hence $z = y = x - 1$. Substituting in dot product:

$$x + y + z = x + (x - 1) + (x - 1) = 3x - 2 = 1 \quad (8)$$

$$\implies x = 1, y = z = 0 \quad (9)$$

Thus,

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{i} \quad (10)$$

Hence the answer is option (c).

Vectors a and b with coordinates




Fig. 4.1: plot