

12.339

Bhargav - EE25BTECH11013

October 2, 2025

Question

Question:

If

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \quad (1)$$

then

$$\det(-\mathbf{A}^2 + 7\mathbf{A} - 3\mathbf{I}) \quad (2)$$

is

Solution

The characteristic equation of matrix **A** is

$$f(\lambda) = |\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = 0 \quad (3)$$

$$\left| \begin{pmatrix} 3 - \lambda & -3 \\ -3 & 4 - \lambda \end{pmatrix} \right| = 0 \quad (4)$$

$$\implies (3 - \lambda)(4 - \lambda) - 9 = 0 \quad (5)$$

$$-\lambda^2 + 7\lambda - 3 = 0 \quad (6)$$

According to Cayley-Hamilton Theorem:

$$f(\lambda) = f(\mathbf{A}) \quad (7)$$

$$\therefore -\mathbf{A}^2 + 7\mathbf{A} - 3\mathbf{I} = 0 \quad (8)$$

$$\therefore \left| -\mathbf{A}^2 + 7\mathbf{A} - 3\mathbf{I} \right| = 0 \quad (9)$$

```
#include <stdio.h>

double det(double *mat) {
    return mat[0]*mat[3] - mat[1]*mat[2];
}
```

```
import numpy as np
import ctypes
lib = ctypes.CDLL("./libcode.so")
lib.det.argtypes = [ctypes.POINTER(ctypes.c_double)]
lib.det.restype = ctypes.c_double

A = np.array([[3, -3],
              [-3, 4]], dtype=np.float64)

I = np.eye(2, dtype=np.float64)
expr = -A @ A + 7*A - 3*I
mat_flat = expr.flatten()
det_value = lib.det(mat_flat.ctypes.data_as(ctypes.POINTER(ctypes.c_double)))
print("Matrix  $(-A^2 + 7A - 3I)$ :\n", expr)
print("Determinant =", det_value)
```

Python Code

```
import numpy as np
A = np.array([[3, -3],
              [-3, 4]])
I = np.eye(2)

expr = -A @ A + 7*A - 3*I

det_value = np.linalg.det(expr)

print("Matrix A:\n", A)
print("Matrix  $(-A^2 + 7A - 3I)$ :\n", expr)
print("Determinant =", det_value)
```