

1.11.9

AI25BTECH11007

Question:

If

$$\mathbf{a} = \hat{i} - 7\hat{j} + 7\hat{k} \quad \text{and} \quad \mathbf{b} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k},$$

find a unit vector perpendicular to both the vectors \mathbf{a} and \mathbf{b} .

Solution:

We have

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{n} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

We require

$$\mathbf{a}^T \mathbf{n} = 0, \tag{0.1}$$

$$\mathbf{b}^T \mathbf{n} = 0. \tag{0.2}$$

This leads to the system

$$\begin{bmatrix} 1 & -7 & 7 \\ 3 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Step 1: Augmented matrix

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -7 & 7 & 0 \\ 3 & -2 & 2 & 0 \end{array} \right].$$

Step 2: Row operations

$$R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1 : \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -7 & 7 & 0 \\ 0 & 19 & -19 & 0 \end{array} \right], \tag{0.3}$$

$$R_2 \rightarrow \frac{1}{19}R_2 : \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -7 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right], \tag{0.4}$$

$$R_1 \rightarrow R_1 + 7R_2 : \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right]. \tag{0.5}$$

Step 3: Solution

From the reduced system,

$$x = 0, \tag{0.6}$$

$$y - z = 0 \quad \Rightarrow \quad y = z. \tag{0.7}$$

Hence the general solution is

$$\mathbf{n} = t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Step 4: Unit vector

The norm is

$$\left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Thus the unit vectors are

$$\hat{n} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vectors \mathbf{a} (red), \mathbf{b} (blue), and unit normal \hat{n} (green)




Fig. 0.1: Image Visual