

Question 2.10.29

AI25BTECH11040 - Vivaan Parashar

September 17, 2025

1 Question:

The volume of the parallelopiped whose sides are given by $OA = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$, $OB = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$, $OC = 3\mathbf{i} - \mathbf{k}$, is

2 Solution:

To find the volume of the parallelopiped, we can use the Gram matrix formula:

$$V = \sqrt{\det(\mathbf{G})} \quad (1)$$

$$\mathbf{OA} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{OB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{OC} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$(3)$$

We define the Gram matrix \mathbf{G} as:

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} \mathbf{OA}^T \mathbf{OA} & \mathbf{OA}^T \mathbf{OB} & \mathbf{OA}^T \mathbf{OC} \\ \mathbf{OB}^T \mathbf{OA} & \mathbf{OB}^T \mathbf{OB} & \mathbf{OB}^T \mathbf{OC} \\ \mathbf{OC}^T \mathbf{OA} & \mathbf{OC}^T \mathbf{OB} & \mathbf{OC}^T \mathbf{OC} \end{pmatrix} \quad (4)$$

Calculating the dot products:

$$\mathbf{OA}^T \mathbf{OA} = 8, \quad \mathbf{OA}^T \mathbf{OB} = 0, \quad \mathbf{OA}^T \mathbf{OC} = 6 \quad (5)$$

$$\mathbf{OB}^T \mathbf{OB} = 3, \quad \mathbf{OB}^T \mathbf{OC} = 4 \quad (6)$$

$$\mathbf{OC}^T \mathbf{OC} = 10 \quad (7)$$

The Gram matrix \mathbf{G} becomes:

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & 4 \\ 6 & 4 & 10 \end{pmatrix} \quad (8)$$

Therefore, $V = \sqrt{|\det(\mathbf{G})|} = \sqrt{4} = 2$.

3 Plot:




Figure 1: Parallelopiped formed by vectors \mathbf{OA} , \mathbf{OB} and \mathbf{OC}