

12.872

Harsha-EE25BTECH11026

October 11,2025

# Question

Let  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$  and  $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ . For  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$  to be solvable, which one of the following options is the correct condition on  $b_1, b_2$ , and  $b_3$ .

①  $b_1 + b_2 + b_3 = 1$

③  $b_1 + 3b_2 + b_3 = 2$

②  $3b_1 + b_2 + 2b_3 = 0$

④  $b_1 + b_2 + b_3 = 2$

# Theoretical solution

Given,

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \quad (1)$$

Multiplying  $\mathbf{A}^\top$  on both sides,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ 10 & 19 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} b_1 + b_2 - 2b_3 \\ b_1 + 3b_2 - 3b_3 \end{pmatrix} \quad (3)$$

# Theoretical solution

Forming the augmented matrix,

$$\left( \begin{array}{cc|c} 6 & 10 & b_1 + b_2 - 2b_3 \\ 10 & 19 & b_1 + 3b_2 - 3b_3 \end{array} \right) \xleftrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - \frac{5}{3}R_1} \left( \begin{array}{cc|c} 6 & 10 & b_1 + b_2 - 2b_3 \\ 0 & \frac{7}{3} & -\frac{2}{3}b_1 + \frac{4}{3}b_2 + \frac{1}{3}b_3 \end{array} \right) \quad (4)$$

$$\xleftrightarrow[R_1 \leftarrow R_1 - 10R_2]{R_2 \leftarrow \frac{3}{7}R_2} \left( \begin{array}{cc|c} 6 & 0 & \frac{27}{7}b_1 - \frac{33}{7}b_2 - \frac{24}{7}b_3 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{7}b_1 + \frac{4}{7}b_2 + \frac{1}{7}b_3 \end{array} \right) \xleftrightarrow{R_1 \leftarrow \frac{1}{6}R_1} \quad (5)$$

$$\left( \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{9}{14}b_1 - \frac{11}{14}b_2 - \frac{4}{7}b_3 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{7}b_1 + \frac{4}{7}b_2 + \frac{1}{7}b_3 \end{array} \right) \quad (6)$$

# Theoretical solution

$$\therefore \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{14}b_1 - \frac{11}{14}b_2 - \frac{4}{7}b_3 \\ -\frac{2}{7}b_1 + \frac{4}{7}b_2 + \frac{1}{7}b_3 \end{pmatrix} \quad (7)$$

From (1),

$$x_1 + x_2 = b_1 \Rightarrow \frac{9}{14}b_1 - \frac{11}{14}b_2 - \frac{4}{7}b_3 + \left(-\frac{2}{7}b_1 + \frac{4}{7}b_2 + \frac{1}{7}b_3\right) = b_1 \quad (8)$$

$$\therefore 3b_1 + b_2 + 2b_3 = 0 \quad (9)$$