



د.عبدالرحمن الصائغ
استشاري جراحة السمنة والمناظير
Dr.Abdulrahman Alsaigh
Bariatric surgeon

مرض

الارتجاع المعدي المريئي

Gastroesophageal Reflux Disease

نظرة عامة

يحدث مرض الارتجاع المعدي المريئي عندما يرجع حمض المعدة إلى المريء مسببًا الشعور بالحرقان. ويُعرف هذا الارتجاع اختصارًا بالارتجاع المريئي ، وقد يُهَيِّج بطانة المريء.

يعاني الكثير من الناس من ارتجاع حمض المعدة من حين لآخر. ولكن، عندما يتكرر الارتجاع الحمضي مع مرور الوقت، فقد يُسبب مرض الارتجاع المريئي.

يستطيع معظم الناس السيطرة على مرض الارتجاع المريئي من خلال تغيير نمط الحياة وتناول الأدوية. وقد يحتاج البعض إلى جراحة بالمنظار لتخفيف الأعراض.



إذا كنت تعاني من ارتجاع الحمض ليلاً، فقد تعاني أيضاً مما يلي:

- سعال مستمر.
- التهاب الأحبال الصوتية، المعروف باسم التهاب الحنجرة.
- ظهور أعراض جديدة أو تفاقم أعراض الربو.



- ١/ الارتجاع الوظيفي (بسبب القلق ، التوتر)
- ٢/ الارتجاع العضوي (فتق بالحجاب الحاجز ، ارتخاء صمام المرئ السفلي)

متى يجب زيارة الطبيب؟

اطلب المساعدة الطبية فوراً إذا كنت تعاني من ألم في الصدر، خاصةً إذا كنت تعاني أيضاً من ضيق في التنفس، أو ألم في الفك أو الذراع. قد تكون هذه أعراضاً لنوبة قلبية.

تعاني من أعراض الحموضة وارتجاع المريء الحادة أو المتكررة. تتناول أدوية الحرقان التي تُصرف بدون وصفة طبية أكثر من مرتين أسبوعياً.

الأعراض

- تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:
- حرقان في الصدر يحدث عادةً بعد تناول الطعام وقد يزداد في الليل أو عند الاستلقاء.
 - ارتجاع الطعام أو حمض المعدة إلى الحلق.
 - ألم في أعلى البطن أو الصدر.
 - عسر البلع.
 - الشعور بوجود كتلة في الحلق.

الأَسباب

يحدث ارتجاع المريء نتيجة رجوع حمض المعدة أو محتويات المعدة غير الحمضية بشكل متكرر.

عند البلع، ترتخي عضلة دائرية أسفل المريء للسماح للطعام والسوائل بالتدفق إلى المعدة. ثم تنغلق العضلة العاصرة مرة أخرى.

إذا لم ترتخي العضلة العاصرة بشكل طبيعي أو ضعفت، فقد يرجع حمض المعدة إلى المريء. هذا الرجوع المستمر للحمض يُهيّج بطانة المريء، مما يؤدي غالبًا إلى التهابها.



عوامل الخطر

تشمل الحالات التي قد تزيد من خطر الإصابة بارتجاع المريء ما يلي:

- السمنة
- بروز الجزء العلوي من المعدة فوق الحجاب الحاجز، والمعروف باسم فتق الحجاب الحاجز.
- الحمل
- اضطرابات النسيج الضام، مثل تصلب الجلد.
- تأخر إفراغ المعدة.

تشمل العوامل التي قد تُفاقم ارتجاع المريء ما يلي:

- التدخين
- تناول وجبات سريعة أو تناول الطعام في وقت متأخر ليلاً .
- تناول بعض الأطعمة، مثل الأطعمة الدهنية أو المقلية.
- شرب مشروبات معينة، مثل الكحول أو القهوة باستمرار.
- تناول أدوية معينة، مثل الأسبرين.



المضاعفات

- التهاب المريء
- قرحة المعدة
- متلازمة باريت ؛ من ارتجاع المريء.
- ضيق المريء

نصائح بعد العلاج الجراحي

- ١/ تفادي الإمساك المزمن
- ٢/ تفادي الكحة المزمنة
- ٣/ عدم حمل الأوزان الكبيرة
- ٤/ عدم مزاولة الرياضات العنيفة

نمط الحياة والعلاجات المنزلية:

- الحفاظ على وزن صحي
- الإقلاع عن التدخين
- رفع رأس السرير
- البدء بالنوم على الجانب الأيسر
- عدم الاستلقاء بعد تناول الطعام
- تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا
- تجنب تناول الأطعمة والمشروبات التي تُسبب الارتجاع.
- تجنب ارتداء الملابس الضيقة.

التشخيص

- صورة أشعة سينية مع الباريوم
- منظار المريء
- فحص تركيز الحموضة
- قياس حركة المريء

العلاج

١/العلاج بالأدوية والإجراءات الأخرى :

- مضادات الحموضة البسيطة
- حاصرات مستقبلات الهيستامين H₂
- مثبطات مضخة البروتون
- تمارين التنفس العميق

٢/العلاج بالجراحة :

- عملية لف المعدة مع اصلاح فتق الحجاب الحاجز إن وجد
- جهاز لينكس
- عملية لف المعدة عبر الفم بدون جراحة عندما يكون فتق الحجاب الحاجز صغير

نصائح لتخفيف الأعراض

أجر بعض التغييرات في نمط حياتك، مثل:

تجنب الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام
تناول الطعام قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات
قسّم وجباتك إلى وجبات صغيرة موزعة على مدار اليوم
تجنب ارتداء الملابس الضيقة
ارفع مستوى رأسك في السرير بمقدار ١٥-٢٠ سم

الطب البديل

قد يُنصح ببعض العلاجات التكميلية والبديلة، مثل الزنجبيل والبابونج والدردار الزلق، لعلاج الارتجاع المريئي. مع ذلك، لم يثبت علميًا فعالية أي منها في علاج الارتجاع المريئي أو تلف المريء. استشر طبيبًا إذا كنت تفكر في تجربة علاجات بديلة لعلاج الارتجاع المريئي.

الوقاية

- تجنب الأطعمة والمشروبات التي تُسبب الشعور بالحرقان
- الإقلاع عن التدخين
- الحفاظ على وزن طبيعي



أسئلة شائعة

● متى يُعتبر الارتجاع المريئي حالة طبية؟

عندما يستمر الارتجاع والحرقان لمدة يومين أو أكثر في الأسبوع، أو بشكل حاد لأكثر من يوم واحد في الأسبوع

● هل يُعالج شرب الحليب الارتجاع المريئي؟

قد يُخفف شرب الحليب من الحرقان في البداية، لكن تأثيره مؤقت، ويؤدي لاحقًا إلى تحفيز إفراز أحماض المعدة، خاصةً إذا كان الحليب كامل الدسم.

● هل يُخفف تناول الخيار من الحرقان؟

لا يوجد دليل علمي، لكن الخيار ليس مُهَيِّجًا، وهذا يعتمد على التجربة الشخصية - فبعض المرضى يجدونه مفيدًا والبعض الآخر لا يجد فيه فائدة

● هل ارتداء المشدّات يُسبب ارتجاع المريء وحرقة المعدة؟

نعم - بالنسبة لمن هم معرضين للإصابة به أو لديهم أكثر من عامل خطوره

مفاهيم خاطئة

❌ لا ضرر من الاستمرار في تناول مضادات الحموضة دون وصفة طبية.

-لا يُنصح بتناول مضادات الحموضة لأكثر من أسبوعين دون استشارة طبية. يجب على قسم التشخيص الصحي تقييم الحالة لتحديد السبب، إن وُجد، وعلاجه.

❌ ارتجاع المريء عند الحوامل ناتج عن نمو شعر الجنين:

- الحقيقة: يحدث ارتجاع المريء عند الحوامل بسبب عدة عوامل، منها: زيادة هرمون الحمل الذي يُرخي عضلات المعدة نمو الرحم الذي يضغط على المعدة ويُسبب الحرقان. شعر الجنين ليس له علاقة بذلك.

❌ التدخين يُخفف حموضة المعدة:

-الحقيقة: التدخين أحد الأسباب الرئيسية لأمراض المعدة والمريء، ولا يُخفف الحرقان. كما أن النيكوتين يسبب ارتخاء عضلات المعدة.

DR.ABDULRAHMAN
ALSAIGH ©

Gastroesophageal
Reflux Disease

شكرا
لـ

THANK YOU