

GUIDE OFFICIEL DE PREVENTION SANTE - BURKINA FASO (2026)

Source : Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique / OMS

1. PREVENTION DU PALUDISME

Le paludisme est une maladie causée par un parasite transmis par les piqûres de moustiques infectés (An).

Symptômes fréquents : Fièvre intense, maux de tête, frissons, vomissements et douleurs articulaires.

Comment l'éviter :

- Dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MILDA).
- Assainir le cadre de vie en éliminant les flaques d'eau stagnante où les moustiques se reproduisent.
- Porter des vêtements couvrants à la tombée de la nuit.

Traitement : En cas de fièvre, se rendre immédiatement dans un Centre de Santé et de Promotion Sociale

2. PREVENTION DE LA DENGUE

La dengue est une infection virale transmise par les moustiques de type Aedes (qui piquent surtout le jour)

Symptômes fréquents : Forte fièvre d'apparition brutale, douleurs derrière les yeux, courbatures sévères (s)

Comment l'éviter :

- Éliminer les gîtes larvaires : vider les vieux pneus, les canaris non couverts, et les boîtes de conserve cor
- Utiliser des répulsifs cutanés et des serpentins anti-moustiques.
- Placer des moustiquaires aux portes et fenêtres.

Traitement : Il n'existe pas de traitement spécifique antiviral. Il faut beaucoup s'hydrater et prendre du para

3. NUTRITION DE LA FEMME ENCEINTE ET DE L'ENFANT

Nutrition de la femme enceinte :

- Consommer des aliments riches en fer (viande, haricots, feuilles vertes comme le moringa) pour éviter l'a
- Prendre systématiquement les suppléments de fer et d'acide folique lors des consultations prénatales (C

Nutrition de l'enfant :

- Allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. L'eau n'est pas nécessaire, le lait maternel suffit.
- A partir de 6 mois, introduire progressivement des bouillies enrichies (farine misola, pâte d'arachide, pour

4. ANNUAIRE DES URGENCES

- Numéro vert gratuit pour le SAMU : 115
- Sapeurs-pompiers : 118
- En cas de symptômes graves (paludisme ou dengue), rendez-vous au CHU Yalgado Ouédraogo, au CHU