
A Wt
Wt 2 (n = 6)
Wt 3 (n = 303)
Wt 4 (n = 106)
To
From
A T C G %
A — 3 50% 0 0% 0 0% 50
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 0 0% 1 16.7% — 0 0% 16.7
G 1 16.7% 1 16.7% 0 0% — 33.3
A — 32 10.6% 23 7.6% 49 16.2% 34.3
T 26 8.6% — 48 15.8% 16 5.3% 29.7
C 9 3.0% 26 8.6% — 9 3.0% 14.5
G 33 10.9% 13 4.3% 19 6.3% — 21.5
A — 12 11.3% 8 7.5% 15 14.2% 33.0
T 14 13.2% — 9 8.5% 7 6.6% 28.3
C 1 0.9% 13 12.3% — 2 1.9% 15.1
G 16 15.1% 4 3.8% 5 4.7% — 23.6
0 10 20 30 40 50
% of sample's unique variants
B Aicda−/−
Aicda−/− 1 (n = 1)
Aicda−/− 2 (n = 1)
Aicda−/− 3 (n = 2)
A — 0 0% 0 0% 0 0% 0
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 0 0% 0 0% — 0 0% 0
G 0 0% 0 0% 1 100% — 100
A — 0 0% 0 0% 0 0% 0
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 0 0% 0 0% — 0 0% 0
G 1 100% 0 0% 0 0% — 100
A — 1 50% 0 0% 0 0% 50
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 0 0% 0 0% — 0 0% 0
G 0 0% 1 50% 0 0% — 50
0 20 40 60 80 100
% of sample's unique variants