
A pMX-Aicda
C1 (n = 79)
D3 (n = 58)
D5 (n = 161)
To
From
A T C G %
A — 2 2.5% 1 1.3% 1 1.3% 5.1
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 8 10.1% 25 31.6% — 9 11.4% 53.2
G 18 22.8% 2 2.5% 13 16.5% — 41.8
A — 0 0% 0 0% 0 0% 0
T 1 1.7% — 0 0% 0 0% 1.7
C 1 1.7% 20 34.5% — 12 20.7% 56.9
G 12 20.7% 1 1.7% 11 19.0% — 41.4
A — 1 0.6% 1 0.6% 0 0% 1.2
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 19 11.8% 39 24.2% — 18 11.2% 47.2
G 56 34.8% 7 4.3% 20 12.4% — 51.6
0 5 10 15 20 25 30
% of sample's unique variants
B pMX-Empty vector
C3 (n = 0)
C4 (n = 0)
D1 (n = 0)
To
From
A T C G %
A — 0 0 0 —
T 0 — 0 0 —
C 0 0 — 0 —
G 0 0 0 — —
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
% of sample's unique variants