A

Wt (Sanger)
n = 471

From \ To	A	T	C	G
A	—	51 (10.8%)	35 (7.4%)	73 (15.5%)
T	41 (8.7%)	—	67 (14.2%)	25 (5.3%)
C	10 (2.1%)	45 (9.6%)	—	15 (3.2%)
G	57 (12.1%)	22 (4.7%)	30 (6.4%)	—

Wt (ONT)
n = 571

From \ To	A	T	C	G
A	—	53 (9.3%)	58 (10.2%)	100 (17.5%)
T	54 (9.5%)	—	95 (16.6%)	37 (6.5%)
C	18 (3.2%)	44 (7.7%)	—	19 (3.3%)
G	47 (8.2%)	18 (3.2%)	28 (4.9%)	—

0 2 4 6 8 10 12 14 16
% of unique mutations

B

Platform × type interaction (repeated measures): F(11,22) = 0.98, p = 0.495

Sanger (n = 471) ONT (n = 571)

% of unique mutations

A>T	A>C	A>G	T>A	T>C	T>G	C>A	C>T	C>G	G>A	G>T	G>C
adj. p 0.92	adj. p >0.99	adj. p >0.99	adj. p >0.99	adj. p >0.99	adj. p 0.46	adj. p >0.99	adj. p 0.97	adj. p >0.99	adj. p 0.86	adj. p 0.90	adj. p >0.99

C

r = 0.91 [0.69–0.97]
slope = 1.02

A>G
T>C
A>C
G>A

ONT, % of unique mutations
Sanger, % of unique mutations

D

Sanger ONT

adj. p = 0.10
adj. p = 0.97

% of unique mutations
G:C transitions
G:C transversions

E

Sanger
n = 103
13% 44% 13% 16% 16%

ONT
n = 1,500
15% 50% 14% 17%

Mutations per sequence
0
1–3
4–10
11–20
20+