
A Wt
Wt 2 (n = 155)
Wt 3 (n = 347)
Wt 4 (n = 69)
To
From
A T C G %
A — 13 8.4% 19 12.3% 23 14.8% 35.5
T 20 12.9% — 27 17.4% 10 6.5% 36.8
C 3 1.9% 12 7.7% — 2 1.3% 11.0
G 15 9.7% 5 3.2% 6 3.9% — 16.8
A — 35 10.1% 35 10.1% 67 19.3% 39.5
T 30 8.6% — 53 15.3% 22 6.3% 30.3
C 14 4.0% 24 6.9% — 12 3.5% 14.4
G 27 7.8% 11 3.2% 17 4.9% — 15.9
A — 5 7.2% 4 5.8% 10 14.5% 27.5
T 4 5.8% — 15 21.7% 5 7.2% 34.8
C 1 1.4% 8 11.6% — 5 7.2% 20.3
G 5 7.2% 2 2.9% 5 7.2% — 17.4
0 5 10 15 20
% of sample's unique variants
B Aicda−/−
Aicda−/− 1 (n = 0)
Aicda−/− 2 (n = 3)
Aicda−/− 3 (n = 1)
To
From
A T C G %
A — 0 — 0 — 0 — —
T 0 — — 0 — 0 — —
C 0 — 0 — — 0 — —
G 0 — 0 — 0 — — —
A — 0 0% 0 0% 0 0% 0
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 0 0% 0 0% — 1 33.3% 33.3
G 0 0% 2 66.7% 0 0% — 66.7
A — 1 100% 0 0% 0 0% 100
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 0 0% 0 0% — 0 0% 0
G 0 0% 0 0% 0 0% — 0
0 20 40 60 80 100
% of sample's unique variants