
A pMX-Aicda
C1 (n = 69)
D3 (n = 68)
D5 (n = 150)
To
From
A T C G %
A — 1 1.4% 0 0% 0 0% 1.4
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 5 7.2% 15 21.7% — 9 13.0% 42.0
G 23 33.3% 3 4.3% 13 18.8% — 56.5
A — 0 0% 0 0% 0 0% 0
T 1 1.5% — 0 0% 0 0% 1.5
C 4 5.9% 17 25% — 13 19.1% 50
G 20 29.4% 4 5.9% 9 13.2% — 48.5
A — 0 0% 0 0% 0 0% 0
T 1 0.7% — 0 0% 0 0% 0.7
C 22 14.7% 32 21.3% — 14 9.3% 45.3
G 46 30.7% 15 10% 20 13.3% — 54
0 5 10 15 20 25 30
% of sample's unique variants
B pMX-Empty vector
C3 (n = 0)
C4 (n = 0)
D1 (n = 1)
A — 0 — 0 — 0 — —
T 0 — — 0 — 0 — —
C 0 — 0 — — 0 — —
G 0 — 0 — 0 — — —
A — 0 — 0 — 0 — —
T 0 — — 0 — 0 — —
C 0 — 0 — — 0 — —
G 0 — 0 — 0 — — —
A — 0 0% 0 0% 0 0% 0
T 0 0% — 0 0% 1 100% 100
C 0 0% 0 0% — 0 0% 0
G 0 0% 0 0% 0 0% — 0
0 20 40 60 80 100
% of sample's unique variants