
A Wt
Wt 2 (n = 161)
Wt 3 (n = 342)
Wt 4 (n = 68)
To
From
A T C G %
A — 17 10.6% 16 9.9% 28 17.4% 37.9
T 14 8.7% — 23 14.3% 10 6.2% 29.2
C 2 1.2% 15 9.3% — 4 2.5% 13.0
G 20 12.4% 6 3.7% 6 3.7% — 19.9
A — 38 11.1% 31 9.1% 66 19.3% 39.5
T 26 7.6% — 51 14.9% 19 5.6% 28.1
C 14 4.1% 26 7.6% — 13 3.8% 15.5
G 29 8.5% 11 3.2% 18 5.3% — 17.0
A — 5 7.4% 4 5.9% 10 14.7% 27.9
T 3 4.4% — 14 20.6% 5 7.4% 32.4
C 1 1.5% 7 10.3% — 5 7.4% 19.1
G 6 8.8% 2 2.9% 6 8.8% — 20.6
0 5 10 15 20
% of sample's unique variants
B Aicda−/−
Aicda−/− 1 (n = 2)
Aicda−/− 2 (n = 6)
Aicda−/− 3 (n = 3)
A — 0 0% 0 0% 1 50% 50
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 0 0% 0 0% — 0 0% 0
G 1 50% 0 0% 0 0% — 50
A — 0 0% 0 0% 0 0% 0
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 0 0% 0 0% — 0 0% 0
G 3 50% 2 33.3% 1 16.7% — 100
A — 1 33.3% 0 0% 0 0% 33.3
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 0 0% 0 0% — 0 0% 0
G 1 33.3% 0 0% 1 33.3% — 66.7
0 10 20 30 40 50
% of sample's unique variants