
A Wt
Wt 2 (n = 177)
Wt 3 (n = 230)
Wt 4 (n = 111)
To
From
A T C G %
A — 17 9.6% 14 7.9% 30 16.9% 34.5
T 14 7.9% — 23 13.0% 8 4.5% 25.4
C 8 4.5% 18 10.2% — 7 4.0% 18.6
G 17 9.6% 9 5.1% 12 6.8% — 21.5
A — 27 11.7% 19 8.3% 36 15.7% 35.7
T 17 7.4% — 42 18.3% 11 4.8% 30.4
C 3 1.3% 17 7.4% — 6 2.6% 11.3
G 26 11.3% 13 5.7% 13 5.7% — 22.6
A — 14 12.6% 8 7.2% 15 13.5% 33.3
T 14 12.6% — 9 8.1% 7 6.3% 27.0
C 2 1.8% 13 11.7% — 2 1.8% 15.3
G 17 15.3% 4 3.6% 6 5.4% — 24.3
0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5
% of sample's unique variants
B Aicda−/−
Aicda−/− 1 (n = 1)
Aicda−/− 2 (n = 1)
Aicda−/− 3 (n = 2)
To
From
A T C G %
A — 0 0% 0 0% 0 0% 0
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 0 0% 0 0% — 0 0% 0
G 0 0% 0 0% 1 100% — 100
A — 0 0% 0 0% 0 0% 0
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 0 0% 0 0% — 0 0% 0
G 1 100% 0 0% 0 0% — 100
A — 1 50% 0 0% 0 0% 50
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 0 0% 0 0% — 0 0% 0
G 0 0% 1 50% 0 0% — 50
0 20 40 60 80 100
% of sample's unique variants