
A pMX-Aicda
C1 (n = 80)
D3 (n = 71)
D5 (n = 147)
To
From
A T C G %
A — 2 2.5% 1 1.2% 0 0% 3.8
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 8 10% 21 26.2% — 11 13.8% 50
G 20 25% 9 11.2% 8 10% — 46.2
A — 0 0% 0 0% 1 1.4% 1.4
T 1 1.4% — 0 0% 0 0% 1.4
C 9 12.7% 19 26.8% — 10 14.1% 53.5
G 16 22.5% 8 11.3% 7 9.9% — 43.7
A — 0 0% 0 0% 0 0% 0
T 0 0% — 0 0% 1 0.7% 0.7
C 19 12.9% 35 23.8% — 13 8.8% 45.6
G 41 27.9% 24 16.3% 14 9.5% — 53.7
0 5 10 15 20 25
% of sample's unique variants
B pMX-Empty vector
C3 (n = 2)
C4 (n = 7)
D1 (n = 10)
To
From
A T C G %
A — 0 0% 0 0% 1 50% 50
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 1 50% 0 0% — 0 0% 50
G 0 0% 0 0% 0 0% — 0
A — 0 0% 0 0% 1 14.3% 14.3
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 3 42.9% 0 0% — 0 0% 42.9
G 0 0% 3 42.9% 0 0% — 42.9
A — 0 0% 0 0% 0 0% 0
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 4 40% 0 0% — 0 0% 40
G 0 0% 6 60% 0 0% — 60
0 10 20 30 40 50 60
% of sample's unique variants