A

Wt (Sanger)
n = 471

From \ To	A	T	C	G
A	—	51 (10.8%)	35 (7.4%)	73 (15.5%)
T	41 (8.7%)	—	67 (14.2%)	25 (5.3%)
C	10 (2.1%)	45 (9.6%)	—	15 (3.2%)
G	57 (12.1%)	22 (4.7%)	30 (6.4%)	—

Wt (ONT)
n = 585

From \ To	A	T	C	G
A	—	60 (10.3%)	54 (9.2%)	108 (18.5%)
T	45 (7.7%)	—	90 (15.4%)	33 (5.6%)
C	19 (3.2%)	49 (8.4%)	—	24 (4.1%)
G	55 (9.4%)	19 (3.2%)	29 (5.0%)	—

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5
% of unique mutations

B

Platform × type interaction (repeated measures): F(11,22) = 0.77, p = 0.664

Sanger (n = 471) ONT (n = 585)

% of unique mutations

A>T	A>C	A>G	T>A	T>C	T>G	C>A	C>T	C>G	G>A	G>T	G>C
adj. p >0.99	adj. p >0.99	adj. p 0.87	adj. p >0.99	adj. p >0.99	adj. p 0.87	adj. p >0.99	adj. p >0.99	adj. p >0.99	adj. p >0.99	adj. p 0.95	adj. p >0.99

C

r = 0.94 [0.79–0.98]
slope = 1.04

A>G
T>C
G>A

ONT, % of unique mutations
Sanger, % of unique mutations

D

Sanger ONT

% of unique mutations

adj. p = 0.36
adj. p = 1.00

G:C transitions
G:C transversions

E

Sanger
n = 103
13% 16% 16% 13% 44%

ONT
n = 1,494
4% 15% 17% 14% 50%

Mutations per sequence
0
1–3
4–10
11–20
20+