
A Wt
Wt 2 (n = 135)
Wt 3 (n = 230)
Wt 4 (n = 106)
To
From
A T C G %
A — 12 8.9% 8 5.9% 22 16.3% 31.1
T 10 7.4% — 16 11.9% 7 5.2% 24.4
C 6 4.4% 15 11.1% — 7 5.2% 20.7
G 15 11.1% 5 3.7% 12 8.9% — 23.7
A — 27 11.7% 19 8.3% 36 15.7% 35.7
T 17 7.4% — 42 18.3% 11 4.8% 30.4
C 3 1.3% 17 7.4% — 6 2.6% 11.3
G 26 11.3% 13 5.7% 13 5.7% — 22.6
A — 12 11.3% 8 7.5% 15 14.2% 33.0
T 14 13.2% — 9 8.5% 7 6.6% 28.3
C 1 0.9% 13 12.3% — 2 1.9% 15.1
G 16 15.1% 4 3.8% 5 4.7% — 23.6
0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5
% of sample's unique variants
B Aicda−/−
Aicda−/− 1 (n = 1)
Aicda−/− 2 (n = 1)
Aicda−/− 3 (n = 2)
To
From
A T C G %
A — 0 0% 0 0% 0 0% 0
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 0 0% 0 0% — 0 0% 0
G 0 0% 0 0% 1 100% — 100
A — 0 0% 0 0% 0 0% 0
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 0 0% 0 0% — 0 0% 0
G 1 100% 0 0% 0 0% — 100
A — 1 50% 0 0% 0 0% 50
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 0 0% 0 0% — 0 0% 0
G 0 0% 1 50% 0 0% — 50
0 20 40 60 80 100
% of sample's unique variants