

WT3 (AID-active), + strand
− strand
AID-null controls, + strand
− strand
A
AID hotspot
position 165, C>T in TACCT
called
p = 5×10−19
WT3 (case)
KO1
KO2
KO3
20/2000 (19 at Q≥20)
0/1998 (0 at Q≥20)
1/1998 (0 at Q≥20)
1/1999 (0 at Q≥20)
0.0
0.5
1.0
1.5
Reads carrying the change (%)
B
Recurrent background
position 97, C>T in AGCTT
not called
p = 1.00
15/1941 (13 at Q≥20)
14/1879 (14 at Q≥20)
5/1906 (4 at Q≥20)
5/1927 (4 at Q≥20)
C
WT3 supporting reads have similar quality at both sites; the controls differ
controls
n = 20
n = 2
n = 15
n = 24
0
10
20
30
40
50
Base quality of supporting reads
D
Empirical threshold, Sμ WT3
threshold
p ≤ 9×10−3
88 calls
candidates kept
5% of kept
decoy-estimated false calls
Candidates or false calls
p-value threshold
E
Allele fractions of 1,197 calls, 12 libraries
JH4
N114 VH
Sμ
Pim1
53% below 1% of reads
93% below 5%
≥50%:
excluded as
germline
SHMtrace calls
Reads carrying the call (%)