
A Wt
Wt 2 (n = 205)
Wt 3 (n = 340)
Wt 4 (n = 73)
To
From
A T C G %
A — 18 8.8% 19 9.3% 36 17.6% 35.6
T 23 11.2% — 29 14.1% 11 5.4% 30.7
C 5 2.4% 15 7.3% — 7 3.4% 13.2
G 21 10.2% 12 5.9% 9 4.4% — 20.5
A — 37 10.9% 33 9.7% 67 19.7% 40.3
T 25 7.4% — 49 14.4% 17 5% 26.8
C 13 3.8% 25 7.4% — 12 3.5% 14.7
G 29 8.5% 14 4.1% 19 5.6% — 18.2
A — 4 5.5% 4 5.5% 12 16.4% 27.4
T 4 5.5% — 15 20.5% 7 9.6% 35.6
C 1 1.4% 9 12.3% — 5 6.8% 20.5
G 5 6.8% 2 2.7% 5 6.8% — 16.4
0 5 10 15 20
% of sample's unique variants
B Aicda−/−
Aicda−/− 1 (n = 0)
Aicda−/− 2 (n = 2)
Aicda−/− 3 (n = 1)
A — 0 — 0 — 0 — —
T 0 — 0 — 0 — —
C 0 — 0 — 0 — —
G 0 — 0 — 0 — —
A — 0 0% 0 0% 0 0% 0
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 0 0% 0 0% — 0 0% 0
G 0 0% 2 100% 0 0% — 100
A — 1 100% 0 0% 0 0% 100
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 0 0% 0 0% — 0 0% 0
G 0 0% 0 0% 0 0% — 0
0 20 40 60 80 100
% of sample's unique variants