
A pMX-Aicda
C1 (n = 75)
D3 (n = 59)
D5 (n = 166)
To
From
A T C G %
A — 2 2.7% 1 1.3% 1 1.3% 5.3
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 6 8% 25 33.3% — 8 10.7% 52
G 17 22.7% 3 4% 12 16% — 42.7
A — 0 0% 0 0% 0 0% 0
T 2 3.4% — 0 0% 0 0% 3.4
C 3 5.1% 23 39.0% — 9 15.3% 59.3
G 9 15.3% 2 3.4% 11 18.6% — 37.3
A — 2 1.2% 1 0.6% 1 0.6% 2.4
T 0 0% — 0 0% 1 0.6% 0.6
C 17 10.2% 41 24.7% — 21 12.7% 47.6
G 48 28.9% 16 9.6% 18 10.8% — 49.4
0 5 10 15 20 25 30 35
% of sample's unique variants
B pMX-Empty vector
C3 (n = 0)
C4 (n = 0)
D1 (n = 0)
To
From
A T C G %
A — 0 — 0 — 0 — —
T 0 — — 0 — 0 — —
C 0 0 — — 0 — —
G 0 0 0 — —
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
% of sample's unique variants