
A
Wt (Sanger)
n = 494
To
A T C G
From
A — 57 11.5% 38 7.7% 77 15.6%
T 43 8.7% — 70 14.2% 26 5.3%
C 11 2.2% 46 9.3% — 15 3.0%
G 58 11.7% 22 4.5% 31 6.3% —
Wt (ONT)
n = 585
To
A T C G
A — 60 10.3% 54 9.2% 108 18.5%
T 45 7.7% — 90 15.4% 33 5.6%
C 19 3.2% 49 8.4% — 24 4.1%
G 55 9.4% 19 3.2% 29 5.0% —
0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5
% of unique mutations


B
Platform × type interaction (repeated measures): F(11,22) = 0.78, p = 0.657
Sanger (n = 494)
ONT (n = 585)
% of unique mutations
0 5 10 15 20 25 30
adj. p 0.99
adj. p >0.99
adj. p 0.78
adj. p >0.99
adj. p >0.99
adj. p 0.92
adj. p >0.99
adj. p >0.99
adj. p >0.99
adj. p >0.99
adj. p >0.99
adj. p >0.99
A>T A>C A>G T>A T>C T>G C>A C>T C>G G>A G>T G>C


C
r = 0.95 [0.81–0.98]
slope = 1.04
A>G
T>C
G>A
ONT, % of unique mutations
Sanger, % of unique mutations
0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0
0 5 10 15 20


D
Sanger
ONT
adj. p = 0.53
adj. p = 1.00
% of unique mutations
0 5 10 15 20 25 30 35
G:C transitions
G:C transversions


E
Sanger
n = 104
12%
15%
43%
16%
12%
ONT
n = 1,494
4%
15%
50%
17%
14%
Mutations per sequence
0
1–3
4–10
11–20
20+