
A Wt
Wt 2 (n = 221)
Wt 3 (n = 344)
Wt 4 (n = 73)
To
From
A T C G %
A — 20 9.0% 22 10.0% 39 17.6% 36.7
T 25 11.3% — 29 13.1% 13 5.9% 30.3
C 6 2.7% 15 6.8% — 8 3.6% 13.1
G 22 10.0% 12 5.4% 10 4.5% — 19.9
A — 37 10.8% 34 9.9% 67 19.5% 40.1
T 25 7.3% — 49 14.2% 17 4.9% 26.5
C 13 3.8% 25 7.3% — 14 4.1% 15.1
G 29 8.4% 15 4.4% 19 5.5% — 18.3
A — 4 5.5% 4 5.5% 12 16.4% 27.4
T 4 5.5% — 15 20.5% 7 9.6% 35.6
C 1 1.4% 9 12.3% — 5 6.8% 20.5
G 5 6.8% 2 2.7% 5 6.8% — 16.4
0 5 10 15 20
% of sample's unique variants
B Aicda−/−
Aicda−/− 1 (n = 0)
Aicda−/− 2 (n = 2)
Aicda−/− 3 (n = 0)
A — 0 — 0 — 0 — —
T 0 — 0 — 0 — —
C 0 — 0 — 0 — —
G 0 — 0 — 0 — —
A — 0 0% 0 0% 0 0% 0
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 0 0% 0 0% — 0 0% 0
G 0 0% 2 100% 0 0% — 100
A — 0 — 0 — 0 — —
T 0 — — 0 — 0 — —
C 0 — 0 — — 0 — —
G 0 — 0 — 0 — — —
0 20 40 60 80 100
% of sample's unique variants