
A pMX-Aicda
C1 (n = 70)
D3 (n = 49)
D5 (n = 173)
To
From
A T C G %
A — 2 2.9% 1 1.4% 1 1.4% 5.7
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 6 8.6% 21 30% — 8 11.4% 50
G 16 22.9% 3 4.3% 12 17.1% — 44.3
A — 0 0% 0 0% 0 0% 0
T 1 2.0% — 0 0% 0 0% 2.0
C 3 6.1% 15 30.6% — 9 18.4% 55.1
G 9 18.4% 1 2.0% 11 22.4% — 42.9
A — 3 1.7% 1 0.6% 1 0.6% 2.9
T 0 0% — 0 0% 1 0.6% 0.6
C 18 10.4% 40 23.1% — 21 12.1% 45.7
G 50 28.9% 18 10.4% 20 11.6% — 50.9
0 5 10 15 20 25 30
% of sample's unique variants
B pMX-Empty vector
C3 (n = 1)
C4 (n = 0)
D1 (n = 0)
A T C G %
A — 1 100% 0 0% 0 0% 100
T 0 0% — 0 0% 0 0% 0
C 0 0% 0 0% — 0 0% 0
G 0 0% 0 0% 0 0% — 0
A — 0 — 0 — 0 — —
T 0 — — 0 — 0 — —
C 0 — 0 — — 0 — —
G 0 — 0 — 0 — — —
A — 0 — 0 — 0 — —
T 0 — — 0 — 0 — —
C 0 — 0 — — 0 — —
G 0 — 0 — 0 — — —
0 20 40 60 80 100
% of sample's unique variants