2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ ALAGOAS

Realização
ABEFACO AAMFC

Baixa Cobertura Vacinal contra a COVID-19 em Crianças na Atenção Primária à Saúde (APS): Relato de Experiência

Maria Clara Sales Veríssimo[1], Mirna de Araújo Costa[1], Nickolas Gabriel de Albuquerque Jatobá[1], Ludmilla Meyre de Almeida[1], Igor Duarte de Oliveira[1]

[1]Universidade Federal de Alagoas - Campus Arapiraca



Fluxograma dos fatores associados à hesitação vacinal contra COVID-19 e das estratégias de intervenção na APS.

PRINCIPAIS ACHADOS

- Observou-se hesitação vacinal específica para COVID-19, mesmo com o calendário vacinal infantil atualizado.
- A recusa esteve associada a dúvidas sobre segurança, eficácia e influência de desinformação.
- A baixa adesão não se relacionou à disponibilidade da vacina, mas a fatores socioculturais.
- Estratégias como escuta ativa, comunicação baseada em evidências e fortalecimento do vínculo aumentaram a aceitação vacinal.

Introdução

A redução da cobertura vacinal infantil contra a COVID-19 configura-se como um desafio persistente na Atenção Primária à Saúde (APS). Observa-se, no contexto pós-pandemia, aumento da hesitação vacinal específica para essa imunização, influenciada por desinformação e dúvidas quanto à segurança e eficácia das vacinas.

Objetivos

Descrever a experiência de estudantes de Medicina no enfrentamento da hesitação vacinal contra a COVID-19 em crianças, durante atendimentos em uma Unidade Básica de Saúde.

Métodos

Relato de experiência realizado por estudantes de Medicina durante atendimentos na disciplina de Saúde da Criança e do Adolescente, em uma Unidade Básica de Saúde no município de Arapiraca-AL. A abordagem incluiu observação do estado vacinal das crianças e intervenções baseadas em escuta ativa, orientação fundamentada em evidências científicas e comunicação adaptada aos responsáveis.

Resultados

Observou-se que, entre as vacinas do calendário infantil, a imunização contra a COVID-19 era frequentemente a única recusada ou postergada pelos responsáveis, mesmo quando as demais estavam atualizadas. Identificou-se um padrão de hesitação vacinal específico, associado a dúvidas sobre segurança e eficácia, além da influência de desinformação. A adoção de estratégias comunicativas individualizadas, com escuta qualificada e esclarecimento baseado em evidências, contribuiu para maior aceitação da vacina e fortalecimento do vínculo com os responsáveis.

Conclusão/Considerações finais

A baixa adesão à vacinação contra a COVID-19 em crianças está relacionada principalmente a fatores subjetivos e socioculturais, e não à indisponibilidade da vacina. O enfrentamento da hesitação vacinal na APS requer estratégias educativas contínuas, comunicação eficaz e cuidado centrado na família.

Universidade Federal de Alagoas - Campus Arapiraca

Maria Clara Sales Veríssimo - clarasalesverissimo@gmail.com
Acadêmica de Medicina

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS