2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

DESCRIÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA TUBERCULOSE NO NORDESTE DO BRASIL (2014-2024)

Cléciana Alves Cavalcante[1]; Letícia Almeida Rodrigues[2]; Marianny Letícia Vieira de Santana[3]; José Emerson Xavier[4]

1, 2 e 3 Estudantes de Medicina da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), campus Arapiraca. 4 Professor da UFAL



A alta taxa de abandono ao tratamento da tuberculose no período avaliado evidencia a necessidade da criação de estratégias de cuidado na Atenção Primária à Saúde que melhorem a adesão e mitiguem desistências, aumentando as perspectivas de cura e redução da transmissão da doença.

Introdução

A Tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa de notificação compulsória e configura um grave problema de saúde pública, especialmente em regiões de vulnerabilidade socioeconômicas como o Nordeste do Brasil.

Objetivos

Este estudo analisou os casos de tuberculose notificados na Região Nordeste entre 2014 e 2024, e tem como objetivo discutir os desafios para o enfrentamento do agravo no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS).

Métodos

Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo, transversal e descritivo, com abordagem quantitativa, utilizando dados do SINAN/DataSUS.

Resultados

No período entre 2014 a 2024 foram registrados 210.918 novos casos. A taxa de incidência oscilou, com o menor índice em 2020 (30,29/100.000 hab) e o maior em 2023 (38,25/100.000 hab.). Os homens apresentaram 68,55% dos casos, e a faixa etária mais prevalente foi de 20 a 39 anos (43,03%), seguida por 40 a 59 anos (32,54%). O nível de escolaridade predominante foi de 67,49% até o ensino fundamental. A taxa de abandono do tratamento foi de 13,1%.



Conclusão/Considerações finais

Os resultados evidenciam a persistência da TB como uma doença negligenciada atrelada aos determinantes sociais. A queda na taxa de incidência em 2020 sugere subnotificação devido à pandemia de COVID-19. A taxa de abandono supera o limite aceitável preconizado pela OMS (<5%), dificultando o controle da doença. Conclui-se que o combate à TB exige políticas intersetoriais e o fortalecimento da APS, que, pela longitudinalidade do cuidado, é o mecanismo mais eficaz para reduzir infecções e garantir a adesão ao tratamento.





UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CLÉCIANA ALVES CAVALCANTE
ESTUDANTE DE MEDICINA

E-mail:
cleciana.cavalcante@arapiraca.ufal.br
Contato: (82) 988109744

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS