2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo

30 de abril a 2 de maio de 2026

MACEIÓ • ALAGOAS

Realização

ABEFACO AAMFC

Análise epidemilógica comparativa da hanseníase nos municípios de Maceió e Arapiraca entre 2016 e 2025

Autores: Lucas Correia de Araújo Novais[1]; Arthur Padilha Rocha[1]; Cael Rocha Guimarães [1]; Adriana Lima dos Santos[2] , Hudson Renan Costa Silva[3]. Instituições: [1]Discente de Medicina – Centro Universitário Cesmac (CESMAC); [2]Mestranda – Centro Universitário Cesmac (CESMAC) ; [3]Preceptor/Médico de Família e Comunidade.

Gráfico – Número de casos confirmados de hanseníase em Maceió e Arapiraca, Alagoas, no período de 2016 a 2025.



Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/DATASUS).

Maceió apresentou maior carga de hanseníase ao longo do período, com tendência de redução progressiva dos casos. Em contraste, Arapiraca exibiu menor número absoluto, porém com crescimento recente, atingindo seu pico em 2024. Esses achados evidenciam dinâmicas epidemiológicas distintas entre os municípios e reforçam a necessidade de intensificação da vigilância e do diagnóstico precoce, especialmente no interior do estado.

Introdução

A hanseníase permanece como um agravo de relevante impacto na saúde pública de Alagoas, exigindo o monitoramento contínuo dos indicadores para subsidiar ações na Atenção Primária à Saúde.

Objetivos

Este estudo objetiva traçar e comparar o perfil epidemiológico da hanseníase nos municípios de Maceió e Arapiraca no período de 2016 a 2025.

Métodos

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo com dados obtidos via Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponibilizados pelo DATASUS.

Resultados

Em Maceió, registrou-se um total de 1.002 casos no período, com pico de incidência em 2018 (149 casos) e uma tendência de redução gradual nos anos subsequentes, atingindo 76 casos em 2024. Em contrapartida, Arapiraca contabilizou 428 notificações, apresentando um comportamento epidemiológico distinto: enquanto Maceió declinou, Arapiraca registrou seu ápice em 2024, com 64 casos, evidenciando uma curva de detecção crescente nos últimos dois anos. Os dados de 2025, embora parciais, mostram 49 casos na capital e 6 em Arapiraca até o momento da extração.

Conclusão/Considerações finais

Conclui-se que há uma disparidade na dinâmica de transmissão e detecção entre os polos. Enquanto Maceió demonstra maior volume histórico, Arapiraca apresenta uma recente ascensão de diagnósticos, reforçando a necessidade de fortalecer a vigilância em saúde e o diagnóstico precoce no interior do estado para o controle efetivo da endemia.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim epidemiológico de hanseníase: número especial – janeiro de 2026**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA. **Boletim epidemiológico de hanseníase – Arapiraca/AL (2025)**. Arapiraca, 2025.
SILVA, A. B. et al. **Atraso no diagnóstico da hanseníase em município endêmico do Nordeste brasileiro**. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 40, 2024.
SOUZA, C. D. et al**. Leprosy elimination phase in Alagoas, Brazil, 2001–2022**. Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, v. 34, 2025.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS. **Distribuição espaço-temporal da hanseníase em Arapiraca**, Alagoas (2008–2017). Arapiraca: UFAL, 2019.

INSTITUIÇÃO: CESMAC
AUTOR PRINCIPAL: Lucas Correia de Araújo Novais
E-MAIL: lucasnovais0@gmail.com

CESMAC CENTRO UNIVERSITÁRIO