2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

Análise comparativa do perfil epidemiológico da tuberculose nos municípios de Maceió e Arapiraca entre 2015 e 2024

Autores: Lucas Correia de Araújo Novais[1]; Arthur Padilha Rocha[1]; Cael Rocha Guimarães [1]; Adriana Lima dos Santos[2] , Hudson Renan Costa Silva[3]. Instituições: [1]Discente de Medicina – Centro Universitário Cesmac (CESMAC); Mestranda – Centro Universitário Cesmac (CESMAC) ;[3]Preceptor/Médico de Família e Comunidade.

Gráfico 1 – Número de casos confirmados de tuberculose em Maceió e Arapiraca, Alagoas, no período de 2015 a 2024.



Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/DATASUS).

Maceió apresentou maior carga de tuberculose em todo o período, enquanto Arapiraca exibiu menor número absoluto, porém com variações proporcionais relevantes. Observou-se queda de casos em ambos os municípios entre 2020 e 2021, sugerindo impacto da pandemia de COVID-19 na notificação. A retomada após 2022 reforça a hipótese de subnotificação e destaca a necessidade de estratégias locais de controle.

Introdução

A tuberculose permanece como um dos principais desafios de saúde pública no Brasil, exigindo vigilância constante para o fortalecimento das políticas de controle na Atenção Primária à Saúde

Objetivos

O objetivo deste estudo é traçar e comparar o perfil epidemiológico dos casos confirmados de tuberculose em Maceió e Arapiraca no período de 2015 a 2024.

Métodos

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, cujos dados foram obtidos por meio de consulta ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/DATASUS).

Resultados

No período analisado, Maceió registrou um total de 7.163 casos, apresentando seu pico em 2018 com 843 ocorrências, seguido de uma queda acentuada em 2021 (625 casos) e subsequente retomada de crescimento até 2024 (733 casos). Em contrapartida, Arapiraca somou 780 casos, com maior incidência em 2016 (105 casos) e uma redução significativa em 2018 (52 casos), voltando a ultrapassar a marca de 100 casos anuais apenas em 2024 (102 casos). A comparação revela que, embora Maceió detenha o maior volume absoluto, ambos os municípios mostram flutuações que sugerem o impacto de fatores externos na notificação, como a pandemia de COVID-19, evidenciada pela queda em 2020 e 2021.

Conclusão/Considerações finais

Conclui-se que a compreensão dessas disparidades municipais é fundamental para o planejamento de ações específicas de busca ativa e manejo clínico no âmbito da Medicina de Família e Comunidade, visando a interrupção da cadeia de transmissão local.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. **Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN): tuberculose**. Brasília, DF

CAMPOS, J. C. et al. **Temporal dynamics of tuberculosis incidence, mortality, and TB–HIV coinfection in Alagoas, Brazil**. PLoS ONE, v. 17, 2022.

FERREIRA, L. R. et al. **Tuberculosis in Northeastern Brazil: an ecological time-series study**. Revista da Associação Médica Brasileira, São Paulo

MARTINS, P. H. et al. **Evolução do perfil clínico-epidemiológico da tuberculose no Nordeste brasileiro**, 2019–2023. Brazilian Journal of Infection & Health Sciences, 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA. **Boletim epidemiológico de tuberculose – Arapiraca/AL (2025).** Arapiraca, 2025.

INSTITUIÇÃO: CESMAC
AUTOR PRINCIPAL: Lucas Correia de Araújo Novais
E-MAIL: lucasnovais0@gmail.com

CESMAC CENTRO UNIVERSITÁRIO