2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo

30 de abril a 2 de maio de 2026

MACEIÓ • ALAGOAS

Realização

ABEFACO AAMFC

Vigilância territorial da hanseníase na atenção primária: análise espacial na região oeste do Distrito Federal

Autores e Vínculo

Andreia Alves Mendonça: Diretoria Regional de Saúde do Distrito Federal (DIRAPS Oeste)
Janaína Pereira Alves: Diretoria Regional de Saúde do Distrito Federal (DIRAPS Oeste)
Taynara Viana Curvina Luz: Universidade de Brasília (UnB)
Raquel Mariani Do Carmo: Universidade de Brasília (UnB)



Figura 1: Tendências Epidemiológicas em Ceilândia e Brazlândia

O gráfico detalha as notificações de hanseníase, evidenciando que Ceilândia, concentra a maior carga, com um pico expressivo de **27 casos** no período de 2024/2025. O **Sol Nascente** apresenta uma dinâmica epidemiológica crítica, mantendo uma média elevada de notificações ao longo dos anos, com picos de **12 casos** em 2020 e 2022, superando o volume total de Brazlândia em diversos intervalos. Brazlândia, por sua vez, apresenta a ascensão mais acentuada no último período, atingindo seu ápice histórico com **18 casos** em 2024/2025.



Figura 2: Proporção Total de Casos por Região (2017-2025)

Este gráfico de proporção evidencia a carga epidemiológica nas regiões analisadas, destacando a relevância do **Sol Nascente** no cenário local. Ceilândia concentra **47,1%** das notificações, enquanto o Sol Nascente responde por **30,2%** e Brazlândia por **22,7%**. No conjunto total, o território de Ceilândia (incluindo Sol Nascente) possui uma carga de notificações aproximadamente **3,5 vezes superior** à de Brazlândia. Essa disparidade não apenas justifica a priorização de recursos, como também exige que as estratégias de **busca ativa e vigilância de contatos** sejam adaptadas à realidade sociodemográfica do Sol Nascente, onde a densidade de casos sugere uma transmissão sustentada que impacta diretamente os indicadores globais da Região de Saúde Oeste.

Fonte: Elaboração própria (2026), com base em dados das planilhas de monitoramento de casos de Hanseníase das Regiões Administrativas de Ceilândia, Brazlândia e Sol Nascente (período 2017-2025).

PRINCIPAIS ACHADOS DO SEU TRABALHO

Persistência da hanseníase no período analisado, indicando transmissão ativa.

Maior concentração de casos no biênio 2024–2025.

Distribuição espacial heterogênea, com concentração em territórios específicos.

Recorrência de casos em áreas de Ceilândia, Sol nascente e Brazlândia.

Indícios de aglomerados espaciais e possíveis falhas na detecção precoce.

INTRODUÇÃO

A hanseníase é uma doença de evolução lenta, com potencial para causar incapacidades permanentes quando diagnosticada tardiamente. Na Atenção Primária à Saúde, ainda persistem desafios no reconhecimento precoce dos casos, especialmente em territórios vulneráveis. A existência de áreas silenciosas contribui para a manutenção da cadeia de transmissão, reforçando a necessidade de estratégias mais sensíveis de vigilância.

OBJETIVO

Analisar a distribuição espacial e temporal dos casos de hanseníase e identificar, ao longo dos anos, as áreas com maior concentração de buffers, indicando possíveis zonas de maior risco de transmissão.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem espacial, realizado no período de 2020 a 2025, com base em 188 casos georreferenciados nas regiões de Ceilândia, Brazlândia e Sol Nascente. Utilizou-se o conceito de buffer de 200 metros para análise da proximidade entre os casos.

O estudo estrutura-se em quatro etapas:

1.Análise espacial dos casos

2.Identificação de territórios prioritários

3. Planejamento de busca ativa com agentes comunitários de saúde, nas áreas de 200 metros, com aplicação do QSH (Questionário de Suspeição de Hanseníase)

4. Encaminhamento dos casos suspeitos identificados para avaliação clínica e tratamento nas Unidades Básicas de Saúde de referência do território.

RESULTADOS

Os achados evidenciam maior concentração de casos na região de Ceilândia, com significativa sobreposição de buffers em áreas densamente povoadas. Esse padrão espacial sugere a presença de possíveis focos de transmissão ativa, inclusive com indícios de transmissão extradomiciliar.

CONCLUSÃO

O uso do geoprocessamento mostrou-se uma ferramenta estratégica para o fortalecimento da vigilância territorial, contribuindo para a identificação de áreas prioritárias e apoiando o direcionamento de ações de busca ativa na APS. Essa abordagem favorece a detecção precoce dos casos e tem potencial para reduzir o diagnóstico tardio, qualificando as ações de controle da hanseníase.

INSTITUIÇÃO: DIRAPS Oeste
AUTOR PRINCIPAL: Andreia Alves Mendonça
VÍNCULO: Enfermeira responsável pela pasta da Hanseníase. Responsável técnica.

E-mail: deiapatelli@gmail.com
Contatos: (61) 3449-5944/ 3449-5945
Website:

DIRAPS OESTE