2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo

30 de abril a 2 de maio de 2026

MACEIÓ ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

VULNERABILIDADES NO CUIDADO A PESSOAS IDOSAS COM DIABETES MELLITUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Giulia M. S. M. Leal; Manoela V. G. Costa; Luciano R. Lima; Silvana S. Funghetto; Marina M. Stival
Universidade de Brasília (UnB)



Vulnerabilidades identificadas em pessoas idosas com DM2 acompanhadas na APS. Legenda: VT: Vitalidade; CF: Capacidade funcional, SM: Saúde mental; LG: Limitação global; AS: Aspectos sociais

PRINCIPAIS ACHADOS

Principais vulnerabilidades identificadas:

- Elevada prevalência de dor **(92,6%)** e redução da vitalidade **(76,8%)**, indicando limitação funcional
- Suporte social fragilizado
- Dificuldades no autocuidado, com destaque para sedentarismo e descontrole glicêmico

Introdução

O envelhecimento populacional brasileiro associa-se ao aumento da prevalência de doenças crônicas, como o diabetes mellitus tipo 2 (DM2), exigindo da Atenção Primária à Saúde (APS) cuidado longitudinal e integral às pessoas idosas. Nesse contexto, o enfermeiro desempenha papel central na identificação de vulnerabilidades que impactam a autonomia e a qualidade de vida.

Objetivo

Identificar vulnerabilidades no cuidado de enfermagem a pessoas idosas com DM2 acompanhadas na APS.

Métodos

Estudo transversal, quantitativo, realizado com 323 pessoas idosas em uma Unidade Básica de Saúde do Distrito Federal. As vulnerabilidades foram identificadas por meio dos domínios da qualidade de vida avaliados pelo instrumento SF-6D, associados a informações clínicas relevantes para o cuidado de enfermagem.

Resultados

- Predomínio de comprometimento nos domínios físicos da qualidade de vida;
- Dor presente em **92,6%** dos participantes;
- Redução da vitalidade em **76,8%**, indicando limitação funcional;
- Aspectos sociais com menor comprometimento (**50,5%**), porém com fragilidade no suporte social;
- Sedentarismo e descontrole glicêmico em pessoas com maior tempo de diagnóstico, associados a dificuldades no autocuidado

Conclusão

Os achados evidenciam vulnerabilidades prioritárias para a prática do enfermeiro na APS, com foco no manejo da dor, incentivo à atividade física, fortalecimento do autocuidado e articulação do apoio social, contribuindo para o cuidado integral à pessoa idosa com DM2.

Universidade de Brasília (UnB)
GIULIA M. S. M. LEAL
Faculdade de Ciências e Tecnologias em Saúde (FCTS/UnB)

E-mail: giuliamatuszewski@gmail.com