Gráfico 4: Porcentagem de cobertura da Atenção Primária, taxa de ICSAB por hipertensão e taxa de ICSAB por diabetes mellitus do município de Japeri, 2011-2020.



Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro de 2011 a 2020.

2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026

MACEIÓ • ALAGOAS

Realização

ABEFACO
AAMFC

EFETIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA ASSISTÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: HAS E DM

Autores: Ana Paula Mattos Debossam; Emanuel da Silva Moreira De Souza; Mariana Luiza De Oliveira Fleury; Vanessa Bittencourt Ribeiro.
VInculo: Secretaria municipal de saúde - Rio de Janeiro



Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro de 2011 a 2020.

PRINCIPAIS ACHADOS DO SEU TRABALHO

Os resultados apontam para a importância de ampliar e qualificar a cobertura da APS, garantindo o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde. Em localidades onde houve aumento da cobertura, verificou-se uma tendência à redução das internações evitáveis, corroborando a hipótese de que uma APS robusta e bem estruturada pode contribuir significativamente para a redução dos agravos à saúde e para a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

Introdução
A Atenção Primária à Saúde (APS) é o nível de atenção central do Sistema Único de Saúde (SUS), baseado nos princípios de universalidade, integralidade, equidade e resolutividade. Ela coordena o cuidado, promove ações preventivas e resolutivas, e é fundamental no manejo de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como hipertensão e diabetes, especialmente diante do envelhecimento populacional e das mudanças epidemiológicas. A APS tem como objetivo resolver até 85% das demandas de saúde, reduzindo a sobrecarga de serviços hospitalares e promovendo a sustentabilidade do sistema. Indicadores como a taxa de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Básica (ICSAB) e a cobertura populacional da APS são essenciais para avaliar sua efetividade e acesso. O ICSAB mede a proporção de internações evitáveis pela APS, enquanto a cobertura populacional avalia a oferta e organização desse nível de atenção.

Objetivos
Identificar as ICSAB de HAS e DM e a relação entre ICSAB e o indicador de cobertura populacional da Atenção Primária. O

Métodos
O presente estudo é caracterizado como um estudo ecológico, retrospectivo, baseado na evolução temporal do indicador de cobertura populacional da Atenção Primária e nas taxas de internação por condições sensíveis à Atenção Básica. Foram analisados os municípios da região de saúde conhecida por Metropolitana II, por entender suas particularidades frente às demais regiões e municípios. Os dados deste estudo foram coletados em dezembro de 2024 no site do Datasus, do Ministério da Saúde. Foram analisados 3 indicadores de saúde: internações por condições sensíveis à Atenção Básica (ICSAB) - Taxa internação por diabetes mellitus, internações por condições sensíveis à Atenção Básica (ICSAB) - Taxa internação por hipertensão e cobertura populacional da Atenção Primária no estado do Rio de Janeiro.O recorte temporal analisado para os 3 indicadores foi o período de 2011 a 2020, abrangendo os últimos 10 anos com dados disponíveis no sistema da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.

Resultados
Alguns municípios avançam na ampliação da cobertura e não é observado uma diminuição direta das taxas de ICSAB por HAS e DM. Já outros municípios, apresentaram diminuição da cobertura da APS e não foi observado uma correspondência no aumento das taxas por ICSAB. Existe ainda, aqueles municípios que em que houve aumentos da cobertura da APS e das taxas de ICSAB por HAS e DM simultaneamente ou diminuição de ambos os indicadores em paralelo.

Conclusão/Considerações finais
A análise dos dados apresentados evidencia a relevância da Atenção Primária à Saúde (APS) na gestão das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como hipertensão arterial e diabetes mellitus, e a influência direta da cobertura populacional nesse contexto. De maneira geral, observou-se que municípios com maior cobertura de APS apresentaram, em determinados períodos, uma redução nas taxas de internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAB), especialmente por hipertensão. Essa relação reforça o papel essencial da APS como política e estratégia resolutiva na prevenção de complicações e na coordenação do cuidado.

Coloque legenda nas suas figuras

INSTITUIÇÃO: PREFC
AUTOR PRINCIPAL: Emanuel S. Moreira de Souza
VÍNCULO: Secretária municipal de Saúde - Rio de Janeiro

E-mail: emanueldasmoreira.25@gmail.com
Contatos: (22) 998366994