2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

CÂNCER DE PÊNIS COMO SENTINELA DA INJUSTIÇA SOCIAL: CONTEXTOS DE VULNERABILIDADE E A RESPOSTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO BRASIL

Lays Lins da Silva[1], Lyzandra Holanda Lopes Beserra[1], Alice Karoline de Souza Ferreira[1], Igor Duarte de Oliveira[1], Sérgio Lopes da Silva [1]

[1]Universidade Federal de Alagoas



Figura 1 - Fluxograma sobre os determinantes sociais da saúde e papel da APS no câncer de pênis.

PRINCIPAIS ACHADOS

- Observa-se tendência de aumento da mortalidade por câncer de pênis no Brasil no período analisado.
- A mortalidade apresenta marcante desigualdade regional, com maiores taxas nas regiões Norte e Nordeste.
- A concentração dos óbitos em regiões mais vulneráveis sugere influência dos determinantes sociais da saúde no adoecimento e no acesso ao cuidado.
- Os achados reforçam o papel estratégico da Atenção Primária à Saúde na prevenção, educação em saúde e detecção precoce da doença.

Introdução

O câncer de pênis, embora raro em países de alta renda, mantém relevância epidemiológica no Brasil, especialmente em contextos de vulnerabilidade social. A doença está associada a determinantes sociais da saúde e a falhas na prevenção e no diagnóstico precoce. Nesse contexto, a Atenção Primária à Saúde (APS) possui papel central na prevenção, educação em saúde e identificação precoce de lesões.

Objetivos

Analisar a mortalidade por câncer de pênis no Brasil entre 2014 e 2024, segundo regiões, discutindo desigualdades e implicações para a Atenção Primária à Saúde.

Métodos

Estudo ecológico descritivo com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS), considerando óbitos por câncer de pênis (CID-10 C60) entre 2014 e 2024. As taxas de mortalidade por 100.000 habitantes foram calculadas com base em dados populacionais do IBGE e estratificadas por região.

Resultados

- Entre 2014 e 2024 foram registrados 5.059 óbitos por câncer de pênis no Brasil, correspondendo a uma taxa média de 0,222/100.000 habitantes.
- Observou-se aumento do número de óbitos, passando de 388 em 2014 para 557 em 2024.
- As maiores taxas ocorreram no Nordeste (0,277) e Norte (0,262).
- Centro-Oeste (0,233), Sul (0,214) e Sudeste (0,178) apresentaram valores progressivamente menores.
- Os achados evidenciam desigualdade regional da mortalidade no país.



Figura 2 – Taxas de mortalidade por câncer de pênis no Brasil segundo regiões, 2014–2024 (por 100.000 habitantes).

Conclusão/Considerações finais

A mortalidade por câncer de pênis no Brasil apresenta importante desigualdade regional, associada a determinantes sociais da saúde. O enfrentamento desse agravo exige fortalecimento da APS, investimentos territoriais e políticas públicas voltadas à redução das iniquidades em saúde.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – Campus Arapiraca
LAYS LINS DA SILVA - layslins10@gmail.com
ACADÊMICA DE MEDICINA



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS