•**Comportamento de Risco:** 8,0% dos jovens tiveram relações sexuais sem preservativo sob efeito dessas substâncias.
•**Gravidade Extrema:** O consumo levou 5,0% dos adolescentes a buscarem atendimento em pronto-socorro ou hospitalização

2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

Envolvimento em situações de risco devido ao uso de álcool e/ou outras drogas: um estudo com adolescentes do ensino médio

Franciele Foschiera Camboin, Carlos Augusto Lopes, Franciéle Marabotti Costa Leite, Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

O uso de drogas na adolescência não é apenas um problema de saúde isolado, mas um fator que amplia drasticamente a **vulnerabilidade social** e o **insucesso escolar.**

Introdução

O uso de álcool e drogas na juventude gera graves riscos à saúde e prejuízos sociais. Investigar essa prevalência é fundamental para justificar e nortear políticas públicas de prevenção e intervenção precoce nesse público.

Objetivos

Identificar a prevalência entre o uso combinado de álcool e drogas entre adolescentes e suas motivações.

Métodos

Trata-se de um estudo transversal realizado em 63 escolas da Grande Vitória.
Foram realizadas análises descritivas de frequências e prevalências, utilizando o software Stata 17.0.
Para o processamento estatístico e caracterização da amostra de 4.614 estudantes.

Resultados

- Os resultados demonstram que 7,0% dos adolescentes sofreram acidentes ou ferimentos no último ano devido ao uso de substâncias.
- No contexto social e acadêmico, 8,2% envolveram-se em brigas.
- 6,0% tiveram prejuízos em provas e 6,6% faltaram à escola ou trabalho.
- 5,2% frequentaram essas instituições embriagados.
- 8,0% tiveram relações sexuais sem preservativo.
- A gravidade do consumo é reforçada por 3,2% de vítimas de roubo e 5,0% que necessitaram de atendimento em pronto-socorro ou hospitalização decorrente do uso de álcool e outras drogas.

Conclusão/Considerações finais

O uso de drogas na adolescência amplia riscos sociais e de saúde. O estudo mapeou que entre 3,2% e 8,2% dos jovens sofrem consequências diretas do consumo.
A conclusão reforça a necessidade de intervenção na rede básica de saúde para enfrentar a problemática.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE
E-mail: smfran@hotmail.com.br
Contatos: 45-999229549



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO — DOCETE OMNES GENTES
LAVISA
PPGSC PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA
unioeste Universidade Estadual do Oeste do Paraná