2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

Abordagem integrada para reavaliação do uso crônico de psicotrópicos

Letícia Coelho Bortoni
Gabriel de Oliveira Barros

Hospital Israelita Albert Einstein

Roda do chá sobre *Melissa officinalis* com reconhecimento da planta na horta medicinal construída na UBS Jardim das Palmas

Entre os pacientes avaliados em uso de fluoxetina há mais de 1 ano, 50% apresentaram sintomas leves de ansiedade e depressão, 18,5% moderados e 32,5% graves. O domínio físico da qualidade de vida mostrou maior comprometimento. Após reavaliação clínica, 42,3% tiveram modificação do tratamento, com suspensão da medicação em 23% e redução de dose em 15%

Introdução

A prescrição de psicotrópicos para o tratamento de transtornos psiquiátricos ou sofrimento emocional e social é uma prática comum na Atenção Primária, e sua utilização prolongada e de forma abusiva pode levar a efeitos adversos, mudanças comportamentais e emocionais. Além disso, a literatura mostra que o crescente uso de psicotrópicos está mais ligado ao uso prolongado do que a novas prescrições. A fluoxetina é um medicamento com ação antidepressiva por inibir a recaptação de serotonina no SNC e está disponível no SUS. Ela é uma ferramenta terapêutica para tratamento de saúde mental, porém observa-se que em meio a tantas demandas abordadas na consulta da Atenção Primária, dificilmente sua prescrição é revisitada fazendo com que os pacientes permaneçam utilizando a medicação mesmo quando ela não se faz mais necessária.

Objetivos

Avaliação dos pacientes que utilizam psicotrópicos há mais de um ano na UBS Jardim das Palmas e oferecer mais qualidade assistencial com terapias integrativas como fitoterapia (horta medicinal e roda do chá), atividade física, psicoterapia em grupo e auriculoterapia. Qualificar a prescrição e acompanhamento de psicotrópicos na atenção primária. Ao estabelecer um protocolo, o médico da ESF terá uma ferramenta mais objetiva para tomada de decisão de prescrição, suspensão, troca ou otimização de dose dos psicotrópicos. A avaliação da qualidade de vida dos pacientes através da ferramenta WHOQOL-bref auxilia a identificar a necessidade da abordagem de outros domínios (sociais, ambientais, físico e psicológico).

Métodos

Avaliação dos psicotrópicos mais utilizados na UBS Jardim das Palmas de forma prolongada entre 2023 e 2024. Aplicação das escalas de ansiedade e depressão de Hamilton e de WHOQOL-bref em uma amostra de pacientes que utilizam fluoxetina há mais de 1 ano.

Resultados

- Observou-se que os medicamentos mais utilizados de forma prolongada foram Sertralina, Fluoxetina, Amitriptilina e Clonazepam. A escolha pela fluoxetina como foco se deu por ser amplamente prescrita e de fácil acesso no SUS.
- Entre os pacientes avaliados, 50% apresentaram sintomas leves de ansiedade e depressão, 18,5% moderados e 32,5% graves. Em relação à qualidade de vida, o domínio físico foi o que apresentou maior fragilidade, seguido do ambiental, o que ajuda a identificar o tipo de intervenção mais adequado e em quais casos tem ocorrido medicalização de situação social.
- Após reavaliação clínica, 42,3% tiveram modificação do tratamento, com suspensão da medicação em 23% e redução de dose em 15%. . Dos pacientes reavaliados, 42,3% tiveram mudanças no tratamento, 23% tiveram medicação suspensa e 15% redução da dose.
- Como intervenção, foi construída uma horta com plantas medicinais na UBS onde os pacientes participam do processo de cultivo e tem acesso a fitoterapia para alívio dos sintomas de ansiedade e insônia. Há troca de conhecimento cultural e ancestral do uso de plantas medicinais com a equipe de profissionais de saúde capacitados em fitoterapia. Além disso, os pacientes foram convidados a participarem do grupo de atividade física, auriculoterapia e psicoterapia.

Conclusão/Considerações finais

A alta quantidade de pacientes com sintomas leves que fazem uso prolongado de psicotrópicos reforça a necessidade de reavaliação contínua dos pacientes em uso de psicotrópicos, além de ofertar terapias complementares para seu tratamento. A avaliação da qualidade de vida é importante para traçar estratégias de intervenções terapêuticas visto que o transtorno mental tem origem multifatorial.

INSTITUIÇÃO
LETÍCIA COELHO BORTONI
Hospital Israelita Albert Einstein

E-mail: leticia.bortoni@einstein.br

EINSTEIN Hospital Israelita