2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

INCORPORAÇÃO DA BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOS DE HANSENÍASE NA PRÁTICA DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Edilma Gomes Rocha Cavalcante [1]
Evelly da Silva Nascimento[1]
Andreza Gysllanny Delmondes Saraiva[1]
Denyse Alves Vieira[2]

1 Universidade Regional do Cariri (URCA)
2 Secretária Municipal de Saúde de Farias Brito-Ce

Registros fotográficos de momentos da capacitação com os profissionais de saúde em Farias Brito, CE, Brasil.

PRINCIPAIS ACHADOS DO ESTUDO

Antes da capacitação, observaram-se limitações no reconhecimento dos sinais clínicos, insegurança na suspeição diagnóstica e ausência de instrumentos para a busca ativa. Após a capacitação, os enfermeiros realizaram em pares os testes de sensibilidade (térmica, dolorosa e tátil) e avaliação neurológica simplificada, demonstrando maior segurança na identificação de sinais e sintomas, ampliação do olhar clínico para melhor organização do acompanhamento dos usuários.

Introdução

A hanseníase demanda vigilância contínua na Atenção Primária à Saúde, especialmente em territórios endêmicos, onde o diagnóstico oportuno ainda constitui um desafio. Nesse contexto, o enfermeiro exerce papel estratégico na organização do cuidado, na avaliação clínica e no acompanhamento de casos suspeitos.

Objetivos

Objetivou-se analisar as mudanças na prática dos enfermeiros relacionadas à incorporação da busca ativa de casos suspeitos de hanseníase em áreas endêmicas do município de Farias Brito–CE.

Métodos

Trata-se de um estudo descritivo, realizado entre outubro de 2024 e setembro de 2025, com enfermeiros de equipes de Saúde da Família submetidos à capacitação sobre hanseníase, exame dermatoneurológico e avaliação neurológica simplificada, além da necessidade de busca ativa por meio da utilização do Questionário de Suspeição de Hanseníase (QSH).

Resultados

Antes da capacitação, observaram-se limitações no reconhecimento dos sinais clínicos, insegurança na suspeição diagnóstica e ausência de instrumentos para a busca ativa. Após a capacitação, os enfermeiros realizaram em pares os testes de sensibilidade (térmica, dolorosa e tátil) e avaliação neurológica simplificada, demonstrando maior segurança na identificação de sinais e sintomas, ampliação do olhar clínico para melhor organização do acompanhamento dos usuários.

Conclusão/Considerações finais

Conclui-se que a capacitação associada ao uso do QSH pode aumentar a prática dos enfermeiros e pode fortalecer as ações de vigilância epidemiológica da hanseníase no território

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
EDILMA GOMES ROCHA CAVALCANTE
PROFESSORA ASSOCIADA

E-mail: edilma.gomes@urca.br

URCA
Universidade Regional do Cariri