2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

USO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E DETERMINANTES VINCULADOS ENTRE PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Daiana Lima Souza[1], Larissa Meira Gomes[1], Reinilson da Silva e Silva[1], Renara Meira Gomes de Carvalho[2]
[1]Graduando em Enfermagem pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
[2]Docente pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

Entre profissionais da Enfermagem, o uso de substâncias psicoativas muitas vezes não é recreativo, mas funcional. Diante de jornadas extensas, privação do sono e alta exigência assistencial, substâncias como ansiolíticos e estimulantes passam a ser usadas para sustentar o desempenho. Isso indica que o consumo está menos ligado à escolha individual e mais às condições de trabalho, funcionando como adaptação às exigências do ambiente hospitalar.

Introdução

O uso de substâncias psicoativas entre profissionais da enfermagem tem se destacado como um problema de saúde ocupacional, especialmente no contexto hospitalar. Esses profissionais estão expostos a longas jornadas, alta demanda assistencial e sobrecarga física e emocional, fatores que favorecem o adoecimento mental.

Nesse cenário, o consumo dessas substâncias surge como estratégia de enfrentamento do estresse. Além disso, o fácil acesso a medicamentos pode contribuir para o uso indevido, impactando a saúde do trabalhador e a qualidade da assistência.

Objetivos

Analisar, a partir da literatura científica, a prevalência e os fatores associados ao uso abusivo de substâncias psicoativas entre profissionais da enfermagem.

Métodos

Trata-se de uma revisão bibliográfica, publicada nas bases SciELO, Google Acadêmico e PubMed, no período de 2017 a 2023.

Resultados

Os estudos evidenciam que o uso de substâncias psicoativas entre profissionais da enfermagem é frequente no contexto hospitalar, com destaque para o consumo de álcool, seguido por sedativos, ansiolíticos e tabaco. A prevalência varia entre aproximadamente 10% e 40%. Entre os principais fatores associados, destacam-se o estresse ocupacional, a sobrecarga de trabalho, a insônia e o fácil acesso a medicamentos, sendo o uso frequentemente relacionado como estratégia de enfrentamento das demandas laborais.

Conclusão/Considerações finais

Por fim, conclui-se que o consumo abusivo dessas substâncias entre profissionais da enfermagem está relacionado às condições de trabalho no ambiente hospitalar, especialmente à sobrecarga, ao estresse e ao fácil acesso a medicamentos. Trata-se de um problema que vai além do indivíduo, envolvendo fatores estruturais e organizacionais do processo de trabalho em saúde.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
AUTOR PRINCIPAL: DAIANA LIMA SOUZA
GRADUANDA DE ENFERMAGEM

E-mail: limasouzadaiana@gmail.com