

Guide de Référence des Codes Sig

Référence Rapide pour les Professionnels de Santé

Fréquence et Horaire

Abréviation	Origine Latine	Signification
QD	quaque die	Une fois par jour
BID	bis in die	Deux fois par jour
TID	ter in die	Trois fois par jour
QID	quater in die	Quatre fois par jour
Q4H	quaque 4 hora	Toutes les 4 heures
Q6H	quaque 6 hora	Toutes les 6 heures
Q8H	quaque 8 hora	Toutes les 8 heures
Q12H	quaque 12 hora	Toutes les 12 heures
PRN	pro re nata	Au besoin
STAT	statim	Immédiatement

Instructions de Timing

Abréviation	Origine Latine	Signification
AC	ante cibum	Avant les repas
PC	post cibum	Après les repas
QAM	quaque ante meridiem	Chaque matin
QPM	quaque post meridiem	Chaque soir
QHS	quaque hora somni	À l'heure du coucher
QOD	quaque altera die	Un jour sur deux

Voies d'Administration

Abréviation	Origine Latine	Signification
PO	per os	Par voie orale
IV	intravenous	Intraveineux
IM	intramuscular	Intramusculaire
SQ/SC	subcutaneous	Sous-cutané
SL	sublingual	Sous la langue
TOP	topical	Application topique
PR	per rectum	Par voie rectale
OD	oculus dexter	Œil droit
OS	oculus sinister	Œil gauche
OU	oculus uterque	Les deux yeux
AD	auris dextra	Oreille droite
AS	auris sinistra	Oreille gauche
AU	auris uterque	Les deux oreilles

Formes Posologiques

Abréviation	Origine Latine	Signification
tab	tabella	Comprimé
cap	capsula	Capsule
susp	suspensio	Suspension
sol	solutio	Solution
ung	unguentum	Pommade
cr	cremor	Crème
gtt	guttae	Gouttes
supp	suppositorium	Suppositoire
inj	injectio	Injection

Référence Éducative Uniquement — Toujours vérifier les codes sig en pratique clinique

© 2025 Pahtia Labs | pahtialabs.com