

Fourier Transformation I

Proof $-i\lambda F(\lambda)$ is $f'(x)$'s Fourier Transformation

Given $F(\lambda) = F_x[f(x)](\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda x} f(x) dx$

$$F_x[f'(x)](\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda x} f'(x) dx$$

According to integral by parts

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Let $dv = f'(x)dx$, $u = e^{i\lambda x}$. So $v = f(x)$, $du = i\lambda e^{i\lambda x} dx$

$$F_x[f'(x)](\lambda) = \left[f(x)e^{i\lambda x} \right]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} f(x)(i\lambda e^{i\lambda x}) dx$$

Because $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$

$$F_x[f'(x)](\lambda) = -i\lambda \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{i\lambda x} dx = -i\lambda F(\lambda)$$

Fourier Transformation II

Proof $(-i\lambda)^n F(\lambda)$ is $f^{(n)}(x)$'s Fourier Transformation

Given $F(\lambda) = F_x[f(x)](\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda x} f(x) dx$

$$F_x[f^{(n)}(x)](\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda x} f^{(n)}(x) dx$$

According to integral by parts

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Let $dv = f^{(n)}(x)dx$, $u = e^{i\lambda x}$. So $v = f^{(n-1)}(x)$, $du = i\lambda e^{i\lambda x} dx$

$$F_x[f^{(n)}(x)](\lambda) = f^{(n-1)}(x)e^{i\lambda x} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} f^{(n-1)}(x)(i\lambda e^{i\lambda x}) dx$$

Because $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f^{(n-1)}(x) = 0$

$$\begin{aligned} F_x[f^{(n)}(x)](\lambda) &= -i\lambda \int_{-\infty}^{\infty} f^{(n-1)}(x)e^{i\lambda x} dx = -i\lambda F_x[f^{(n-1)}(x)](\lambda) \\ &= (-i\lambda)^2 F_x[f^{(n-2)}(x)](\lambda) \\ &= \dots = (-i\lambda)^n F_x[f(x)](\lambda) = (-i\lambda)^n F(\lambda) \end{aligned}$$

Fourier Inverse Transformation I

Given $F(\lambda) = e^{i\mu\lambda + \frac{i^2\lambda^2\sigma^2}{2}}$, get $f(x)$ by Fourier Inverse Transformation

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-i\lambda x} F(\lambda) d\lambda \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda x} e^{i\mu\lambda + \frac{i^2\lambda^2\sigma^2}{2}} d\lambda \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda(\mu-x) + \frac{i^2\lambda^2\sigma^2}{2}} d\lambda \\ &= \frac{1}{2\pi} \times \left[\frac{1}{i(\mu-x) + i^2\sigma^2\lambda} e^{i\lambda(\mu-x) + \frac{i^2\lambda^2\sigma^2}{2}} \right]_{-\infty}^{\infty} \\ &= \frac{1}{2\pi} \times [0 - 0] = 0 \end{aligned}$$