

PANDUAN BETERNAK DAN MERAWAT UNGGAS

Prof. Drh. A.Ilyas. MSc., PhD



Abstract

Membuat pakan unggas :

Saya pilih bahan baku yang mudah dikenali dan dianalisa dengan mata

Sehingga kita tidak tergantung dengan laboratorium

Semua Ilmu sudah saya tulis dengan detail.

Tujuan saya adalah mencerdaskan semua peternak ayam se Indonesia bisa mandiri dan bisa membuat pakan Full selfmix.

Pada saat ini saya sediakan Premix ILY untuk imbuhan pakan jadi dan pakan yang menggunakan konsentrat di banyak kota untuk memperbaiki produksi para peternak.

Berikutnya saya berharap bisa membuat pakan sendiri (full selmix) dan para agen premix ILY bisa menjadi agen feed additif di tiap daerah yang sudah ada sehingga peternak bisa lebih efisien dalam membuat pakan.

Penulis : Prof. Drh. A.Ilyas. MSc., PhD.

Perawatan Kondisi ayam sehat dan stamina bagus

- **Sterilisasi minuman ayam**

Dosis Kaporit (cair)

- *Kaporit* 7 gr
- *Air* 1 ltr
- *Waktu tunggu* 4 jam

Dosis Bayclin (Cair)

- *Bayclin* 80 ml
- *Air* 1000 ltr
- *Waktu tunggu* 4 jam

BAYCLIN

air (liter)	bayclin (ml)
1	0,08
2	0,16
3	0,24
4	0,32
5	0,4
6	0,48
7	0,56
8	0,64
9	0,72
10	0,8
20	1,6

KAPORIT

air (liter)	kaporit mg
1	0,007
2	0,014
3	0,021
4	0,028
5	0,035
6	0,042
7	0,049
8	0,056
9	0,063
10	0,07
20	0,14

- **Mengatasi bau dan sterilisasi lingkungan rumah/kandang**

Mengatasi amoniak (semprot)

- *Asam sitrat* 25 gr
- *Air* 1 ltr
- *Waktu* aplikasi saat amoniak sudah tercium

Desinfektan lingkungan rumah (semprot)

- *Wipol* 15 ml
- *Sabun cair* 5 ml
- *Air* 1 ltr

Atau

- *Povidone iodine* 150 ml
- *Sabun cair* 5 ml
- *Air* 15 ltr

Mengurangi lalat

- Wipol 15 ml
 - Air 1 ltr
 - Waktu semprot tiap hari sekeliling kandang dan kotoran
- **Utk broiler saat cuaca panas dapat menurunkan kematian krn dehidrasi (minuman)**
 - Asam sitrat 1 gr
 - Soda kue 1 gr
 - Gula merah 10 gr
 - Air 1 ltr
 - **Utk stamina dan kesehatan Layer dan boiler (Pakan)**
 - Asam sitrat 1 kg
 - Jahe bubuk 150 gr
 - Kunyit bubuk 150 gr
 - Temu Lawak bubuk 150 gr
 - Pakan 1000 kg
 - **Untuk chick in**
 - Asam sitrat 1 gr
 - Soda kue 1 gr
 - Gula jawa 10 gr
 - Air 1 ltr
 - Waktu Berikan saat 5 jam pertama

PERAWATAN SAAT KONDISI AYAM SAKIT

- **Obat Cekrek Manjur**
 - Jahe 25 gr
 - Kencur 25 gr
 - Air 3 ltr
 - Berikan sore hari selama 6 hari
- **Jamu Gawat Darurat saat wabah**
 - Jahe 25 gr
 - Kunyit 25 gr
 - Temu Lawak 25 gr
 - Kencur 25 gr
 - Asam jawa 25 gr
 - Gula Merah 50 gr
 - Air 3 ltr

- **Obat semprot Pilek**
 - GPU 30 ml
 - Iodin 150 ml
 - Detergent cair 5 ml
 - Kocok dengan air 250 ml
 - Air 15 l
 - Waktu semprot sore

PAKAN AYAM

- **Cara membuat pullet super**
 - Untuk Chick in Layer
 - 0 sd 7 mg beri par DOC campur konsentrat grower 20%
 - 8 mg sd 16 mg beri Starter campur konsentrat grower 20%
 - 17 mg sd 21 mg campur stater dengan grower separo separo atau par g campur 20% konsentrat grower
 - Bisa juga gunakan konsentar grower, jagung katul, naikan jumlah konsentrat 5 % dan kurangi jumlah katul 5% dari anjuran pabrik (Kons 40, jagung 50 dan dedak10)
- **Catatan untuk ayam dengan BB rendah atau tidak masuk standard**
 - Umur 7 mg, bila BB tidak masuk standard lanjutkan prestater dengan campuran konsentrat grower 20% sampai berat badan mencapai target
 - Juga untuk umur 16 mg pada ayam yang tidak mencapai target BB lanjutkan campuran stater dengan konsentrat grower 20% sampai target berat badan tercapai
 - Bisa juga gunakan konsentrat 45 jagung pecah 50 dan dedak 5

Penulis Drh. A.Ilyas. MSc., PhD.

Des 2019

AYAM KAMPUNG PETELUR / KUB

KONSENTRAT 33

JAGUNG 50

DEDAK 17

PREMIX0.2

GRIT 2 →UTK TELOR

Phase pertumbuhan pullet (ayam petelur yang siap bertelur dan berusia sekitar 16 minggu)

-0 sd 14 hari

-15 sd 35 hari

-35 sd 70 hari

-10 mg sd 21 mg

Pemisahan ini saya lakukan seiring perubahan kebutuhan asam amino ayam untuk mengoreksi pertumbuhan, saya lakukan hal berikut

Saya akan mengoreksi pertumbuhan pullet setelah umur 35 hari

Ayam yang mempunyai bobot dibawah standar pada usia 35 hari akan saya beri formula 15 sd 35 hari minimal dua minggu

Koreksi umur 70 hari atau 10mg, ayam yang mempunyai bobot dibawah rata rata akan saya beri pakan formula 35 sd 70 hari sampai 16mg

setelah 16 minggu semua mendapat formula 10mg sd 21mg

Formula layer 1sd 35 hari

Protein 22.6%

Me 2900

Jagung. 43.86

Pollard. 14.32

Sbm46% 34.72

Miny gor. 2.26

Mcp. 1.6

Tep bat. 1.61

Garam. 0.44

Meth. 0.44

Lys. 0.31

Treon. 0.2

Choline. 0.1

Vit hc. 0.03

Min mix. 0.11

Pakan Layer (fase menghasilkan telur)

Layer = ras Petelur

Umur 0 sd 14 hari

pakan starter 85%

Pakan udang atau pakan lele starter 15%

=====

Umur 14 sd 35 hari

Me 2850

Cp 22.49

Jagung. 52.61%

Dedak. 6.36%

Sbm 46. 36.31%

Dcp. 2.28%
Tep batu 0.9%
Garam 0.45%
Meth 0.44%
Lys 0.23%
Threo. 0.18%
Choline 0.1%
Vit 0.03%
Min 0.11%

Saat umur 35 hari berat badan belum masuk, perpanjang penggunaan 15 35 minimal 2 minggu

=====

Untuk 35 70 hari

Me 2800
Prot. 20.5%
Jagung 49.76%
Katul 14.72%
Sbm 46. 30.79%
Dcp 2.23%
Tep batu 0.95%
Garam 0.44%
Meth 0.38%
Lys 0.3%
Threo 0.18%
Choline 0.1%
Vit 0.03%
Min mix 0.11%

Bila berat badan saat usia 70 hari belum masuk, perpanjang penggunaan 35 70 minimal sampai 16 mg

=====

Untuk usia 10mg sd 21 mg

Me 2700
Protein 17.6
Jagung 44.99
Polard. 32.26
Sbm 46. 18.63
Dcp. 1.74
Tepung batu. 1.33
Garam. 0.42
Meth 0.21
Lysin. 0.09
Threonine. 0.06
Choline. 0.1
Vit mix. 0.03
Mineral mix. 0.11
Sitrat 1 kg perton
Enzyme

Untuk berat badan yang belum masuk saat 10 minggu lanjutkan formula 35 70 hari samapai 16 minggu

=====

Pakan puncak

Me 2700
Cp 17%
Jagung 59.74%
Katul 2.4%
Sbm 44. 9.7%
Sbm 46. 15.95%
Dcp 2.44 %
T batu/menir 8.86%
Garam 0.45%
Methionine 0.22%
Threonine 0.02%
Choline 0.1%
Vit 0.03%
Mineral mix 0.11%
Fe besi 100g perton
Cu coopper 200g perton
Toxin binder
Enzyme

Ga usah cari sbm 44, pakai sbm 46 semua juga untuk sbm 44 nya

=====

Post peak feed

Me 2650
Cp 16.37%
Jagung. 55.35%
Katul separator. 8.63%
Sbm 44. 23.71%
Dcp 2.38%
Menir batu 8.9%
Garam 0.45%
Methionine. 0.21%
Lysin 0.07%
Threonine 0.05%
Choline 0.1%
Vit mix 0.03%
Mineral mix 0.11%
Enzyme
Antitoxin
Fe 100g perton
Cu 200g perton

Penyusun Drh., A. Ilyas., MSc., PhD.
2019

Above 24°C	Diet	Starter	Grower	Pullet	Pre-lay
	Units	0 - 5 weeks	5 - 10 weeks	10 - 16 weeks	112 days to
		1 - 35 days	35 - 70 days	70 - 112 days	2% lay
Metabolisable energy	Kcal/kg	2950-2975	2850-2875	2750	2750
	MJ/kg	12.3-12.4	11.9-12.0	11.5	11.5
Crude protein	%	20.5	20.0	16.8	17.5
Methionine	%	0.52	0.47	0.35	0.42
Methionine + Cystine	%	0.86	0.80	0.63	0.70
Lysine	%	1.16	1.03	0.78	0.84
Threonine	%	0.78	0.69	0.53	0.59
Tryptophan	%	0.217	0.207	0.175	0.190
Digestible amino acids					
Dig. Methionine	%	0.48	0.43	0.32	0.40
Dig. Meth. + Cystine	%	0.78	0.69	0.56	0.63
Dig. Lysine	%	1.00	0.89	0.67	0.74
Dig. Threonine.	%	0.67	0.61	0.45	0.50
Dig. Tryptophan	%	0.195	0.175	0.152	0.163
Major minerals					
Calcium	%	1.05 - 1.10	0.95 - 1.10	0.95 - 1.05 ¹	2.1 - 2.2 ¹
Available Phosphorus	%	0.48	0.44	0.38	0.44
Chloride minimum	%	0.16	0.16	0.15	0.15
Sodium minimum	%	0.17	0.17	0.16	0.16

¹ It is possible to supply 50% of the calcium in granular form (2-4mm diameter)

Komposisi pakan LAYER by Prof Ilyas

Bahan	1 sd 14 hari	1 sd 35 hari	14 sd 35 hari	35 sd 70 hari	10mg sd 21 mg	Pakan puncak	Post peak feed
metabolisme	pakan starter 85% Pakan udang atau pakan lele starter 15%	2900	2850	2800	2700	2700	2650
protein kasar		22,6	22,49	20,5	17,6	17	16,37
Jagung.		43,86	52,61	49,76	44,99	59,74	55,35
Pollard.		14,32	6,36	14,72	32,26	2,4	8,63
Sbm 44 /(46)		34,72	36,31	30,79	18,63	9,7/15,95	23,71
Minyak gor.		2,26					
Dcp. / MCP		1,6	2,28	2,23	1,74	2,44	2,38
Tep batu. /Grit		1,61	0,9	0,95	1,33	8,86	8,9
Garam.		0,44	0,45	0,44	0,42	0,45	0,45
Meth.		0,44	0,44	0,38	0,21	0,22	0,21
Lysin.		0,31	0,23	0,3	0,09		0,07
Threonin.		0,2	0,18	0,18	0,06	0,02	0,05
Cholin.		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vit.		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Mineral.		0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Fe besi					sitrat 1 kg /ton	100 gr/ton	100 gr/ton
Cu cooper						200 gr/ton	200 gr/ton
Toxin binder						Toxin binder	Toxin binder
Enzyme					Enzyme	Enzyme	Enzyme
total		100	100	99,99	99,97	84/90,5	99,99

PAKAN AYAM PEDAGING (JOPER,KUB.KAMPUNG,BEBEK ,PUYUH)

Pakan bebek pedaging juga ayam kub Dari awal sampai panen Juga untuk doq anak puyuh

Untuk vit mix Kebutuhan vit D3 sebanyak 3000iu per kg 3 juta iu per ton

Me 3150

Cp 21.60

Jagung.	51.43
Pollard.	3.65
Sbm (46)	34.65
Minyak gor.	5.49
Dcp.	2.3
Tep batu.	0.91
Garam.	0.45
Meth.	0.42
Lysin.	0.29
Threonin.	0.18
Cholin.	0.1
Vit.	0.02
Mineral.	0.11

komposisi pakan pedaging

Bebek , Joper , KUB By Prof Ilyas

Bahan	doc sd panen
metabolisme	3150
protein kasar	21,6
Jagung.	51,43
Pollard.	3,65
Sbm 44 /(46)	34,65
Minyak gor.	5,49
Dcp. / MCP	2,3
Tep batu. /Grit	0,91
Garam.	0,45
Meth.	0,42
Lysin.	0,29
Threonin.	0,18
Cholin.	0,1
Vit.	0,02
Mineral.	0,11
Fe besi	
Cu coopper	
Toxin binder	
Enzyme	
Total	100

Terimakasih kepada Prof. Drh. A.Ilyas. MSc., PhD

Atas karya dan jasanya

Membuat mudah bagaimana beternak unggas

Semoga semua ilmu nya bermanfaat bagi peternak negeri ini

Dann mendapatkan keberkahan dari Allah SWT

Aamiin

Semoga bermanfaat