

学号
姓名
专业
年级
院/系

安徽大学 2016—2017 学年第一学期

《高等数学 A (一)》期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

题号	一	二	三	四	总分
得分					
阅卷人					

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得分	
----	--

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{x^2+x+1} (\sin x + \cos x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 已知函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+f(x)\sin x} - 1}{e^{2x} - 1} = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设函数 $y = f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设函数 $f(x)$ 在 $x=2$ 的某邻域内可导, 且 $f'(x) = e^{f(x)}$, $f(2) = 1$, 则 $f'''(2) = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得分	
----	--

6. 下列关于数列 $\{a_n\}$ 的极限是 a 的定义, 错误的是 ()

- A. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $a_n \in U(a, \varepsilon)$
- B. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有无穷多项 a_n , 使得 $|a_n - a| < \varepsilon$
- C. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < c\varepsilon$, 其中 c 是正常数
- D. 对任意给定 $m \in \mathbb{N}^+$, 存在 $m \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \frac{1}{m}$

7. 设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时 ()
- A. $f(x)$ 是 x 的高阶无穷小 B. $f(x)$ 是 x 的低阶无穷小
- C. $f(x)$ 与 x 是等价无穷小 D. $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小

8. 设函数 $f(x) = \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}}$, 则下列说法正确的是 ()
- A. $x=0$ 是可去间断点 B. $x=0$ 是跳跃间断点
- C. $x=1$ 是可去间断点 D. $x=1$ 是跳跃间断点

9. 下列函数在区间 $(0, +\infty)$ 内有界的是 ()
- A. $x \sin x$ B. $x \cos x$
- C. $\frac{\sin x}{x}$ D. $\frac{\cos x}{x}$

10. 设 $y = f\left(\frac{x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 则 $\frac{dy}{dx}|_{x=0} =$ ()
- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$
- C. $\frac{\pi}{4}$ D. π

三、计算题 (每小题 8 分, 共 56 分)

得分	
----	--

11. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \right)$.

12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\sin x} - 1)^3 \cos x}{(1 - \cos x) \ln(1+x)}$

13. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}}$.

14. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$.

15. 求常数 a, b 的值, 使得 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1-ax}-1}{x}, & x < 0, \\ ax+b, & 0 \leq x \leq 1, \\ \arctan \frac{1}{x-1}, & x > 1 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内是连续函数.

16. 函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \ln \sqrt{1+t^2} \\ y = \arctan t \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

17. $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 求 $f'(x)$, 并讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

四、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

得分	
----	--

18. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < 3$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)}$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛.

19. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)f(1) > 0$, $f(0)f(\frac{1}{2}) < 0$
证明: 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi) + f(\xi) = 0$.