Analyse 3 - Acces aux soins et depenses de sante

Nigeria GHS Panel Wave 4 (2018)

AUTHORS
Abdoul Aziz BA
Parfait Jemmy Prodige NGOYI

PUBLISHED
March 17, 2026

1 Introduction

Ce rapport analyse les episodes de maladie, les types de soins consultes et les couts de sante supportes par les menages nigerians a partir du Nigeria General Household Survey (GHS) Panel Wave 4 (2018). Les donnees couvrent **26 556 individus** issus de menages urbains et ruraux.

2 Methodologie

2.1 Sources de donnees

Le Nigeria GHS Panel est une enquete longitudinale conduite par le National Bureau of Statistics (NBS) du Nigeria en partenariat avec la Banque Mondiale (LSMS-ISA). La Wave 4 couvre la periode 2018-2019.

2.2 Variables analysees

Characteristic	Overall N = 5,703[1]	Homme N = 2,959[1]	Femme N = 2,744[1]
Groupe age			
0-14	2,419 (44%)	1,395 (49%)	1,024 (39%)
15-24	741 (13%)	398 (14%)	343 (13%)
25-34	648 (12%)	233 (8.2%)	415 (16%)
35-49	954 (17%)	414 (15%)	540 (20%)
50-64	551 (10%)	292 (10%)	259 (9.8%)
65+	181 (3.3%)	113 (4.0%)	68 (2.6%)
Unknown	209	114	95

[1] n (%)

Characteristic	Overall N = 5,703[1]	Homme N = 2,959[1]	Femme N = 2,744[1]
Maladie/Blessure			
Non	4,359 (91%)	2,337 (93%)	2,022 (89%)
Oui	439 (9.1%)	187 (7.4%)	252 (11%)
Unknown	905	435	470

[1] n (%)

2.3 Methodes statistiques

Les analyses suivantes ont ete realisees : Taux de morbidite avec intervalles de confiance a 95%, test du Chi-deux et V de Cramer pour les associations, test de Wilcoxon pour la comparaison de medianes, et visualisations : barplots, histogrammes, violin plots.

3 Question 13 - Taux de morbidite

3.1 Resultats





3.2 Interpretation

Le taux de morbidite global est de **9.31%**. Les femmes (**11.1%**) sont plus touchees que les hommes (**7.4%**). Le taux augmente avec l'age, passant de **5.7%** chez les 0-14 ans a **24%** chez les 65 ans et plus.

4 Question 14 - Types de maladies declarees

4.1 Resultats



4.2 Interpretation

Le paludisme est la maladie la plus frequente avec **2 039 cas (41.7%)**. Les douleurs corporelles arrivent en 2eme position (1 411 cas). Les maladies infectieuses dominent le profil epidemiologique du Nigeria.

5 Question 15 - Recours aux soins

5.1 Resultats



5.2 Interpretation

Le chimiste est le prestataire le plus consulte (**41.7%**), suivi du medecin (**20.7%**). **14.1%** des individus malades n'ont consulte personne, soulignant les barrieres d'acces aux soins.

6 Question 16 - Distribution des depenses de sante

6.1 Resultats



6.2 Statistiques par decile

Depenses de sante par decile (Naira)

decile	Min	Mediane	Max	Moyenne
1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0
2	0.0000	0.0000	304.1667	37.1
3	304.1667	735.8333	1216.6667	746.6
4	1216.6667	1825.0000	2433.3333	1787.4
5	2433.3333	3041.6667	3650.0001	3011.5
6	3650.0001	4623.3332	5779.1666	4639.0
7	5779.1669	7097.2220	8533.3335	7094.3
8	8550.0000	10950.0000	13909.1668	11041.9
9	13991.6665	18250.0000	26158.3339	18883.2
10	26158.3340	43191.6680	1250000.0000	66449.6

6.3 Interpretation

Les depenses de sante presentent une distribution fortement asymetrique. La mediane est de **3 650 Naira** avec **494 valeurs aberrantes**. Les depenses d'hospitalisation sont plus dispersees que les consultations.

7 Question 17 - Recours aux soins x Quintile

7.1 Resultats

Tableau de contingence recours x quintile

	1	2	3	4	5
Non consulte	181	166	163	167	221
Consulte	815	829	832	828	774

```
Chi-deux: 15.865

p-value: 0.0032

V de Cramer: 0.0565
```



7.2 Interpretation

Le test du Chi-deux est significatif (**p = 0.003**), indiquant une association entre le recours aux soins et le quintile de consommation. Le V de Cramer (**0.056**) revele une association faible. Les menages les plus pauvres ont legerement moins recours aux soins.

8 Question 18 - Depenses de sante Rural vs Urbain

8.1 Resultats




```
Wilcoxon W: 2681342

p-value: 0.7937
```

8.2 Interpretation

Le test de Wilcoxon (**p = 0.794**) ne montre pas de difference significative des depenses de sante entre zones rurales et urbaines. Le violin plot confirme des distributions similaires dans les deux zones.

9 Conclusion

Cette analyse des donnees de sante du Nigeria GHS Panel Wave 4 revele :

- Un taux de morbidite global de **9.31%**, plus eleve chez les femmes et les personnes agees
- Le **paludisme** comme principale affection (**41.7%** des cas)
- Le **chimiste** comme premier recours aux soins (**41.7%**)
- **14.1%** des malades ne consultent personne
- Un lien significatif mais faible entre richesse et recours aux soins
- Pas de difference significative des depenses entre zones rurales et urbaines

Ces resultats soulignent la necessite de renforcer l'acces aux soins formels et de lutter contre le paludisme au Nigeria.