



Manizales

el canto de la
biodiversidad

Manizales
es
Colombia

Alcaldía de Manizales

MANIZALES AVANZA
i VAMOS!

 Instituto de
Cultura y Turismo
MANIZALES

Tabla de contenido

004 | **Aviturismo**
en la ciudad de Manizales

005 | **Importancia de las aves**
en la ciudad de Manizales

006 | **¿Cómo usar**
esta guía?

007 | **La anatomía**
de las aves

008 | **Glosario**

009 - 211 | **Aves de la Red de ecoparques**
de Manizales

213 | **Bibliografía**



¡Bienvenidos a **Manizales!**

la joya escondida de la región

- Manizales es Colombia
- Eikon Digital SAS
- Fabio N. Arias

Primera edición
Manizales, diciembre 2023

Fotografías:
Fabio N. Arias
Paola Rendón

Textos:
Fabio N. Arias

Diseño:
Sebastián López Ubaque

Estratosfera Diseño Se prohíbe
la reproducción total o parcial de
esta obra por cualquier medio
sin el consentimiento de sus
autores.

Aviturismo

en la ciudad de Manizales

¡Bienvenidos a Manizales, la joya escondida de la región! Como gerente del Instituto de Cultura y Turismo, es un placer darles la bienvenida a esta tierra llena de encanto y maravillas naturales.

Manizales no solo es reconocida por su arquitectura única y rica herencia cultural, sino también por sus impresionantes paisajes montañosos que ofrecen una experiencia única de aviturismo. Nuestra ciudad alberga 525 especies de aves de las 800 que la región tiene, lo cual la convierte en uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia para el avistamiento de aves. Propios y visitantes podrán encontrar en cada rincón de nuestra ciudad, la combinación perfecta entre la biodiversidad exuberante y la hospitalidad de nuestra gente.

El Parque Nacional Natural Los Nevados, la Red de Ecoparques y la Reserva de Río Blanco se encuentran entre los siete mejores destinos nacionales para disfrutar del aviturismo, convirtiendo al municipio en una potencia natural para abrirle paso a este mercado como una actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología.

La gestión turística de Manizales como destino nacional para el aviturismo, a través de un portafolio de este tipo, es clave para aumentar su competitividad y sostenibilidad e incentivar la generación de valor agregado a su oferta en turismo de naturaleza.

Sumérjanse en la magia de nuestras montañas, donde la diversidad de aves y flora les dejará sin aliento. Desde el majestuoso Nevado del Ruiz hasta los bosques nublados que rodean la ciudad, cada paso es una oportunidad para descubrir la asombrosa vida silvestre que nos rodea.

Descubran la magia de Manizales a través del aviturismo, donde la aventura se mezcla con la belleza natural. Les invitamos a explorar, aprender y conectarse con la naturaleza de una manera única.

¡Bienvenidos a Manizales, donde la aventura y la cultura se encuentran en cada paso!

Camilo Naranjo Molina

**Gerente del Instituto
de Cultura y Turismo**



Importancia de las aves

en la ciudad de Manizales



En un mundo donde las ciudades crecen a un ritmo vertiginoso, es crucial reconocer el papel vital que desempeñan las aves en estos hábitats urbanos.

En primer lugar, las aves aportan una inestimable diversidad biológica a nuestras ciudades, convirtiéndolas en ecosistemas más ricos y resilientes. Las áreas boscosas ofrecen refugio y hábitats de reproducción para una variada gama de especies de aves, contribuyendo así a la biodiversidad local. Estos bosques pertenecientes a la Red de Ecoparques de Manizales se convierten en verdaderos oasis de vida silvestre, promoviendo la coexistencia armoniosa entre la naturaleza y el desarrollo humano.

La presencia de aves en la Red de Ecoparques también tiene un impacto directo en la salud ambiental de las ciudades. Actúan como agentes de control

biológico, regulando las poblaciones de insectos y contribuyendo a mantener un equilibrio ecológico. Además, su papel en la polinización y dispersión de semillas contribuye a la salud de la flora local, promoviendo la regeneración natural de los bosques urbanos y mejorando la calidad del aire.

No menos importante es el efecto positivo que las aves tienen en el bienestar humano. La observación de aves, conocida como "birdwatching", se ha convertido en una actividad popular que conecta a las personas con la naturaleza, fomentando la apreciación y comprensión de la vida silvestre urbana.

En resumen, las aves desempeñan un papel esencial en las ciudades, contribuyendo a la biodiversidad, la salud ambiental y el bienestar humano. Su presencia no solo enriquece nuestro entorno urbano, sino que también nos recuerda la necesidad de coexistir de manera sostenible con la naturaleza, construyendo ciudades donde la vida silvestre y los seres humanos prosperen en armonía.

¿Cómo usar esta guía?


Para la elaboración de esta Guía de Aves de la Red de Ecoparques de la ciudad de Manizales se realizó una clasificación por familias siguiendo el ordenamiento y la nomenclatura taxonómica propuesta por Clements v2018, adicionalmente cada especie cuenta con una descripción, datos de distribución y sus nombres comunes, en inglés y científico.

Las especies son presentadas en páginas individuales, compartiendo en la parte superior la fotografía y en la parte baja la descripción y distribución.

Algunos datos hacen referencia a:

- **Residente:** significa que el ave se encuentra distribuida naturalmente en una zona de vida que incluye el territorio colombiano.
- **Endémica:** Con distribución exclusiva solo para el territorio colombiano

- **Casi Endémica:** Entre el 40 y 49% de la población mundial de esta especie se encuentra en el territorio colombiano.
- **Migratoria Boreal:** Especie que proviene desde el norte del continente americano y usan el territorio colombiano como refugio del invierno o de paso a su destino.
- Cada ave tendrá un mapa de Manizales con su ubicación



La anatomía de las aves



Glosario

Ápice: Punta o extremo de algo

Bandada mixta: Agrupación de aves de distintas especies que se acompañan entre si para forrajar

Bosque de galería: Bosque bordea los ríos o quebradas

Cobertoras alares: Plumillas pequeñas de la parte exterior de las alas

Forrajar: Buscar comida

Gular: Que hace parte o se relaciona a la garganta

Iris: Parte coloreada del ave

Lek: Agrupación de machos que compiten por aparearse con las hembras

Malar: Asociado a la mandíbula

Maxila: Parte superior del pico

Percha: Sitio donde se posa el ave

Rectrices: Plumillas mas largas de la cola de un ave.

Tarso: Parte alargada de la pata que comienza en el tobillo y sirve como base de los dedos



Manizales

el canto de la

biodiversidad

Aves de la Red de ecoparques
de Manizales






Foto por: Fabio N. Arias



Pava maraquerá

Chamaepetes goudotii

Sickle-winged Guan

Distribución (m.s.n.m)


800 - 3300

Tamaño (cm)

50 - 65

Estado

Residente



Es un ave bastante discreta y silenciosa; puede ser difícil de detectar ya que se percha en los niveles medio y superior del bosque. A menudo se observa en parejas o grupos pequeños.



♂

Pava andina

Penelope montagnii

Andean Guan

Distribución (m.s.n.m)


2000 - 3700

Tamaño (cm)

50 - 60

Estado

Residente



Habitan en bosques secundarios y de niebla; allí se encuentran en grupos pequeños de 3 a 7 individuos; son de hábitos arborícolas y de comportamiento arisco y asustadizo. Su dieta se compone principalmente, de frutas y elaboran el nido en los árboles.



♂

Guacharaca colombiana

Ortalis columbiana

Colombian Chachalaca

Distribución (m.s.n.m)


300 - 2000

Tamaño (cm)

50 - 55

Estado

Endémica



Se encuentra en hábitats boscosos, incluyendo arboledas y bordes. Usualmente, en pequeños grupos familiares o parejas.



Paloma collareja

Patagioenas fasciata

Band-tailed Pigeon

Distribución (m.s.n.m)


600 - 3500

Tamaño (cm)

35

Estado

Residente



Paloma grande encontrada en bosques montañosos maduros. Forma grandes bandadas en bosques de coníferas y áreas montanas donde se alimenta de semillas y frutos. Cuando alza vuelo, las alas emiten sonidos fuertes.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco



Paloma colorada

Patagioenas cayennensis

Pale-vented Pigeon

Distribución (m.s.n.m)


< 2000

Tamaño (cm)

34

Estado

Residente



Paloma grande de sabanas inundables, riveras, áreas abiertas con árboles intercalados, localmente en algunos pueblos.



♂

Paloma-perdiz Bigotuda

Zentrygon frenata

White-throated Quail-Dove

Distribución (m.s.n.m)


900 - 3000

Tamaño (cm)

32

Estado

Residente



Se encuentra en bosques montanos a mayor altura que otras palomas de perdices. Usualmente, camina sobre el suelo a menos que se asuste y se arroje a los niveles inferiores de un árbol.



Caminera rabiblanca

Leptotila verreauxi

White-tipped Dove

Distribución (m.s.n.m)


< 2800

Tamaño (cm)

28

Estado

Residente



Es un ave terrestre que permanece sola o en parejas. Camina silenciosamente por el suelo, en donde cabecea con frecuencia cuando picotea. Su dieta es a base de semillas y de algunos insectos, como orugas y polillas. Habita en áreas abiertas con cobertura arbustiva, bordes de bosque y matorrales.



♂

Torcaza nagüiblanca

Zenaida auriculata

Eared Dove

Distribución (m.s.n.m)


< 3500

Tamaño (cm)

26

Estado

Residente



En Colombia, es común encontrarla en áreas abiertas y secas, prados, jardines y zonas pobladas. Es un ave bastante sociable y confiada que se alimenta en el suelo mientras está en pareja o en grupos numerosos; camina con pasos rápidos y cortos. Cuando vuela, produce un aleteo sonoro.

Yellow dot: Monumento Colonizadores | Green dot: Ecoparque Los Alcázares

Pink dot: Bosque Popular el Prado | Teal dot: Ecoparque Los Yarumos | Blue dot: Reserva Forestal Río Blanco



♂

Tortolita común

Columbina talpacoti

Ruddy Ground Dove

Distribución (m.s.n.m)


< 2500

Tamaño (cm)

18

Estado

Residente



Notablemente sociable y confiada. Se alimenta principalmente en el suelo, solitaria, en pares o en grupos de tamaño variable. Camina con pasos cortos y rápidos. Se levanta con un aleteo sonoro y vuela corta distancia.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Blue circle: Ecoparque Los Yarumos



♂

Garapatero común

Crotophaga ani

Smooth-billed Ani

Distribución (m.s.n.m)


< 3000

Tamaño (cm)

35

Estado

Residente



Se encuentran en tierras bajas tropicales y laderas en una gran variedad de hábitats abiertos y semiabiertos.



♂

Cuco ardilla

Piaya cayana

Squirrel Cuckoo

Distribución (m.s.n.m)


< 3000

Tamaño (cm)

50

Estado

Residente



Se le encuentra en gran variedad de hábitats arbolados y bordes de bosque. Generalmente se alimenta sigilosamente en los estratos medios y altos de los árboles, donde puede ser sorprendentemente difícil de ver.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



♂

Bienparado común

Nyctibius griseus

Common Potoo

Distribución (m.s.n.m)


< 2600

Tamaño (cm)

38

Estado

Residente



Pasa el día perchado en el extremo de un tronco, donde se mezcla perfectamente y se vuelve muy difícil de observar. Por la noche, caza principalmente insectos al vuelo desde una perchta expuesta. Se encuentra en hábitats boscosos con árboles dispersos.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco



♂

Colibrí collarejo

Florisuga mellivora

White-necked Jacobin

Distribución (m.s.n.m)


< 2000

Tamaño (cm)

10

Estado

Residente



Usualmente se encuentra solitario pero puede congregarse en árboles con flores. Forrajea a alturas variables; a menudo revolotea sobre ríos o árboles, a la caza de insectos. Los machos efectúan un despliegue llamativo con ascensos y clavados, con la cola abierta en abanico.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos



Foto por: Fabio N. Arias

♂

Ermitaño verde

Phaethornis guy

Green Hermit

Distribución (m.s.n.m)


600 - 2200

Tamaño (cm)

12.5

Estado

Residente



Solitario, se mueve rápidamente emitiendo chillidos. Ocasionalmente, revolotea en la cara del observador para alejarse luego con una sacudida de la cola. Los machos cantan en leks.



Pico de lanza frentiverde

Doryfera ludovicae

Green-fronted Lancebill

Distribución (m.s.n.m)


700 - 3000

Tamaño (cm)

10

Estado

Residente



Suele alimentarse en grupos de flores pendulares de corolas largas, frente a las cuales revolotea sin colgarse; a menudo caza insectos en pequeños claros. Vuela rápido y directo.



♂

Pico de cuña

Schistes albogularis
White-throated Daggerbill

Distribución (m.s.n.m)


800 - 2600

Tamaño (cm)

8.5

Estado

Casi Endémica



Solitario, habita usualmente en sotobosque denso y cañadas sombrías. Forrajea principalmente en flores tubulares, revoloteando y a veces colgándose. Suele ser un ruttero de flores dispersas.



♂

Chillón verde

Colibri cyanotus

Lesser Violetear

Distribución (m.s.n.m)


600 - 3200

Tamaño (cm)

9.3

Estado

Residente



Ampliamente distribuido en las montañas, desde sotobosque hasta dosel. A menudo se reúne con otras especies en árboles florecidos. Canta solitario o en pequeños leks dispersos.

Yellow dot: Monumento Colonizadores | Green dot: Ecoparque Los Alcázares

Pink dot: Bosque Popular el Prado | Teal dot: Ecoparque Los Yarumos | Blue dot: Reserva Forestal Río Blanco



♂

Chillón común

Colibri coruscans

Sparkling Violetear

Distribución (m.s.n.m)


1200 - 3600

Tamaño (cm)

13

Estado

Residente



Colibrí característico de tierras altas semiabiertas. Altamente territorial y vocal. Se despliega, vuela verticalmente unos pocos metros, canta, cierra las alas, abre la cola y regresa en picada a la percha.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos



Mango pechinegro

Anthracothorax nigricollis

Black-throated Mango

Distribución (m.s.n.m)


< 2000

Tamaño (cm)

10.5

Estado

Residente



Bien conocido por su hábito de revolotear estático, en áreas abiertas, en busca de insectos. Ocasionalmente se encuentra en grupos pequeños, en árboles florecidos pero, generalmente, es más bien solitario.



♂

Heliángelus belicoso

Heliangelus exortis

Tourmaline Sunangel

Distribución (m.s.n.m)


2000 - 3200

Tamaño (cm)

9.5

Estado

Casi Endémica



Suele colgarse, brevemente, a las flores, con alas abiertas en V, mientras liba. También deja las alas abiertas un momento al posarse. Forrajea a baja altura en áreas abiertas o de matorral.



♂

Colibrí pechipunteado

Adelomyia melanogenys

Speckled Hummingbird

Distribución (m.s.n.m)


1000 - 3000

Tamaño (cm)

8.8

Estado

Residente



Usualmente se observa solitario. Revolotea al libar, a menudo colgado o perchado. Es uno de los colibríes más comunes a elevación media y se encuentra en selvas húmedas y bordes de montaña.

30



Foto por: Paola Rendón

Silfo coliverde

Aglaiaocercus kingii

Long-tailed Sylph

Distribución (m.s.n.m)


1600 - 3000

Tamaño (cm)

18

Estado

Residente



Prefiere bordes de selva y áreas más abiertas. Forrajea a cualquier altura, rutero o territorial. Revolotea y, ocasionalmente, se cuelga para libar; caza insectos al aire, desde perchas expuestas.



♂

Metalura colirrojo

Metallura tyrianthina

Tyrian Metaltail

Distribución (m.s.n.m)


2100 - 3500

Tamaño (cm)

8

Estado

Residente



Pequeño colibrí agresivo y territorial. Al libar, suele colgarse de las flores. Suele hallarse alrededor de pequeños arbustos en flor y a orillas de carretera.



Foto por: Paola Rendón

Paramero rabihorcado

Eriocnemis derbyi

Black-thighed Puffleg

Distribución (m.s.n.m)


2600 - 3700

Tamaño (cm)

9

Estado

Casi Endémica



Revolotea o se cuelga en flores bajas en los márgenes de los matorrales. Agresivo y territorial. Puede dejar las alas abiertas brevemente al posarse. Poco común en bordes de selva húmeda y pastizales.



Inca broncíneo

Coeligena coeligena

Bronzy Inca

Distribución (m.s.n.m)


1400 - 2600

Tamaño (cm)

10.7

Estado

Residente



“Rutea” principalmente en flores de estrato medio o bajo, al interior de la selva y más frecuentemente en sus bordes. Prefiere flores rojas, largas y tubulares. Común en selvas húmedas y muy húmedas de montaña.



Foto por: Paola Rendón

Inca collarejo

Coeligena torquata

Collared Inca

Distribución (m.s.n.m)


2000 - 3400

Tamaño (cm)

11.4

Estado

Residente



“Rutero” activo y silencioso. Suele hallarse entre arbustos bajos del sotobosque; revolotea al libar en flores pendulares con corolas largas, especialmente en lianas, plantas trepadoras y arbustos.



Colibrí terciopelo

Lafresnaya lafresnayi

Mountain Velvetbreast

Distribución (m.s.n.m)


2000 - 3500

Tamaño (cm)

10

Estado

Residente



Se encuentra, usualmente solitario, en estratos medio a alto. Se posa con el pico dirigido hacia arriba. Revolotea al libar, manteniendo el pico verticalmente hacia arriba. Ocasionalmente atrapa insectos en el aire.



Pico de espada

Ensifera ensifera
Sword-billed Hummingbird

Distribución (m.s.n.m)


2400 - 3500

Tamaño (cm)

13.5

Estado

Residente



Colibrí diminuto que vuela como abejorro. Habita en bosques nublados, bordes y bosque secundario. A menudo se le ve alimentándose solo en el dosel.



♂

Colibrí chupasavia

Boissonneaua flavaescens

Buff-tailed Coronet

Distribución (m.s.n.m)


1400 - 3000

Tamaño (cm)

10.7

Estado

Residente



Es territorial y suele encontrarse en flores de nivel medio a alto; también captura insectos al aire, en largos vuelos, desde perchas altas. Como lo hacen otros del género, al posarse, mantiene las alas abiertas momentáneamente.



♂

Cola de raqueta

Ocreatus underwoodii

White-booted Racket-tail

Distribución (m.s.n.m)


1000 - 2700

Tamaño (cm)

12

Estado

Residente



Al libar, revolotea y ocasionalmente cuelga de las flores. Tiene un vuelo ondulado, como de abeja. Suele encontrarse desde estrato alto hasta dosel. Puede hallarse solitario en niveles bajos al interior del bosque o en grupo con otros colibríes, en árboles florecidos del dosel.



Heliodoxa leonado

Heliodoxa rubinoides

Fawn-breasted Brilliant

Distribución (m.s.n.m)


1400 - 2600

Tamaño (cm)

10.6

Estado

Residente



Se encuentra, usualmente solitario, en estrato bajo o medio al interior de la selva y ocasionalmente a lo largo de bordes sombríos. No se congrega en grupos de árboles con flor. Es poco común pero suele hallarse en selva húmeda y muy húmeda.



♂

Picudo coronado

Heliomaster longirostris

Long-billed Starthroat

Distribución (m.s.n.m)


< 2000

Tamaño (cm)

10

Estado

Residente



Se encuentra, usualmente solitario u ocasionalmente en pareja, en alturas medias o altas. A veces se observa a alturas más bajas, en arbustos en flor. Se posa cerca del extremo de ramas desnudas y expuestas. A menudo caza insectos al aire, en revoloteo.



Foto por: Fabio N. Arias

Zumbador ventriblanco

Chaetocercus mulsant

White-bellied Woodstar

Distribución (m.s.n.m)


1500 - 3300

Tamaño (cm)

7

Estado

Residente



Usualmente solitario, revolotea en arbustos y árboles en flor, altos y bajos. Puede congregarse en árboles en flor. A menudo se posa alto, en perchas expuestas.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco



♂

Colibrí rumbito pechiblanco

Philodice mitchellii

Purple-throated Woodstar

Distribución (m.s.n.m)


700 - 2000

Tamaño (cm)

7.3

Estado

Casi Endémica



Colibrí diminuto que vuela como abejorro. Habita en bosques nublados, bordes y bosque secundario. A menudo se le ve alimentándose solo en el dosel.



Esmaralda occidental

Chlorostilbon melanorhynchus

Western Emerald

Distribución (m.s.n.m)


600 - 2200

Tamaño (cm)

7.3

Estado

Casi Endémica



Colibrí pequeño que usualmente se encuentra en hábitats bastante secos y abiertos en los bordes del bosque. Típicamente, visto individualmente alimentándose en niveles inferiores o medios en jardines o bordes.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos



♂

Colibrí de buffon

Chalybura buffonii
White-vented Plumeleteer

Distribución (m.s.n.m)


< 1800

Tamaño (cm)

11

Estado

Residente



Colibrí de tamaño mediano. Usualmente, visto solo en las flores del bosque, de los bordes o arbustos del bosque secundario.



♂

Amazilia coliazul

Saucerottia saucerottei

Steely-vented Hummingbird

Distribución (m.s.n.m)


< 2100

Tamaño (cm)

8.7

Estado

Casi Endémica



Se observa principalmente en arbustos bajos. Notablemente agresivo. Relativamente común en áreas secas de matorral, bordes de monte, tierras cultivadas y jardines. Suele ser estacional y localmente muy común.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Blue circle: Ecoparque Los Yarumos



♂

Amazilia colirrufo

Amazilia tzacatl

Rufous-tailed Hummingbird

Distribución (m.s.n.m)


< 1900

Tamaño (cm)

9

Estado

Residente



Liba en flores y caza insectos en follaje, ramas y telas de araña, a alturas bajas a moderadas. Colibrí característico de jardines y zonas habitadas de muchas regiones.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos



♂

Amazilia andino

Uranomitra franciae

Andean Emerald

Distribución (m.s.n.m)


1000 - 2100

Tamaño (cm)

9

Estado

Residente



Usualmente solitario, rútero en flores dispersas a alturas variables; ocasionalmente se congrega en árboles en flor; también caza insectos al aire, en vuelos cortos, cerca del follaje. Los machos cantan, desde perchas expuestas, a 7-10 metros de altura.

● Monumento Colonizadores | ● Bosque Popular el Prado

● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



♂

Pellar común

Vanellus chilensis

Southern Lapwing

Distribución (m.s.n.m)


< 3300

Tamaño (cm)

37

Estado

Residente



Suele verse solitario o en pareja. Visible en pastizales cortos o crecidos. De vuelo lento y con altibajos, por lo general no sostenido por largos períodos. Su dieta incluye principalmente saltamontes, larvas de insectos, lombrices de tierra, peces pequeños e invertebrados terrestres.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



♂

Playero solitario

Tringa solitaria

Solitary Sandpiper

Distribución (m.s.n.m)


< 3500

Tamaño (cm)

19.5

Estado

Migratoria Boreal



Suele verse solitario. Tambalea el cuerpo mientras camina, pero el movimiento no es tan lento ni dramático. Pasa el invierno en Centro y Suramérica.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco



♂

Bubulcus ibis

Cattle Egret

Distribución (m.s.n.m)

< 3500


Tamaño (cm)

55

Estado

Residente

Garza bueyera



Garza blanca pequeña. Con frecuencia se observa en áreas secas. A menudo se alimenta siguiendo ganado o tractores en zonas agrícolas.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco



♂

Coquito

Phimosus infuscatus

Bare-faced Ibis

Distribución (m.s.n.m)


< 3000

Tamaño (cm)

55

Estado

Residente



Se observa en grupos de tamaño variable (desde unos pocos individuos hasta varias docenas o más), caminando, explorando pisos blandos en dehesas pantanosas o en orillas de lagunas.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



Gallinazo común

Coragyps atratus

Black Vulture

Distribución (m.s.n.m)


< 4000

Tamaño (cm)

65

Estado

Residente



Carroñero común en áreas pobladas; a menudo duerme en árboles o en edificios. Se puede encontrar alimentándose en los basureros. Activo desde el amanecer o incluso desde antes.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco



♂

Guala común

Cathartes aura

Turkey Vulture

Distribución (m.s.n.m)


< 2600

Tamaño (cm)

75

Estado

Residente



Se encuentra usualmente solitaria y, a veces, en grupos ampliamente dispersos. Remonta a gran altura y tiene un gran dominio en el aire. Es carroñera y puede concentrarse en grandes grupos, haciendo "remolinos" en el aire con otras aves, como los gallinazos.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco



♂

Águila pescadora

Pandion haliaetus

Osprey

Distribución (m.s.n.m)


< 4000

Tamaño (cm)

60

Estado

Migratoria Boreal



Rapaz grande, que cruza sobre lagos, ríos y manglares en busca de peces. A menudo se le observa lanzarse desde muy alto en el aire e introducir las patas primero en el agua para agarrar peces.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco



Gavilán pico de gancho

Chondrohierax uncinatus

Hook-billed Kite

Distribución (m.s.n.m)


< 3000

Tamaño (cm)

40 - 50

Estado

Residente



Se encuentra solitario, en parejas, o en pequeños grupos familiares en los bosques, a menudo cerca del agua. Caza dentro del bosque. Se alimenta principalmente de caracoles.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco



♂

Águila real de montaña

Spizaetus isidori
Black-and-chestnut Eagle

Distribución (m.s.n.m)


1500 - 3500

Tamaño (cm)

60 - 80

Estado

Residente



Águila crestada rara que se encuentra en bosque nuboso desde elevaciones medias a altas. Es más probable que se encuentre en las mañanas soleadas, cuando solos o en pares pueden volar alto sobre las cordilleras boscosas.



♂

Gavilán caminero

Rupornis magnirostris

Roadside Hawk

Distribución (m.s.n.m)


< 2700

Tamaño (cm)

33 - 40

Estado

Residente



En Colombia es el ave rapaz más común. Habita en bosques secos y húmedos en crecimiento secundario, sabanas con bosques de galería, rastrojos y zonas abiertas con árboles dispersos. Se alimenta de insectos, anfibios, roedores, peces y reptiles (culebras y lagartos).

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



Foto por: Fabio N. Arias



Águila migratoria

Buteo platypterus

Broad-winged Hawk

Distribución (m.s.n.m)


< 3500

Tamaño (cm)

38 - 42

Estado

Migratoria Boreal



En Colombia se observa en bordes de bosque, bosques en sucesión secundaria y rastrojos. Los individuos de esta especie vuelan en círculos, siguiendo corrientes de aire, por lo que los patrones de migración están altamente relacionados con la velocidad y la dirección del viento.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco



♂

Curru cutú común

Megascops choliba

Tropical Screech-Owl

Distribución (m.s.n.m)


< 2700

Tamaño (cm)

23

Estado

Residente



Es una especie nocturna y casi siempre se observa en pareja. Suele descansar en una cavidad o en una rama a una altura moderada.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco

60



Foto por: Fabio N. Arias

♂

Autillo gorjiblanco

Megascops albogularis
White-throated Screech-Owl

Distribución (m.s.n.m)


2000 - 3500

Tamaño (cm)

22

Estado

Residente



Se encuentra en los bosques templados. Estrictamente nocturno, y por lo tanto, es frecuentemente más escuchado que visto.



Búho de anteojos

Pulsatrix perspicillata

Spectacled Owl

Distribución (m.s.n.m)


< 1500

Tamaño (cm)

43 - 52

Estado

Residente



Búho grande. Activo de día o de noche. Suele perchar a niveles medios o bajos, bien escondido en sitios bastante sombreados, de donde vuela al espantarse fácilmente. De noche prefiere los bordes y el dosel en bosques abiertos.



♂

Buhíto andino

Glaucidium jardinii

Andean Pygmy-Owl

Distribución (m.s.n.m)


2000 - 3500

Tamaño (cm)

15

Estado

Residente



Activo de día o de noche. Permanece en dosel o niveles medios. Se encuentra en algunas localidades dispersas en selvas húmedas de montaña. A menudo pasa desapercibido.



Búho orejudo

Asio stygius

Stygian Owl

Distribución (m.s.n.m)


1500 - 3000

Tamaño (cm)

40 - 45

Estado

Residente



Búho orejudo grande y oscuro. Prefiere bosques de pino, principalmente en tierras altas. Caza en el bosque abierto y en sus bordes. Se percha a niveles medios y altos, a veces en ramas bien expuestas.



Foto por: Paola Rendón



Quetzal de cabeza dorada

Pharomachrus auriceps

Golden-headed Quetzal

Distribución (m.s.n.m)


1200 - 2800

Tamaño (cm)

36

Estado

Residente



Activo de día o de noche. Permanece en dosel o niveles medios. Se encuentra en algunas localidades dispersas en selvas húmedas de montaña. A menudo pasa desapercibido.

65



♂

Trogón enmascarado

Trogon personatus

Masked Trogon

Distribución (m.s.n.m)


1300 - 3000

Tamaño (cm)

25

Estado

Residente



Generalmente se le observa solo o en pareja, silencioso y en posición vertical. Captura artrópodos o frutos en el follaje mediante vuelos sostenidos para, posteriormente, comerlos perchado en una rama. Habita principalmente en bosques húmedos y muy húmedos de montaña, en áreas abiertas y en bosques en crecimiento secundario.

● Reserva Forestal Río Blanco



Barranquero

Momotus aequatorialis

Andean Motmot

Distribución (m.s.n.m)


1300 - 3000

Tamaño (cm)

48

Estado

Residente



Visto individualmente o en parejas, generalmente perchado silenciosamente en el medio del bosque subtropical musgoso.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco



♂

Bigotudo canoso

Malacoptila mystacalis

Moustached Puffbird

Distribución (m.s.n.m)


800 - 2300

Tamaño (cm)

21.5

Estado

Residente



Es un ave poco activa y bastante confiada que, generalmente, se posa a baja altura en el sotobosque. Captura sus presas en el follaje o el suelo mediante vuelos desde una perchta a la cual, generalmente, regresa. En ocasiones se le encuentra en barrancos, bordes de bosque y en áreas abiertas arboladas.



Foto por: Fabio N. Arias

Torito cabecirrojo

Eubucco bourcierii

Red-headed Barbet

Distribución (m.s.n.m)


900 - 2500

Tamaño (cm)

15.5

Estado

Residente



Usualmente se observa en parejas, a menudo acompañando una bandada de especies mixtas en el dosel del bosque.



♂

Tucancito esmeralda

Aulacorhynchus albivitta

Southern Emerald-Toucanet

Distribución (m.s.n.m)


1500 - 3300

Tamaño (cm)

31 - 37

Estado

Residente



Suele encontrarse en pareja o grupos pequeños, desde los niveles más bajos hasta el dosel. Activo, ruidoso y a veces curioso. A menudo se mueve por los estratos más altos en fila india. Omnívoro, a menudo roba nidos de otras aves.

- Ecoparque Los Alcázares | ● Bosque Popular el Prado
- Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



♂

Tucancito rabirrojo

Aulacorhynchus haematopygus

Crimson-rumped Toucanet

Distribución (m.s.n.m)


600 - 2200

Tamaño (cm)

40 - 45

Estado

Casi Endémica



Suele encontrarse en pareja o grupos pequeños, desde los niveles más bajos hasta el dosel. Activo, ruidoso y a veces curioso. A menudo se mueve por los estratos más altos en fila india. Omnívoro, a menudo roba nidos de otras aves.



♂

Terlaque andino

Andigena hypoglaea

Grey-breasted Mountain-Toucan

Distribución (m.s.n.m)


2000 - 3500

Tamaño (cm)

46

Estado

Residente



Esta especie habita en bosques húmedos y muy húmedos andinos. Su dieta es a base de frutos y ocasionalmente también consume vertebrados pequeños. Puede permanecer solo pero, es más frecuente hallarlo en pareja o en grupos de hasta 6 individuos; en ocasiones se une a bandadas mixtas. Es un ave poco conspicua y bastante silenciosa.

● Reserva Forestal Río Blanco



♂

Terlaque pechiazul

Andigena nigrirostris
Black-billed Mountain-Toucan

Distribución (m.s.n.m)


1200 - 3000

Tamaño (cm)

48

Estado

Casi Endémica



Suele encontrarse en pareja y, ocasionalmente, en pequeños grupos, en niveles altos de los árboles. Fácil de observar. Relativamente común en selva húmeda y bordes.



♂

Carpintero punteado

Picumnus granadensis

Grayish Piculet

Distribución (m.s.n.m)


500 - 2200

Tamaño (cm)

9.5

Estado

Endémica



Habita en bordes de bosques secos a moderadamente húmedos, en matorrales y cafetales con sombrío. Permanece solo, en pareja o en grupos familiares y, en ocasiones, se une a bandadas mixtas. Perfora pequeños agujeros en búsqueda de insectos.

74



♂

Carpintero de los robles

Melanerpes formicivorus

Acorn Woodpecker

Distribución (m.s.n.m)


1400 - 2700

Tamaño (cm)

23

Estado

Residente



Activo; suele encontrarse en pareja o en grupos ruidosos de hasta 12 individuos. Visible en árboles altos y muertos. A menudo atrapa insectos al aire, en vuelos cortos.

Yellow dot: Monumento Colonizadores | Green dot: Ecoparque Los Alcázares

Pink dot: Bosque Popular el Prado | Blue dot: Ecoparque Los Yarumos | Dark blue dot: Reserva Forestal Río Blanco



♂

Carpintero habado

Melanerpes rubricapillus

Red-crowned Woodpecker

Distribución (m.s.n.m)


< 2000

Tamaño (cm)

18

Estado

Residente



Visible en áreas abiertas. Usualmente se le ve solitario o en pareja, a altura media o baja. Cincela superficies de corteza, inspecciona extremos de ramas rotas y, a menudo, come fruta.

Yellow dot: Monumento Colonizadores | Green dot: Ecoparque Los Alcázares

Pink dot: Bosque Popular el Prado | Blue dot: Ecoparque Los Yarumos



Carpintero cariblanco

Colaptes rubiginosus

Golden-olive Woodpecker

Distribución (m.s.n.m)


900 - 3000

Tamaño (cm)

23

Estado

Residente



Se encuentra usualmente solitario o en pareja, desde nivel medio hasta dosel. Forrajea principalmente perforando ramas y enredaderas, trepando troncos y explorando en ramas con musgo.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



♂

Carpintero carmesí

Colaptes rivolii

Crimson-mantled Woodpecker

Distribución (m.s.n.m)


1500 - 3500

Tamaño (cm)

26

Estado

Residente



Se encuentra usualmente solitario o en pareja y a menudo también en bandadas mixtas. Busca en agujeros, picotea y explora el follaje, usualmente sin perforar. Se alimenta en casi todos los niveles, en superficies cargadas de musgo.



♂

Carpintero real

Dryocopus lineatus

Lineated Woodpecker

Distribución (m.s.n.m)


< 2300

Tamaño (cm)

33

Estado

Residente



Especie común en vegetación secundaria, áreas semiabiertas y en bordes de bosque. Usualmente forrajea en estratos medios o altos del bosque, a veces en árboles muertos.



♂

Carpintero gigante

Campephilus pollens

Powerful Woodpecker

Distribución (m.s.n.m)


1400 - 3200

Tamaño (cm)

32

Estado

Residente



Carpintero grande. Normalmente se observa en pareja por el bosque, por lo que se encuentran con poca frecuencia.



♂

Pigua

Daptrius chimachima

Yellow-headed Caracara

Distribución (m.s.n.m)


< 2700

Tamaño (cm)

40 - 45

Estado

Residente



Se encuentra en hábitats abiertos, tales como pastizales y bordes de ríos, donde a menudo se posa visiblemente. Puede formar pequeños grupos y predominantemente carroñera.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



Periquito de anteojos

Forpus conspicillatus

Spectacled Parrotlet

Distribución (m.s.n.m)


< 2600

Tamaño (cm)

12.5

Estado

Casi Endémica



Suele encontrarse en pareja o en pequeñas bandadas, usualmente ruidosas y visibles. Tiene un vuelo ondulado, errático y generalmente no tan sostenido como en otras especies de la familia. Se alimenta de semillas de gramíneas, malezas y pequeñas frutas.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos



♂

Cotorra maicera

Pionus chalcopterus

Bronze-winged Parrot

Distribución (m.s.n.m)


500 - 2500

Tamaño (cm)

28.5

Estado

Casi Endémica



Como la mayoría de cotorras de montaña, es notablemente nómada y, usualmente, se observa en bandadas. Habita en bosques húmedos de montaña, bordes y claros de bosque o terrenos parcialmente deforestados con árboles dispersos. Ha sido registrada alimentándose de frutos.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos



♂

Loro cabeciazul

Pionus menstruus

Blue-headed Parrot

Distribución (m.s.n.m)


< 2000

Tamaño (cm)

26

Estado

Residente



Frecuentemente asociado a plantaciones de fríjol o maíz. Suele vérsela en grupos que se posan en la copa de los árboles y que emiten chillidos agudos en vuelo.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos



♂

Cotorra montañera

Hapalopsittaca amazonina

Rusty-faced Parrot

Distribución (m.s.n.m)


1500 - 3500

Tamaño (cm)

23

Estado

Casi Endémica



Se encuentra en pareja o en grupos pequeños de hasta 5 individuos. En vuelo, comparada con otras especies de la familia, parece más pequeña, con cola proporcionalmente más larga y aletazos más someros. Es un poco rara y local.



♂

Lora andina

Amazona mercenarius

Scaly-naped Parrot

Distribución (m.s.n.m)


1200 - 3500

Tamaño (cm)

34

Estado

Residente



Se observa en pareja o en múltiplos de 2, en grupos de hasta 30 o 40 individuos. Es arisca. Suele verse en selvas húmedas de montaña y, en vuelo, sobre terreno parcialmente deforestado.

● Monumento Colonizadores | ● Bosque Popular el Prado

● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



♂

Perico paramuno

Leptosittaca branickii

Golden-plumed Parakeet

Distribución (m.s.n.m)


1800 - 3500

Tamaño (cm)

35

Estado

Residente



Es muy común verlo en bandadas pequeñas y parloteantes. Forrajea en el dosel del bosque y realiza movimientos estacionales, como respuesta a cambios en la disponibilidad de alimento. Normalmente habita en bosques húmedos de montaña, bosques secundarios en estados avanzados de la sucesión, bosques enanos y matorrales, en el límite de la vegetación arbórea.



Foto por: Paola Rendón

Batará mayor

Taraba major

Great Antshrike

Distribución (m.s.n.m)


< 1500

Tamaño (cm)

19.5

Estado

Residente



Se encuentra usualmente en pareja, salta y rebusca en marañas de enredaderas y, generalmente, permanece fuera de vista. Rara vez sigue marchas de hormigas o se une a bandadas mixtas. Mientras busca alimento, hace crujir las hojas secas, ruidosamente.



♂

Foto por: Paola Rendón

Batará carcajada

Thamnophilus multistriatus

Bar-crested Antshrike

Distribución (m.s.n.m)


< 2000

Tamaño (cm)

16

Estado

Casi Endémica



Se encuentra usualmente en pareja, bien escondida en el follaje. Rebusca artrópodos grandes; ocasionalmente sigue marchas de hormigas. Se le detecta más fácilmente por su canto fuerte y acelerado. Utiliza áreas cultivadas, jardines y parques con matorrales y árboles dispersos.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos



♂

Hormiguerito rabilargo

Drymophila striaticeps

Streak-headed Antbird

Distribución (m.s.n.m)


1700 - 3000

Tamaño (cm)

15

Estado

Residente



Este impresionante hormiguero de cola larga es aficionado a los matorrales de bambú, dentro o en el borde del bosque montañoso. Suele hallarse en pareja o en pequeños grupos y, con menor frecuencia, solitario. Canta frecuentemente y no es arisco pero puede ser difícil de ver.



♂

Hormiguero de parker

Cercomacroides parkeri

Parker's Antbird

Distribución (m.s.n.m)


1200 - 2000

Tamaño (cm)

14

Estado

Endémica



Son difíciles de observar porque permanecen escondidos entre la maraña. Frecuentemente son vistos en parejas o grupos familiares.



Hormiguero inmaculado

Hafferia immaculata

Blue-lored Antbird

Distribución (m.s.n.m)


600 - 1800

Tamaño (cm)

18

Estado

Casi Endémica



Hormiguero grande y oscuro. Usualmente, se ven en parejas alimentándose cerca al suelo dentro del bosque. Puede ser tímido y difícil de ver. Algunas veces sigue hormigas, pero frecuentemente se les ve lejos de ellas.



♂

Tororoí ondulado

Grallaria squamigera

Undulated Antpitta

Distribución (m.s.n.m)


2200 - 3500

Tamaño (cm)


21.5

Estado

Residente



Terrestre. Salta de marañas densas a claros, pastos y áreas con alguna sombra, para buscar alimento. Usualmente solitario y más bien escondidizo; vuela bajo y directo.



♂

Tororoí dorsiescamado

Grallaria guatimalensis

Scaled Antpitta

Distribución (m.s.n.m)


< 2000

Tamaño (cm)

17

Estado

Residente



Se mueve rápida y sililosamente con sus largas piernas. Puede ser visto alimentándose o dando pequeños saltos en caminos tranquilos. Cuando se le espanta vuela con un zumbido de alas sin vocalizar.



♂

Tororoí comprapán

Grallaria ruficapilla

Chestnut-crowned Antpitta

Distribución (m.s.n.m)


1200 - 3200

Tamaño (cm)

19

Estado

Residente



Esta ave es principalmente terrestre, salta por el suelo o corre rápidamente. Usualmente mantiene escondido en el sotobosque enmarañado pero puede salir a pequeños claros y orillas de carretera, temprano en la mañana o al atardecer. Escarba e introduce el pico en el lodo suave, en busca de lombrices, insectos grandes, otros invertebrados y ranitas.



♂

Tororoí chusquero

Grallaria nuchalis
Chestnut-naped Antpitta

Distribución (m.s.n.m)


2000 - 3000

Tamaño (cm)

20

Estado

Residente



Difícil de ver. Usualmente canta a intervalos durante el día, desde perchas bajas y oculta. Suele hallarse en suelo y sotobosque de selva húmeda, especialmente chusquea.



♂

Tororoí rufocenizo

Grallaria rufocinerea

Bicoloured Antpitta

Distribución (m.s.n.m)


2000 - 3200

Tamaño (cm)

16

Estado

Casi Endémica



Habita en bosques montañosos húmedos maduros y, con menos frecuencia, en bosques en sucesión secundaria y bordes de bosque. Su dieta la componen insectos y otros artrópodos. Forrajea sola o en pareja y se mueve por el suelo del bosque, entre vegetación densa.

● Reserva Forestal Río Blanco



♂

Tororoí de Miller

Grallaria milleri

Brown-banded Antpitta

Distribución (m.s.n.m)


2000 - 3000

Tamaño (cm)

16.5

Estado

Endémica



Tororoí de aspecto descolorido, restringido al bosque nublado de los Andes centrales de Colombia. Como muchos otros tororoíes, pasa la mayor parte del tiempo en el suelo del bosque en donde normalmente es muy difícil de observar por la falta de luz.



♂

Tororoí enano

Grallaricula nana
Slate-crowned Antpitta

Distribución (m.s.n.m)


1700 - 3200

Tamaño (cm)

11

Estado

Residente



Como otros del género Grallaricula, salta por perchas en arbustos de sotobosque abierto, desde cerca del suelo hasta el nivel del ojo. Picotea en follaje desde percha o baja, momentáneamente, al suelo. Difícil de ver.

● Reserva Forestal Río Blanco

99



♂

Tapaculo ocelado

Acropternis orthonyx

Ocellated Tapaculo

Distribución (m.s.n.m)


2200 - 3200

Tamaño (cm)

21.5

Estado

Residente



Es bastante tímido, se queda en el suelo o cerca de él, entre el sotobosque y matorrales de bambú en el bosque montano. No suele verse sin un esfuerzo considerable.



Trepador gigante

Xiphocolaptes promeropirhynchus

Strong-billed Woodcreeper

Distribución (m.s.n.m)


< 3300

Tamaño (cm)

34

Estado

Residente



Es un ave bastante cautelosa, de movimientos poco enérgicos. Con frecuencia se le observa perforando troncos muertos con su pico, en búsqueda de presas. Su dieta se basa principalmente en el consumo de artrópodos y cantidades menores de pequeños vertebrados. Habita en selvas húmedas y muy húmedas de montaña y tierras bajas.



Trepatornos montano

Lepidocolaptes lacrymiger

Montane Woodcreeper

Distribución (m.s.n.m)


1500 - 3300

Tamaño (cm)

19

Estado

Residente



Es una especie común en bosques de neblina cubiertos de musgo y cardos, bosques húmedos o muy húmedos. Suele verse solo, en pareja o unido a bandadas mixtas, en el estrato medio del bosque.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



♂

Corretroncos perlado

Margarornis squamiger

Pearled Treerunner

Distribución (m.s.n.m)


1800 - 3500

Tamaño (cm)

15.5

Estado

Residente



Permanece solo, en pareja, en grupos familiares de hasta ocho individuos y, comúnmente, también en bandadas mixtas. Forrajea desde el nivel medio de la vegetación hasta el dosel, en donde trepa por troncos y ramas cubiertas de musgo, efectuando maniobras acrobáticas o colgando cabeza abajo para buscar en la superficie inferior de las ramas.

● Reserva Forestal Río Blanco



♂

Xenops estriado

Xenops rutilans

Streaked Xenops

Distribución (m.s.n.m)


1500 - 3000

Tamaño (cm)

12

Estado

Residente



Rebusca en ramitas delgadas sin follaje, usualmente colgado o moviéndose de lado. Se observa en pareja o tríos y en ocasiones en bandadas mixtas.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco



♂

Rastrojero rubicundo

Cranioleuca erythrops

Red-faced Spinetail

Distribución (m.s.n.m)


1000 - 2200

Tamaño (cm)

14.5

Estado

Residente



Activo; trepa acrobáticamente por marañas de enredaderas y a lo largo de ramas musgosas. Se encuentra solitario, en pareja o en bandadas mixtas, desde estrato medio hasta subdosel.

105



♂

Rastrojero pálido

Synallaxis albescens

Pale-breasted Spinetail

Distribución (m.s.n.m)


< 2000

Tamaño (cm)

14

Estado

Residente



Furtivo; se oye con más frecuencia de lo que se ve. Puede llamar desde perchas bajas expuestas, temprano en la mañana, pero usualmente permanece oculto.



♂

Rastrojero de azara

Synallaxis azarae

Azara's Spinetail

Distribución (m.s.n.m)


1300 - 3200

Tamaño (cm)

16

Estado

Residente



Furtivo; se esconde por matorrales enmarañados y se oye con más frecuencia de lo que se ve. Trepa y salta activamente por la vegetación densa. Se encuentra usualmente en pareja.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco



Foto por: Paola Rendón

Frutero verdinegro

Pipreola riefferii
Green-and-black Fruiteater

Distribución (m.s.n.m)


1400 - 3200

Tamaño (cm)

19

Estado

Residente



Suele verse en pareja o en grupos familiares laxos, de 3-6 individuos. Se posa en silencio o moviéndose perezosamente, desde el sotobosque hasta niveles medios; a veces sigue bandadas mixtas. Come fruta, posado o en vuelo suspendido.

108



♂

Pipreola arcuata

Barred Fruiteater

Distribución (m.s.n.m)

2000 - 3400


Tamaño (cm)

22.5

Estado

Residente

Frutero barrado



Es un ave confiada, generalmente solitaria o en pareja y forrajea en el nivel medio o bajo del bosque. Su dieta es principalmente a base de frutos. Habita en bosque tropical húmedo y muy húmedo, generalmente en el interior de bosque.



♂

Guardabosque cenizo

Lipaugs fuscocinereus

Dusky Piha

Distribución (m.s.n.m)


1900 - 3000

Tamaño (cm)

33

Estado

Residente



Más bien inactivo y lento, en dosel o subdosel pero a veces se posa en sitios abiertos o ramas del dosel y vuela entre los árboles mientras llama. Arranca fruta con un revoloteo breve.



♂

Cabezón aliblanco

Pachyramphus polychopterus

White-winged Becard

Distribución (m.s.n.m)


< 2200

Tamaño (cm)

15

Estado

Residente



Individuos solitarios o parejas se mueven deliberadamente, siguiendo bandadas mixtas en selva o áreas más abiertas. Revolotean en el follaje y comen pequeñas frutas.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



Foto por: Paola Rendón



Cabezón barrado

Pachyramphus versicolor

Barred Becard

Distribución (m.s.n.m)


1500 - 3000

Tamaño (cm)

13

Estado

Residente



Suele hallarse en pareja y regularmente sigue bandadas mixtas, en niveles bajo a medio de selva y montes claros. Vuela corto al follaje o salta a lo largo de las ramas.



♂

Atrapamoscas orejinegro

Leptopogon superciliaris

Slaty-capped Flycatcher

Distribución (m.s.n.m)


500 - 2000

Tamaño (cm)

13.5

Estado

Residente



Con frecuencia aletea nerviosamente en reposo. Se posa erguido, en nivel bajo a medio. Hace vuelos cortos al follaje y cambia de perchero con frecuencia.



Mionectes estriado

Mionectes striaticollis

Streak-necked Flycatcher

Distribución (m.s.n.m)


1300 - 2700

Tamaño (cm)

13.5

Estado

Residente



Ave pequeña, bastante común en las estribaciones andinas. Típicamente se encuentra en niveles bajos a medios de bosques nublados o bordes. A menudo se encuentra en bandadas de especies mixtas.



♂

Tiranuelo cejiamarillo

Zimmerius chrysops
Golden-faced Tyrannulet

Distribución (m.s.n.m)


500 - 2500

Tamaño (cm)

11

Estado

Residente



Especie muy común, vocalmente muy activa. Habita bosques maduros y vegetación secundaria, bordes y zonas agrícolas. Se puede observar a niveles altos y medios del bosque.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco



Tiranuelo silbador

Camptostoma obsoletum

Southern Beardless-Tyrannulet

Distribución (m.s.n.m)


< 1900

Tamaño (cm)

10

Estado

Residente



Suele encontrarse solitario o en pareja; rebusca, como los vireos, en ramitas y follaje de 2-10 metros. Confiado, llamativo, de cola ligeramente levantada. Canta con frecuencia.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Blue circle: Ecoparque Los Yarumos



Elaenia copetona

Elaenia flavogaster

Yellow-bellied Elaenia

Distribución (m.s.n.m)


< 2300

Tamaño (cm)

16.5

Estado

Residente



Vivaz y ruidosa. Rebusca insectos y fruta en los matorrales; ocasionalmente da vuelos cortos. Suele encontrarse solitaria, en pareja o en grupos familiares, en arbustos con fruta.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos



♂

Pitajo diadema

Silvicultrix diadema
Yellow-bellied Chat-Tyrant

Distribución (m.s.n.m)


1800 - 3000

Tamaño (cm)

12.5

Estado

Residente



Es el único atrapamoscas pequeño que posee una línea superciliar de color amarillo. Presente en bosque muy húmedo, bosque de niebla, interior de bosque montano denso y enmalezado y, menos frecuentemente, en bordes de bosque cerca de arroyos. Se alimenta de insectos, principalmente escarabajos pequeños.



♂

Pitajo torrentero

Ochthoeca cinnamomeiventris

Chestnut-bellied Chat-Tyrant

Distribución (m.s.n.m)


1600 - 3200

Tamaño (cm)

12.5

Estado

Residente



Es relativamente común en o cerca de pequeños claros de selva, bordes, matorrales densos o pendientes enmalezadas, y siempre cerca de arroyos rápidos de montañas. Se alimenta de insectos, pero la composición de su dieta es poco conocida. Permanece solitario o en parejas separadas.



Foto por: Fabio N. Arias



Atrapamoscas pechirrojo

Pyrocephalus rubinus

Vermilion Flycatcher

Distribución (m.s.n.m)


< 2700

Tamaño (cm)

13

Estado

Residente



Confiado; usualmente posado en percha prominente de ramas externas de árbol o arbusto; también suele verse en cercas y cables. Vuela al aire o al suelo para cazar insectos.



♂

Atrapamoscas canelo

Pyrrhomystis cinnamomeus

Cinnamon Flycatcher

Distribución (m.s.n.m)


1500 - 3200

Tamaño (cm)

12

Estado

Residente



Común y vocalmente activo en bosques húmedos y muy húmedos de montaña. Puede verse en bordes de bosque, expuesto en ramas de estrato medio o alto. Suele realizar salidas cortas típicas de atrapamoscas.



Tiranuelo pileado

Lophotriccus pileatus

Scale-crested Pygmy-Tyrant

Distribución (m.s.n.m)


400 - 2400

Tamaño (cm)

9.7

Estado

Residente



Es una especie común en bosques húmedos o muy húmedos, difícil de ver, pero vocalmente muy activa. Son solitarios, aunque forman leks en temporada reproductiva.



♂

Titirijí gorjinegro

Hemitriccus granadensis

Black-throated Tody-Tyrant

Distribución (m.s.n.m)


1800 - 3500

Tamaño (cm)

11

Estado

Residente



Solos o en parejas forrajean en los matorrales del borde del bosque, a veces siguiendo bandadas de especies mixtas.



♂

Tiranuelo capirrufo

Poecilotriccus ruficeps

Rufous-crowned Tody-Flycatcher

Distribución (m.s.n.m)


1500 - 2600

Tamaño (cm)

9.5

Estado

Residente



Suele encontrarse solitario o en pareja y, ocasionalmente, en grupos de varios individuos; se posa o salta en matorrales y vuela corto y rápido. A menudo oculto y difícil de ver.



♂

Espatulilla común

Todirostrum cinereum

Common Tody-Flycatcher

Distribución (m.s.n.m)


< 2200

Tamaño (cm)

9.5

Estado

Residente



Revolotea y salta con la cola levantada, desde los arbustos hasta la copa de los árboles, deteniéndose a mirar hacia arriba en el follaje denso; hace vuelos cortos y rápidos al envés de las hojas.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Blue circle: Ecoparque Los Yarumos



♂

Pibí ahumado

Contopus fumigatus

Smoke-colored Pewee

Distribución (m.s.n.m)


700 - 2500

Tamaño (cm)

16.5

Estado

Residente



A menudo se percha sobre un tronco conspicuo al borde del bosque nuboso a elevaciones medias, a cazar insectos.



Foto por: Fabio N. Arias

Tiranuelo saltarroyo

Serpophaga cinerea

Torrent Tyrannulet

Distribución (m.s.n.m)


1000 - 3300

Tamaño (cm)

11

Estado

Residente



Vivaz y alerta. Las parejas patrullan pequeñas secciones de arroyos rocosos y se ven, a menudo, posadas en piedras grandes en los lechos o en ramas sobre el agua. A menudo mueven la cola hacia arriba.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



♂

Atrapamoscas montañero

Myiarchus cephalotes

Pale-edged Flycatcher

Distribución (m.s.n.m)


1500 - 2700

Tamaño (cm)

18.5

Estado

Residente



Solitarios o pares generalmente se encuentran en niveles inferiores o medios, pero pueden subir hasta el dosel.



♂

Sirirí tijereta

Tyrannus savana
Fork-tailed Flycatcher

Distribución (m.s.n.m)


< 3200

Tamaño (cm)

40

Estado

Residente



Común en jardines, áreas agrícolas, áreas abiertas o semiabiertas con árboles dispersos, claros y zonas ribereñas. Suele verse solo, aunque a veces se une a grupos grandes. Suele elegir perchas expuestas, a nivel medio o alto.

- Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares
- Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos



♂

Sirirí común

Tyrannus melancholicus

Tropical Kingbird

Distribución (m.s.n.m)


< 2800

Tamaño (cm)

22

Estado

Residente



Una de las aves más comunes del país, vocalmente activa y con canto típico al amanecer. Puede encontrarse en cualquier tipo de hábitat intervenido, desde ciudades hasta zonas rurales. Es agresivo con los depredadores.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco

130



Suelda crestinegra

Myiozetetes cayanensis

Rusty-margined Flycatcher

Distribución (m.s.n.m)


< 2200

Tamaño (cm)

17

Estado

Residente



Se observa en pareja o en grupos familiares, a menudo ruidosos. Vuela corto al aire o al follaje , desde perchas a altura media, a veces más alto o más bajo.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Blue circle: Ecoparque Los Yarumos



♂

Bichofué

Pitangus sulphuratus

Great Kiskadee

Distribución (m.s.n.m)


< 2600

Tamaño (cm)

22

Estado

Residente



Presente en jardines, zonas urbanas, áreas agrícolas, plantaciones, zonas abiertas con árboles dispersos y sitios cercanos al agua. Poco común en zonas conservadas. Son territoriales, a veces se les encuentra solos o en pareja.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos



♂

Atrapamoscas lagartero

Myiodynastes hemichrysus

Golden-bellied Flycatcher

Distribución (m.s.n.m)


1000 - 3000

Tamaño (cm)

20.5

Estado

Residente



Suele verse solitario o en pareja. A menudo cabecea mientras se posa erecto pero ligeramente encorvado. Se encuentra usualmente alto y expuesto en ramas desnudas, cerca del follaje. Revolotea y atrapa insectos en las copas de los árboles.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



♂

Atrapamoscas sulfurado

Myiodynastes luteiventris

Sulphur-bellied Flycatcher

Distribución (m.s.n.m)


< 2600

Tamaño (cm)

20.5

Estado

Migratoria Boreal



Pasa mucho tiempo en niveles medios o altos de los árboles pero a veces se observa a nivel más bajo. Suele verse solitario o en pareja y generalmente no se deja ver, excepto cuando llama. Captura insectos grandes en vuelos cortos hacia follaje o ramas.

134



♂

Atrapamoscas maculado

Myiodynastes maculatus

Streaked Flycatcher

Distribución (m.s.n.m)


< 1600

Tamaño (cm)

20.5

Estado

Residente



Pasa mucho tiempo en niveles medios o altos de los árboles pero a veces se observa a nivel más bajo. Suele verse solitario o en pareja y generalmente no se deja ver, excepto cuando llama. Captura insectos grandes en vuelos cortos hacia follaje o ramas.

135



♂

Sirirí bueyero

Machetornis rixosa

Cattle Tyrant

Distribución (m.s.n.m)


< 3200

Tamaño (cm)

19.5

Estado

Residente



Asociado al ganado, jardines o playas arenosas. Suele verse solo, en pareja o grupos familiares. Corre por el suelo en busca de alimentos.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco



♂

Verderón piquinegro

Cyclarhis nigrirostris

Black-billed Peppershrike

Distribución (m.s.n.m)


1500 - 2700

Tamaño (cm)

15.5

Estado

Casi Endémica



Poco común en bosque andino, húmedo y de neblina, vegetación secundaria. Suele unirse a bandadas mixtas y canta con frecuencia. Se mueve entre el dosel con movimientos lentos; busca insectos en medio del follaje.

● Reserva Forestal Río Blanco



♂

Verderón castaño

Pachysylvia semibrunnea

Rufous-naped Greenlet

Distribución (m.s.n.m)


700 - 2700

Tamaño (cm)

12.5

Estado

Casi Endémica



Usualmente, es poco común y se mantiene en el dosel del bosque, donde solos o en pareja siguen bandadas de especies mixtas.



Verderón montañero

Vireo leucophrys

Brown-capped Vireo

Distribución (m.s.n.m)


1000 - 2800

Tamaño (cm)

12

Estado

Residente



Se encuentran solitarios o en pareja, en ocasiones forman grupos familiares durante la época de cría. Forrajea activamente en el follaje en busca de insectos. Se le encuentra en bordes de bosque, monte secundario alto y plantaciones de café.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos



Foto por: Fabio N. Arias

♂

Urraca de cuello negro

Cyanolyca armillata

Black-collared Jay

Distribución (m.s.n.m)


1500 - 3400

Tamaño (cm)

32

Estado

Casi Endémica



Generalmente poco común a raro. En pareja o grupos pequeños se encuentra en el bosque nuboso y en los bordes de bosque.



Foto por: Fabio N. Arias



Carriquí verdiamarillo

Cyanocorax yncas

Green Jay

Distribución (m.s.n.m)


600 - 3000

Tamaño (cm)

26

Estado

Residente



Es común y fácil de ver, vocalmente activo. Habita bosques húmedos o nublados, más común en zonas de alta montaña que en sitios bajos. Se encuentra en grupos familiares.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco



♂

Golondrina plomiza

Orochelidon murina

Brown-bellied Swallow

Distribución (m.s.n.m)


2000 - 3700

Tamaño (cm)

14

Estado

Residente



Golondrina bastante oscura de las tierras altas andinas. Las bandadas se encuentran en bosques y claros, especialmente cerca de sitios de anidación en acantilados y deslizamientos de tierra.

● Reserva Forestal Río Blanco

142



♂

Foto por: Paola Rendón

Golondrina azul y blanca

Pygochelidon cyanoleuca

Blue-and-white Swallow

Distribución (m.s.n.m)


< 3000

Tamaño (cm)

12.5

Estado

Residente



Especie muy común, abundante y fácil de observar en zonas urbanas, áreas abiertas o semiabiertas y zonas agrícolas. Suele tener un vuelo prolongado y permanece en grupos grandes que se alimentan capturando presas en el aire. A veces se perchan en cables o postes de energía.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



Foto por: Fabio N. Arias

♂

Cucarachero común

Troglodytes aedon

House Wren

Distribución (m.s.n.m)


< 3000

Tamaño (cm)

12

Estado

Residente



Especie muy común y oída con frecuencia en zonas verdes de ciudades, jardines y plantaciones. A menudo cerca de las casas. Permanece solo o en pareja en la parte baja del bosque o en tierra firme.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco



♂

Zorzal de swainson

Catharus ustulatus

Swainson's Thrush

Distribución (m.s.n.m)


< 3000

Tamaño (cm)

18

Estado

Migratoria Boreal



Es el zorzal migratorio más común, transeúnte y residente de invierno. Se observa normalmente en la selva, monte claro y secundario. En Colombia, se le ha reportado alimentándose de los frutos de *Cecropia telealba*. Es un ave tímida y usualmente vista cerca de cubierta densa, a veces en bandadas mixtas.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



♂

Mirla ollera

Turdus ignobilis

Black-billed Thrush

Distribución (m.s.n.m)


< 2600

Tamaño (cm)

23

Estado

Residente



Común y visible en áreas ocupadas por el hombre. Individuos o parejas saltan por el suelo en los prados y en general en áreas abiertas. También suelen verse en arbustos o árboles en áreas con más vegetación.

Yellow dot: Monumento Colonizadores | Green dot: Ecoparque Los Alcázares

Pink dot: Bosque Popular el Prado | Blue dot: Ecoparque Los Yarumos



♂

Mirla parda

Turdus grayi

Clay-colored Thrush

Distribución (m.s.n.m)


< 1600

Tamaño (cm)

25

Estado

Residente



Fáciles de ver en el suelo o en estrato bajo de vegetación secundaria o de bosques bien conservados, también en áreas abiertas con árboles dispersos y jardines. Ocasionalmente pueden ascender al dosel a alimentarse

● Ecoparque Los Alcázares



♂

Mirla patinaranja

Turdus fuscater

Great Thrush

Distribución (m.s.n.m)


1700 - 4000

Tamaño (cm)

32

Estado

Residente



Es una de las mirlas más comunes en climas fríos, abundante en bordes de bosque húmedo y plantaciones. Son territoriales, cantan poco y cuando lo hacen es en las madrugadas.

● Monumento Colonizadores | ● Bosque Popular el Prado

● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



♂

Mirla serrana

Turdus serranus

Glossy-black Thrush

Distribución (m.s.n.m)


1400 - 3000

Tamaño (cm)

23

Estado

Residente



Usualmente, se encuentra en el bosque nuboso o en los bordes y claros. Tiende a permanecer oculto, pero los machos a veces se perchan más visiblemente para cantar al amanecer y al atardecer.



♂

Jilguero aliblanco

Spinus psaltria

Lesser Goldfinch

Distribución (m.s.n.m)


500 - 3100

Tamaño (cm)

10

Estado

Residente



Suele observarse errante, en pareja o en pequeñas bandadas, desde el suelo hasta las copas de los árboles; con frecuencia come en cunetas o áreas enmalezadas y en el suelo.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco

150



Foto por: Fabio N. Arias

Azulejo montañero

Chlorophonia cyanocephala

Golden-rumped Euphonia

Distribución (m.s.n.m)


1700 - 3200

Tamaño (cm)

16

Estado

Residente



Se observa en pareja o, con menos frecuencia, en grupos de 3-8 individuos. Usualmente se halla en niveles medios de los árboles pero desciende a arbustos con fruta.



Eufonia gorgiamarilla

Euphonia laniirostris

Thick-billed Euphonia

Distribución (m.s.n.m)


< 2000

Tamaño (cm)

10

Estado

Residente



Se observa solitaria, en pareja y ocasionalmente en pequeños grupos y en bandadas mixtas, especialmente con otras eufonias. Principalmente se encuentra a nivel medio o alto en los árboles.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos



♂

Montero ojiblanco

Chlorospingus flavopectus

Common Chlorospingus

Distribución (m.s.n.m)


1200 - 3100

Tamaño (cm)

14

Estado

Residente



Generalmente, se observa en pequeños grupos inquietos, moviéndose en todos los niveles a través del bosque y borde, a menudo en árboles y arbustos con frutos. Comúnmente es un miembro central en las bandadas de forrajeo de especies mixtas.

● Monumento Colonizadores | ● Bosque Popular el Prado

● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



♂

Atlapetes pizarroso

Atlapetes schistaceus

Slaty Brushfinch

Distribución (m.s.n.m)


2000 - 3600

Tamaño (cm)

18

Estado

Residente



Una especie de elevaciones altas. En pareja usualmente forrajean en los niveles más bajos, a veces acompañando una bandada de especies mixtas.



♂

Atlapetes cabeciblanco

Atlapetes pallidinucha

Pale-naped Brushfinch

Distribución (m.s.n.m)


2500 - 3600

Tamaño (cm)

18

Estado

Casi Endémica



Suele observarse en pareja o en familia, saltando cerca del suelo o buscando en el follaje y comiendo frutas; principalmente se ve a menos de 3 metros. Regularmente se encuentra en bandadas mixtas y es fácil de ver, pues es curioso.



♂

Gorrión listado

Arremon assimilis

Gray-browed Brushfinch

Distribución (m.s.n.m)


2200 - 3600

Tamaño (cm)

19.5

Estado

Residente



Es semiterrestre. Suele observarse solitario o en pareja, oculto en sotobosque denso o cerca del suelo. Voltea hojas con su pico. Usualmente es difícil de ver.



♂

Gorrión collarejo

Arremon brunneinucha
Chestnut-capped Brushfinch

Distribución (m.s.n.m)


800 - 2600

Tamaño (cm)

18

Estado

Residente



Semiterrestre y muy escondidizo, fácilmente pasa desapercibido pero es curioso y puede exponerse. Suele observarse solitario o en pareja. Es muy silencioso, salta por el suelo o a baja altura en sotobosque; volteá hojas con el pico.

- Ecoparque Los Alcázares | ● Bosque Popular el Prado
- Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



♂


Copetón común

Zonotrichia capensis
Rufous-collared Sparrow

Distribución (m.s.n.m)
< 3600

Tamaño (cm)
12.5

Estado
Residente



Habita en áreas abiertas desde el nivel del mar hasta altas elevaciones. Con frecuencia se observa en bordes de carreteras, en parques y viviendas. También se ve en áreas agrícolas y terrenos abiertos con árboles dispersos. Es una especie bastante conspicua que permanece cerca del suelo.

- Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares
- Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



♂



Foto por: Paola Rendón

Chamón parásito

Molothrus bonariensis

Shiny Cowbird

Distribución (m.s.n.m)


< 2600

Tamaño (cm)

19

Estado

Residente



Camina con la cola ligeramente erecta. A menudo forrajea en el suelo en sitios abiertos. Suele hallarse solitario o, más frecuentemente, en pequeños grupos. No muestra preferencia especial por el ganado.

Yellow dot: Monumento Colonizadores | Green dot: Ecoparque Los Alcázares

Pink dot: Bosque Popular el Prado | Teal dot: Ecoparque Los Yarumos | Blue dot: Reserva Forestal Río Blanco



♂

Turpial montañero

Icterus chrysater

Yellow-backed Oriole

Distribución (m.s.n.m)


< 2800

Tamaño (cm)

21

Estado

Residente



Suele hallarse en pareja o en grupos de hasta 10 individuos. Actúa como otros turiales, saltando a lo largo de las ramas, explorando flores y ocasionalmente cantando fuertemente.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos

160



♂

Reinita enlutada

Geothlypis philadelphus

Mourning Warbler

Distribución (m.s.n.m)


< 3000

Tamaño (cm)

13

Estado

Migratoria Boreal



Furtiva en pastos, como otras de su género, pero normalmente no es difícil de ver. Se alimenta de insectos.



♂

Reinita del Canadá

Cardellina canadensis

Canada Warbler

Distribución (m.s.n.m)


< 3000

Tamaño (cm)

13

Estado

Migratoria Boreal



Usualmente se ve a 1 - 10 metros en el follaje más denso; a menudo en bandadas mixtas. Transeúnte y residente de invierno común. Habita en áreas de bosque, especialmente en bordes con matorral en las montañas.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco



♂

Reinita naranja

Setophaga fusca
Blackburnian Warbler

Distribución (m.s.n.m)


600 - 3500

Tamaño (cm)

13

Estado

Migratoria Boreal



Se encuentra generalmente sola o en bandadas mixtas a nivel medio o superior. Es visible. Residente de invierno y transeúnte muy común y de amplia distribución.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco



♂

Reinita tropical

Setophaga pitiayumi

Tropical Parula

Distribución (m.s.n.m)


< 2700

Tamaño (cm)

11

Estado

Residente



Suele hallarse solitaria o en pareja y busca en follaje de subdosoel y, a veces, en arbustos.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos



♂

Reinita trepadora

Mniotilla varia

Black-and-White Warbler

Distribución (m.s.n.m)


< 2700

Tamaño (cm)

13

Estado

Migratoria Boreal



Solitaria o en bandadas mixtas; trepa por troncos y ramas grandes desde sotobosque a subdosal. Es una especie migratoria.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



♂

Arañero ribereño

Myiothlypis fulvicauda

Buff-rumped Warbler

Distribución (m.s.n.m)


< 1600

Tamaño (cm)

13.5

Estado

Residente



Es terrestre. Salta, rara vez camina, por las orillas de charcos o arroyos y mueve la cola abierta en abanico de un lado a otro. Canta desde el suelo o los troncos.



♂

Arañero cabecinegro

Myiothlypis nigrocristata

Black-crested Warbler

Distribución (m.s.n.m)


2400 - 3500

Tamaño (cm)

13.5

Estado

Residente



Activo pero difícil de ver, usualmente en matorrales más densos de bambú. Generalmente se observan 1 o 2 individuos, en bandadas mixtas.

● Reserva Forestal Río Blanco



Arañero cabecilistado

Basileuterus tristriatus

Three-striped Warbler

Distribución (m.s.n.m)


500 - 2600

Tamaño (cm)

13

Estado

Residente



Suele encontrarse en pareja o en pequeños grupos en nivel bajo, buscando acrobáticamente en el follaje y parloteando ruidosamente; a menudo en bandadas mixtas. Común en sotobosque de selva húmeda y muy húmeda.



♂

Foto por: Fabio N. Arias

Abanico pechinegro

Myioborus miniatus
Slate-throated Redstart

Distribución (m.s.n.m)


600 - 2700

Tamaño (cm)

13

Estado

Residente



Visible, activo y constantemente abriendo la cola en abanico y entreabriendo las alas, mientras vuela distancias cortas. Salta a lo largo de ramas altas o bajas, o cuelga momentáneamente de troncos o enredaderas.

Yellow dot: Monumento Colonizadores | Green dot: Ecoparque Los Alcázares

Pink dot: Bosque Popular el Prado | Teal dot: Ecoparque Los Yarumos | Blue dot: Reserva Forestal Río Blanco



Abanico colombiano

Myioborus chrysops

Colombian Whitestart

Distribución (m.s.n.m)


2000 - 3600

Tamaño (cm)

13

Estado

Endémica



Se observa con frecuencia en pequeñas bandadas de su propia especie o como núcleo de bandadas mixtas. Revolotea y vuela corto activamente. Suele ser tranquilo.



♂

Piranga bermeja

Piranga flava

Hepatic Tanager

Distribución (m.s.n.m)


1400 - 2300

Tamaño (cm)

18

Estado

Residente



Suele observarse solitaria o en pares, en la parte alta de los árboles. Es poco visible mientras busca en follaje y ramitas.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos



Piranga roja

Piranga rubra

Summer Tanager

Distribución (m.s.n.m)


< 3200

Tamaño (cm)

17.5

Estado

Migratoria Boreal



Suele encontrarse solitario o en bandadas mixtas. Permanece al interior de árboles más bien ralos; busca en el follaje y con frecuencia vuela al aire en pos de insectos; ocasionalmente se encuentra en árboles de fruta.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



Foto por: Fabio N. Arias

Volatinero negro

Volatinia jacarina

Blue-black Grassquit

Distribución (m.s.n.m)


< 2300

Tamaño (cm)

10

Estado

Residente



Ave de terrenos abiertos y solitarios. Come semillas de gramíneas. Su salto de despliegue es parte del comportamiento de formación de pareja y de defensa territorial.



Espiguero murinanegriblanco

Sporophila luctuosa
Black-and-white Seedeater

Distribución (m.s.n.m)


1300 - 2600

Tamaño (cm)

11

Estado

Residente



Se encuentra usualmente en pareja o en pequeñas bandadas, de una sola especie, en pastos o arbustos bajos.



♂

Espiguero gris

Sporophila intermedia

Gray Seedeater

Distribución (m.s.n.m)


< 2300

Tamaño (cm)

11

Estado

Residente



Suele verse en pareja o en pequeños grupos (laxos) que, con frecuencia, se agrupan con otros espigueros y semilleros.

● Ecoparque Los Alcázares



♂

Espiguero capuchino

Sporophila nigricollis

Yellow-bellied Seedeater

Distribución (m.s.n.m)


< 2200

Tamaño (cm)

10

Estado

Residente



La mayoría de las veces se encuentran en bandadas o parejas en pastizales abiertos, a veces cerca del borde del bosque, pero también en áreas agrícolas.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos | ● Reserva Forestal Río Blanco



♂

Semillero cariamarillo

Tiaris olivaceus

Yellow-faced Grassquit

Distribución (m.s.n.m)


700 - 2400

Tamaño (cm)

10.5

Estado

Residente



Se observa usualmente en pareja y, con menos frecuencia, en pequeños grupos. Come semillas en el suelo o colgando de los tallos. Tiene un vuelo corto y zumbante.



♂

Sicalis coronado

Sicalis flaveola

Saffron Finch

Distribución (m.s.n.m)


< 2600

Tamaño (cm)

14.5

Estado

Residente



Presente en sabanas con presencia de árboles dispersos, bordes de monte claro o pantanos, prados y jardines, bosques secos abiertos, cultivos, áreas urbanas. Se alimenta principalmente de semillas y artrópodos pequeños; suele comer en el suelo y se posa en los arbustos y árboles bajos.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Blue circle: Ecoparque Los Yarumos



Saltátor alinegro

Saltator atripennis

Black-winged Saltator

Distribución (m.s.n.m)


600 - 2300

Tamaño (cm)

20.5

Estado

Casi Endémica



Más difícil de ver que otros saltators colombianos. Se observa solitario o en grupos ruidosos; con frecuencia se halla también en bandadas mixtas, principalmente en busca de fruta, desde nivel medio a dosel.



♂

Saltátor pío-judío

Saltator striaticeps

Streaked Saltator

Distribución (m.s.n.m)


< 2500

Tamaño (cm)

19.5

Estado

Residente



Canta en la mañana, desde perchas expuestas, pero el resto del día prefiere estar oculto cerca de o en matorrales. Se observa solitario, en pareja o en tríos y es frugívoro.



♂

Saltátor enmascarado

Saltator cinctus

Masked Saltator

Distribución (m.s.n.m)


2000 - 3000

Tamaño (cm)

21.5

Estado

Residente



Raro. Generalmente se encuentra solo o en pares en los niveles inferior y medio en el bosque, ocasionalmente puede unirse a bandadas de especies mixtas.



♂

Gorrión afelpado

Catamblyrhynchus diadema

Plushcap

Distribución (m.s.n.m)


2000 - 3500

Tamaño (cm)

14

Estado

Residente



Usualmente se encuentra en pares o grupos pequeños, casi siempre siguiendo una bandada de especies mixtas. Es especialista en bambúes, salta por sus tallos o cuelga cabeza abajo y busca en el follaje y los tallos.



♂

Rey del Quindío

Sericossypha albocristata

White-capped Tanager

Distribución (m.s.n.m)


1800 - 3300

Tamaño (cm)

24

Estado

Residente



Bandadas ruidosas de 5-20 individuos recorren grandes distancias por el dosel o se posan en los arbustos y árboles pequeños; generalmente se escuchan mucho antes de ser vistos.



Foto por: Paola Rendón



Toche pico de plata

Ramphocelus dimidiatus

Crimson-backed Tanager

Distribución (m.s.n.m)


< 2200

Tamaño (cm)

16

Estado

Casi Endémica



Suele verse en pareja o en grupos familiares laxos, de 3-6 individuos. Se posa en silencio o moviéndose perezosamente, desde el sotobosque hasta niveles medios; a veces sigue bandadas mixtas. Come fruta, posado o en vuelo suspendido.



Foto por: Paola Rendón

Asoma candela

Ramphocelus flammigerus

Flame-rumped Tanager

Distribución (m.s.n.m)


< 2200

Tamaño (cm)

18

Estado

Residente



Ruidoso y visible. Usualmente se observa en grupos pequeños, en matorrales o en pequeños árboles y arbustos de fruta. El macho con frecuencia se posa expuesto con las alas caídas y la rabadilla expuesta.

185



Foto por: Fabio N. Arias

Hemispingus cabecinegro

Kleinothraupis atropileus

Black-capped Hemispingus

Distribución (m.s.n.m)


2000 - 3500

Tamaño (cm)

16

Estado

Residente



Suele hallarse en pareja o en pequeños grupos, activos y reminescentes de reinitas. Busca en el follaje más denso de arbustos y bambúes, o desde cerca del suelo a niveles medios en árboles más altos; una especie principal de bandadas mixtas, en zonas templadas.



Foto por: Paola Rendón

Conirrostro capirotado

Conirostrum albifrons

Capped Conebill

Distribución (m.s.n.m)


1500 - 3000

Tamaño (cm)

13

Estado

Residente



Ave pequeña parecida a una tangara. Incluso con poca luz, fácilmente se encuentra en una bandada de especies mixtas por el frecuente movimiento hacia arriba y hacia abajo de la cola.



♂

Conirrostro dorsiazul

Conirostrum sitticolor

Blue-backed Conebill

Distribución (m.s.n.m)


2500 - 3600

Tamaño (cm)

13

Estado

Residente



Típicamente se encuentra en pares o pequeños grupos familiares en los niveles medio y superior del bosque templado y del borde. A menudo sigue bandadas de especies mixtas.



♂

Diglosa canela

Diglossa sitoides

Rusty Flowerpiercer

Distribución (m.s.n.m)


1300 - 3400

Tamaño (cm)

11

Estado

Residente



Se encuentra en áreas arbustivas bastante abiertas y jardines; no en el bosque. Perfora flores y a veces caza insectos al aire. A menudo se encuentra en pareja y, muy rara vez, en bandadas mixtas.

189



♂



Foto por: Paola Rendón

Diglossa albilateral

Diglossa albilateral

White-sided Flowerpiercer

Distribución (m.s.n.m)


1400 - 3500

Tamaño (cm)

12

Estado

Residente



Muy activa, frecuentemente mueve las alas mientras perfora flores a nivel medio o más bajo, especialmente en árboles. A menudo se halla en pareja y en ocasiones se ve en bandadas mixtas.

190



♂

Diglosa de antifaz

Diglossa cyanea
Maked Flowerpiercer

Distribución (m.s.n.m)


1500 - 3500

Tamaño (cm)

15

Estado

Residente



Suele hallarse solitaria o en bandadas mixtas. Menos activa y más frugívora que otras diglosas más pequeñas; usualmente en dosel, aunque ocasionalmente a baja altura. Medianamente común en selva húmeda y bordes.



♂

Mielero común

Coereba flaveola

Bananaquit

Distribución (m.s.n.m)


< 2000

Tamaño (cm)

11

Estado

Residente



Ave pequeña, muy activa. Se encuentra solitaria o en pareja, a casi cualquier altura sobre el suelo; busca néctar en flores y come pequeñas bayas. Es tranquila. Es común verla en jardines, plantaciones y áreas de matorral.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos



Foto por: Paola Rendón



Mielero verde

Chlorophanes spiza

Green Honeycreeper

Distribución (m.s.n.m)


< 2300

Tamaño (cm)

13

Estado

Residente



Muy activo. Se encuentra usualmente solitario o en pareja, en nivel medio a dosel; come fruta, vuela corto al aire en pos de insectos y liba néctar; comúnmente sigue bandadas mixtas de tárugas y mieleros.

193



♂

Azulejo montañero

Sporathraupis cyanocephala

Blue-capped Tanager

Distribución (m.s.n.m)


1700 - 3200

Tamaño (cm)

16

Estado

Residente



Usualmente solos o en pareja, a menudo siguen una bandada de especies mixtas. Se encuentra en cualquier arboleda abierta, incluyendo bordes del bosque, vegetación secundaria y jardines.



♂

Tangara lorito

Chlorornis riefferii

Grass-green Tanager

Distribución (m.s.n.m)


2000 - 3400

Tamaño (cm)

20

Estado

Residente



Bastante común en bosques montanos y bordes, donde solos o parejas a menudo se mueven lentamente con bandadas de especies mixtas. Forrajea en todos los niveles.



♂

Dubusia diadema

Dubusia taeniata

Buff-breasted Mountain Tanager

Distribución (m.s.n.m)


2200 - 3400

Tamaño (cm)

20

Estado

Residente



Es más fácil escucharla que observarla. Suele verse solitaria, en pares o en bandadas mixtas. Cubre extensas áreas, buscando y saltando deliberadamente a todos los niveles; a veces se posa, por unos minutos, en la copa de algún arbusto.



♂

Azulejo real

Buthraupis montana
Hooded Mountain Tanager

Distribución (m.s.n.m)


2000 - 3600

Tamaño (cm)

21

Estado

Residente



Es usual verla en grupos de 3 - 10 individuos que recorren distancias considerables por escarpes o cañones selváticos. Salta por ramas externas y follaje del dosel y come fruta. También suele hallarse en bandadas mixtas.

● Reserva Forestal Río Blanco



♂

Clarinero lacrimoso

Anisognathus lacrymosus

Lachrimose Mountain Tanager

Distribución (m.s.n.m)


2000 - 3600

Tamaño (cm)

16.5

Estado

Residente



Se observa en pareja o en bandadas mixtas. Salta y busca cuidadosamente en el follaje, come frutas y ocasionalmente vuela, torpemente, al aire en búsqueda de insectos.



Foto por: Fabio N. Arias

♂

Clarinero primavera

Anisognathus somptuosus

Blue-winged Mountain Tanager

Distribución (m.s.n.m)


1300 - 2800

Tamaño (cm)

16.5

Estado

Residente



Suele encontrarse en pareja o en grupos de 3 a 10 individuos, saltando activamente por ramas externas o en el follaje terminal, donde cogen fruta y buscan insectos. Se observan solitarios o en bandadas mixtas; generalmente en niveles medios del dosel.

199



Clarinero escarlata

Anisognathus igniventris
Scarlet-bellied Mountain Tanager

Distribución (m.s.n.m)


2400 - 3600

Tamaño (cm)

16

Estado

Residente



Suele hallarse en parejas o en grupos pequeños, ocasionalmente de 15 o más individuos. Se desliza silencioso a lo largo de setos densos, mediante vuelos cortos y ondulantes.



♂

Tangara de antifaz

Pipraeidea melanonota

Fawn-breasted Tanager

Distribución (m.s.n.m)


1000 - 3000

Tamaño (cm)

14

Estado

Residente



Ave pequeña. Poco común en el bosque secundario, bordes y jardines, donde se ve más a menudo sola o en pares. Ocasionalmente sigue bandadas de especies mixtas.



♂

Tangara rastrojera

Stilpnia vitriolina

Scrub Tanager

Distribución (m.s.n.m)


300 - 2500

Tamaño (cm)

14

Estado

Casi Endémica



Suele verse solitaria o en pareja. Ocasionalmente se observa en árboles o arbustos con fruta.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Pink circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco



♂



Foto por: Paola Rendón

Tangara capirotada

Stilpnia heinei

Black-capped Tanager

Distribución (m.s.n.m)


1400 - 2300

Tamaño (cm)

13

Estado

Residente



Suele hallarse en pareja o en grupos hasta de 6 individuos y, con frecuencia, en bandadas mixtas. Se encuentra especialmente en árboles y arbustos con fruta. Salta y revolotea en el follaje.

Yellow circle: Monumento Colonizadores | Green circle: Ecoparque Los Alcázares

Red circle: Bosque Popular el Prado | Teal circle: Ecoparque Los Yarumos | Blue circle: Reserva Forestal Río Blanco

203



♂

Tangara real

Stilpnia cyanicollis

Blue-necked Tanager

Distribución (m.s.n.m)


700 - 2200

Tamaño (cm)

12

Estado

Residente



Suele hallarse solitaria, en pareja o en familia, a alturas variables en los árboles. Vuela, torpemente, al aire para cazar insectos o salta por el follaje y en árboles y arbustos de fruta.



♂

Tangara de lentejuelas

Tangara nigroviridis

Beryl-spangled Tanager

Distribución (m.s.n.m)


1100 - 3000

Tamaño (cm)

12

Estado

Residente



Usualmente busca debajo de ramas pequeñas y a veces en mechones de musgo de ramas delgadas. Se encuentra en pareja o en grupos de 12 o más individuos y en bandadas mixtas. Es notablemente frugívora.



♂

Tangara verdiplata

Tangara labradorides

Metallic-green Tanager

Distribución (m.s.n.m)


1400 - 2600

Tamaño (cm)

12

Estado

Casi Endémica



Habita claros de bosque, bordes de bosque y pastizales enmalezados. Puede encontrarse en grupos de 3-5 individuos y formar parte de bandadas mixtas con otras tangaras.



♂

Tangara cabecirroja

Tangara gyrola

Bay-headed Tanager

Distribución (m.s.n.m)


< 2200

Tamaño (cm)

12

Estado

Residente



Suele hallarse en árboles y arbustos con fruta, usualmente en nivel medio o más alto, buscando cabeza abajo en las ramas. Se observa solitaria, en pareja o en familia y ,con frecuencia, en bandadas mixtas.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos



♂

Tangara coronada

Tangara xanthocephala

Safron-crowned Tanager

Distribución (m.s.n.m)


1200 - 2400

Tamaño (cm)

13

Estado

Residente



A menudo avanza por pequeñas ramas. Generalmente se encuentra en bordes o en monte secundario alto y, con menor frecuencia, al interior de la selva. Es frugívora.



♂

Tangara dorada

Tangara arthus

Golden Tanager

Distribución (m.s.n.m)


1200 - 2500

Tamaño (cm)

13

Estado

Residente



Explora en ramas desnudas o en musgo, en busca de insectos. Suele verse en bandadas mixtas con otras especies. Se observa solitario, en pareja y a veces en pequeños grupos.

Yellow dot: Monumento Colonizadores | Green dot: Ecoparque Los Alcázares

Pink dot: Bosque Popular el Prado | Teal dot: Ecoparque Los Yarumos



Azulejo palmero

Thraupis palmarum

Palm Tanager

Distribución (m.s.n.m)


< 2600

Tamaño (cm)

17

Estado

Residente



Habita bordes de bosque, áreas abiertas, jardines arbolados y es muy común encontrarlo en zonas urbanas. Puede observarse en pareja o en grupos que suelen ser muy ruidosos.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos

210



♂

Azulejo común

Thraupis episcopus

Blue-gray Tanager

Distribución (m.s.n.m)


< 2600

Tamaño (cm)

16

Estado

Residente



Es una de las aves más comunes de Colombia en áreas pobladas. Sociable, se encuentra en pareja o en pequeños grupos. Caza insectos al aire y visita árboles en flor y fruta.

● Monumento Colonizadores | ● Ecoparque Los Alcázares

● Bosque Popular el Prado | ● Ecoparque Los Yarumos

Lista

de aves

Abanico cariblanco	170
Abanico pechinegro	169
Águila migratoria	59
Águila pescadora	55
Águila real de montaña	57
Amazilia andino	48
Amazilia coliazul	46
Amazilia colirrufo	47
Arañero cabecilistado	168
Arañero cabecinegro	167
Arañero ribereño	166
Asoma candela	185
Atlapetes cabeciblanco	155
Atlapetes pizarroso	154
Atrapamoscas canelo	121
Atrapamoscas lagartero	133
Atrapamoscas maculado	135
Atrapamoscas montañero	128
Atrapamoscas orejinegro	113
Atrapamoscas pechirrojo	120
Atrapamoscas sulfurado	134
Autillo gorjiblanco	61
Azulejo común	211
Azulejo montañero	151
Azulejo montañero	194
Azulejo palmero	210
Azulejo real	197
Barranquero	67
Batará carcajada	89
Batará mayor	88
Bichofué	132
Bienparado común	21
Bigotudo canoso	68
Buhito andino	63
Búho de anteojos	62
Búho orejudo	64
Cabezón aliblanco	111
Cabezón barrado	112
Caminera rabiblanca	16
Carpintero cariblanco	77
Carpintero carmesí	78
Carpintero de los robles	75
Carpintero gigante	80
Carpintero habado	76
Carpintero punteado	74
Carpintero real	79
Carriquí verdiamarillo	141
Chamón parásito	159
Chillón común	27
Chillón verde	26
Clarinero escarlata	200
Clarinero lacrimoso	198
Clarinero primavera	199
Cola de raqueta	39
Colibrí chupasavia	38
Colibrí collarejo	22
Colibrí buffon	45
Colibrí pechipunteado	30
Colibrí rumbito pechiblanco	43
Colibrí terciopelo	36
Conirrostro capirotado	187
Conirrostro dorsiazul	188
Copetón común	158
Coquito	52

Corretroncos perlado	103
Cotorra maicera	83
Cotorra montañera	85
Cucarachero común	144
Cuco ardilla	20
Currucutú común	60
Diglosa albílateral	190
Diglosa canela	189
Diglosa de antifaz	191
Dubusia diadema	196
Elaenia copetona	117
Ermitaño verde	23
Esmeralda occidental	44
Espatulilla común	125
Espiguero capuchino	176
Espiguero gris	175
Espiguero murinanegríblanco	174
Eufonia gorgijamarilla	152
Frutero barrado	109
Frutero verdinegro	108
Gallinazo común	53
Garrapatero común	19
Garza bueyera	51
Gavilán caminero	58
Gavilán pico de gancho	56
Golondrina azul y blanca	143
Golondrina plomiza	142
Gorrión afelpado	182
Gorrión collarejo	157
Gorrión listado	156
Guacharaca colombiana	12
Guala común	54
Guardabosque cenizo	110
Heliángelus belicoso	29
Heliodoxa leonado	40
Hemispingus cabecinegro	186
Hormiguero rabilargo	90
Hormiguero de parker	91
Hormiguero inmaculado	92
Inca broncíneo	34
Inca collarejo	35
Jilguero aliblanco	150
Lora andina	86
Loro cabeciazul	84
Mango pechinegro	28
Metalura colirrojo	32
Mielero común	192
Mielero verde	193
Mionectes estriado	114
Mirla ollera	146
Mirla parda	147
Mirla patinaranja	148
Mirla serrana	149
Montero ojiblanco	153
Paloma collareja	13
Paloma colorada	14
Paloma-perdiz Bigotuda	15
Paramero rabilorcado	33
Pava andina	11
Pava maraquerá	10
Pellar común	49
Perico paramuno	87
Periquito de anteojos	82
Pibí ahumado	126
Pico de cuña	25
Pico de espada	37
Pico de lanza frentiverde	24
Picudo coronado	41
Pigua	81
Piranga bermeja	171
Piranga roja	172
Pitajo diadema	118
Pitajo torrentero	119
Playero solitario	50
Quetzal de cabeza dorada	65
Rastrojero de azara	107
Rastrojero pálido	106
Rastrojero rubicundo	105
Reinita del Canadá	162
Reinita enlutada	161
Reinita naranja	163
Reinita trepadora	165
Reinita tropical	164
Rey del Quindío	183
Saltátor alinegro	179
Saltator enmascarado	181
Saltátor pío-judío	180
Semillero cariamarillo	177
Sicalis coronado	178
Silfo coliverde	31
Sirirí bueyero	136
Sirirí común	130
Sirirí tijereta	129
Suelda crestinegra	131
Tangara cabecirroja	207
Tangara capirotada	203
Tangara coronada	208
Tangara de antifaz	201
Tangara de lentejuelas	205
Tangara dorada	209
Tángara lorito	195
Tangara rastrojera	202
Tangara real	204
Tangara verdiplata	206
Tapaculo ocelado	100
Terlaque andino	72
Terlaque pechiazu	73
Tiranuelo capirrufo	124
Tiranuelo cejiamarillo	115
Tiranuelo pileado	122
Tiranuelo saltarroyo	127
Tiranuelo silbador	116
Titirijí gorjinegro	123
Toche pico de plata	184
Torcaza nagüiblanca	17
Torito cabecirrojo	69
Tororoi chusquero	96
Tororoi comrapán	95
Tororoi de Miller	98
Tororoi dorsiescamado	94
Tororoi enano	99
Tororoi ondulado	93
Tororoi rufocenizo	97
Tortolita común	18
Trepador gigante	101
Trepatorcos montano	102
Trogón enmascarado	66
Tucancito esmeralda	70
Tucancito rabilorrojo	71
Turpial montañero	160
Urraca de cuello negro	140
Verderón castaño	138
Verderón montañero	139
Verderón piquinegro	137
Volatinero negro	173
Xenops estriado	104
Zorzal de swainson	145
Zumbador ventriblanco	42

Bibliografía

- ACO. (2018). South American Classification Committee. (Asociación Colombiana de Ornitología, Editor) Obtenido de Species List of birds for South American countries and territories: Colombia
- Clements, J. F., Schulemberg, M. J., Liff, D., Roberson, T. A., Fredericks, B. L., Sullivan, B. L., & Wood, C. L. (2018). The eBird/Clements Checklist of birds of the world, 2018.
- Ayerbe-Quiñones, F. (2018) Guia Ilustrada de la avifauna colombiana. Wildlife Conservation Society, Bogota, Colombia.
- Chaparro-Herrera, S., Echeverry-Galvis, M. A., Cordoba-Cordoba, S., & Sau-Becerra, A. (2013). Listado actualizado de las aves endémicas y casi endémicas de Colombia. Biota Colombiana. 14(2)
- Arias, F. N., Rendon, Y. P., & Aristizábal, D. F. (2021) Guía de aves representativas del municipio de Villamaria.
- Arias, F. N., Aves de Manizales y sus Alrededores