

GUÍA DE AVES

REPRESENTATIVAS

DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA



CALDAS
2021



Villamaría,
mucho por
descubrir


“

Siempre nos preguntamos por la existencia de las naturalezas y por eso tomamos una posición de respeto hacia los verdes, la vida, el agua, los árboles, los astros y todos los seres vivientes de los cuales asumimos su importancia en el mundo de la sostenibilidad ambiental.

Fueron estas diferentes representaciones de la vida natural las que nos llevaron a elaborar unas estrategias para que nuestro municipio sea descubierto por la humanidad, y sus aves sean contadas por las siguientes generaciones, teniendo a Villamaría como referente de la riqueza mundial, digna de visitar y avistar.

El turismo de naturaleza, en nuestro quehacer diario, nos brinda la posición estratégica de poder impactar, desde la esfera ambiental, muchas otras áreas que hoy tenemos la fortuna de seguir descubriendo y liderando desde la alcaldía y la oficina de turismo en el territorio que nos vio nacer. Este territorio tiene como orientación estratégica una línea de investigación natural que hace hincapié en la importancia que tienen las aves para un municipio. La avifauna juega un papel fundamental en la oferta turística de Villamaría. Por eso queremos contarle al mundo que, nuestras características y ubicación geográfica, hacen de nuestro municipio un lugar único, un corredor biológico que alberga vida incalculable y, que además, ahora cuenta con su propio equipo en investigación de aves.





La caracterización de las aves de nuestro municipio genera identidad y respeto natural que se traduce en un elevamiento de la moral humana.

Esta caracterización será pedagógicamente ilustrada por los maestros de las ciencias naturales de nuestras escuelas y colegios, guías locales, baqueanos y avistadores de aves. Con esta apropiación de lo que tenemos en nuestras tierras, se generará amor propio por nuestro municipio y una consecuente oferta turística responsable con el medio ambiente.

Debemos reafirmar el compromiso de toda la administración que, con ejemplo inigualable de gestión, impacta comunidades para seguir este sueño.

Agradecemos a nuestras familias, amigos y por supuesto a nuestros equipos de trabajo interno y externo que reman hacia el mismo lado con la fuerza que solo la pasión por este municipio les puede brindar. Agradecemos también a Dios por sus paraísos y la oportunidad de vivir en ellos. El querer no es el estar, es estar cuando se quiere.

"Villamaría, mucho por descubrir".

”

**ANDRÉS FELIPE
ARISTIZÁBAL PARRA**
Alcalde Municipal

INTRODUCCIÓN

El municipio de Villamaría se encuentra enclavado en la vertiente occidental de la cordillera central de los Andes, en Colombia, una región conocida como uno de los grandes centros de biodiversidad del mundo; la riqueza de aves en los Andes está asociada con muchas especies que ocupan una línea de elevación estrecha, promoviendo una densa segregación vertical de diferentes especies a lo largo de un gradiente de elevación (Newton, 2003). Villamaría posee un amplio rango de elevación que ofrece diversos ecosistemas y, que a su vez, favorece los altos índices de biodiversidad, lo cual es concordante con la gran riqueza de especies de aves que habitan el municipio. Los numerosos hábitats y microclimas locales dan albergue a cientos de especies, entre ellas muchas en algún grado de amenaza y categoría de conservación y, así mismo, a algunas especies endémicas, únicas en el mundo. Sin embargo, la región Andina de Colombia concentra los mayores centros urbanos, con casi el 70% de la población, y en este territorio se desarrollan gran parte de las actividades agrícolas y pecuarias del país (Villareal 2006, Restrepo-Cardona 2015). Esto ha generado la transformación del 70% de su cobertura de bosque original (Etter y Van Wyngaarden 2000) y por ende ha provocado una reducción de su fauna y flora asociadas.





Las aves son un variado grupo de animales con gran radiación adaptativa. Habitán en todos los ecosistemas del planeta y, por su forma, cantos y comportamientos, pueden ser relativamente fáciles de detectar. Una de las principales razones para estudiar las aves, es que nos pueden dar pistas sobre el estado de salud del medio ambiente, ya que las especies que están a nuestro alrededor cumplen distintas tareas que benefician, en gran medida, los ecosistemas y contribuyen a su bienestar y al de las áreas rurales productivas. Conocer la avifauna y las dinámicas de los bosques, brinda soporte a los planes de conservación y ayuda a los tomadores de decisiones a buscar las mejores alternativas para favorecer el bienestar y la existencia de las especies, así como de todos los servicios ecosistémicos asociados.

DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA



Mostrar la riqueza de aves del municipio de Villamaría fue un reto increíble, pues cada vez que los listados de esta guía crecían, aumentaban también nuestras ganas de poder transmitir todos estos datos a las personas. Fue realmente difícil realizar la selección de las aves que se describen a continuación, ya que no hay una sola que no cumpla un papel fundamental en los ecosistemas que se encuentran en nuestra región.

Con orgullo e ilusión los invitamos a que realicen un viaje espectacular, a través de las fotografías y datos de esta maravillosa guía, y esperamos que nazca y se avive en ustedes, el deseo de observar en vivo todas las aves mencionadas, visitando cada uno de los lugares donde se encuentran.

La descripción de las especies está conformada por varios datos básicos pero orientadores. En primer lugar, se muestra el nombre común en letra mayúscula, basado en el libro de Hilty y Brown (1986, 2001), seguido por el nombre científico, encerrado en paréntesis, el cual está basado en la taxonomía de Clements. Por último, está el nombre en inglés.

Las palabras e iconos adicionales que se encuentran en la descripción son:



Se refiere a la distribución altitudinal de la especie en el territorio de Villamaría.



Se refiere al tamaño de la especie



Se refiere a la distribución en el mundo y encierra las siguientes denominaciones

Residente: significa que el ave se encuentra distribuida naturalmente en una zona de vida que incluye el territorio colombiano.


Endémica: Con distribución exclusiva solo para el territorio colombiano.

Casi Endémica: Entre el 40 y 49% de la población mundial de esta especie se encuentra en el territorio colombiano.

Migratoria Boreal: Especies que provienen desde el norte del continente americano y usan el territorio colombiano como refugio del invierno o de paso a su destino.



Zona alta o de páramo



VEREDAS

Frailes, La Laguna, Termales,
Romeral, Playa Larga, Laguna Alta,
El Paramo, Potosí

LUGAR	ATRACTIVO	DISTANCIA DESDE CABECERA
Villamaría- Nevado del Ruiz sector valle de las tumbas. Vereda Frailes.	Ecosistema de paramo sin glaciar.	2 horas
Nevado Santa Isabel Vereda Potosí	Borde del glaciar de la cara centro del Nevado Santa Isabel a 4700mts SNM	3 horas
laguna verde encantada. Vereda Frailes	La laguna se encuentra ubicada cerca al Nevado del Cisne	4 horas

LUGAR	ATRACTIVO	DISTANCIA DESDE CABECERA
Hotel Termales La Quinta- Vereda Playa larga	Lugar de hospedaje que ofrece la caída de agua más alta del municipio (Cascada Nereidas)	1 hora y 1/2
Termales del Ruiz, Vereda Frailes	Termalismo	2 horas
Termales los pinos la gruta, Vereda Frailes	Termalismo	2 horas y 40 min
Afloramiento de agua sector La Gruta, Vereda Frailes	Termalismo	1/2 hora
Sector la pica, Vereda Paramo	Afloramiento llamado termales la POA	1 hora
Cerca de la Cascada Nereidas, Vereda Playa Larga	Geiser	40 min.



PATO PARAMUNO

(*Anas andium*)

Andean Teal

Características

Pato pequeño. Presente en una amplia variedad de lagos, ríos y pantanos de alta montaña. Por lo general, se encuentra en parejas o en bandadas de la misma especie. Consume principalmente invertebrados acuáticos (anfípodos, crustáceos e insectos), semillas, frutos y algunas partes de plantas acuáticas.



**2000 - 4000
MSNM**



43 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



HELIÁNGELUS BELICOSO

(*Heliangelus exortis*)

Tourmaline Sunangel

Características

Suele colgarse, brevemente, a las flores, con alas abiertas en V, mientras liba. También deja las alas abiertas un momento al posarse. Forrajea a baja altura en áreas abiertas o de matorral.



2000 - 3200
MSNM



9.5 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PICO DE TUNA ARCOÍRIS

(*Chalcostigma herrani*)

Rainbow-Bearded Thornbill

Características

Colibrí de pico corto de los altos Andes. Usualmente se encuentra solitario, colgando de las flores. El macho tiene un parche estrecho y multicolor en la garganta, que puede parecer oscuro, hasta que capta la luz. A menudo, se adhiere a las flores o ramas mientras se alimenta.



2800 - 4100
MSNM



10.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



BARBUDITO PARAMUNO

(*Oxypogon stuebelii*)

Buffy Helmetcrest

Características

Es un colibrí común en páramos, durante los períodos de floración de frailejones. Es una especie de hábitos solitarios. Se alimenta en las flores, de néctar y larvas de insectos. Durante el día es muy activo, revolotea, o se cuelga de las flores, para libar y luego se aleja.



3200 - 4600
MSNM



11 Cm



Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



METALURA COLIRROJO

(*Metallura tyrianthina*)

Tyrian Metaltail

Características

Pequeño colibrí agresivo y territorial. Al libar, suele colgarse de las flores. Suele hallarse alrededor de pequeños arbustos en flor y a orillas de carretera.



2100 - 3500
MSNM



8 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



METALURA VERDE

(*Metallura williami*)

Viridian Metaltail

Características

Pequeño colibrí agresivo y territorial. Al libar, suele colgarse de las flores. Suele hallarse alrededor de pequeños arbustos en flor y a orillas de carretera.



**2800 - 3700
MSNM**



8.8 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PARAMERO RABIHORCADO

(*Eriocnemis derbyi*)

Black-Thighed Puffleg

Características

Revolotea o se cuelga en flores bajas en los márgenes de los matorrales. Agresivo y territorial. Puede dejar las alas abiertas brevemente al posarse. Poco común en bordes de selva húmeda y pastizales.



2600 - 3700
MSNM



9 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PARAMERO ÁUREO

(*Eriocnemis mosquera*)

Golden-Breasted Puffleg

Características

Se encuentra, usualmente solitario, revoloteando o colgando brevemente en flores bajas, en la periferia de arbustos densos, en áreas de matorral. Activo y agresivo, a menudo entra y sale de los arbustos cuando defiende su territorio. Al posarse, como otros del género, mantiene las alas abiertas un momento o las sacude.



2500 - 3600
MSNM



11.7 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



COLIBRÍ PARAMUNO

(*Aglaeactis cupripennis*)

Shining Sunbeam

Características

Colibrí característico del límite de la vegetación arbórea. Fácil de observar, notablemente agresivo y fuertemente territorial. Cuando liba en flores bajas, suele colgarse, brevemente, con alas verticales en V.



2600 - 3700
MSNM



11.4 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



INCA COLLAREJO

(*Coeligena torquata*)

Collared Inca

Características

"Rutero" activo y silencioso. Suele hallarse entre arbustos bajos del sotobosque; revolotea al libar en flores pendulares con corolas largas, especialmente en lianas, plantas trepadoras y arbustos.



2000 - 3400
MSNM



11.4 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



INCA SOLDADO

(*Coeligena lutetiae*)

Buff-Winged Starfrontlet

Características

Colibrí oscuro, atractivo y usualmente solitario. Suele observarse cerca de bordes de selva con matorral, a nivel del ojo o más bajo. Principalmente nectarívoro, revolotea o se cuelga momentáneamente para luchar. Territorial.



**2600 - 3600
MSNM**



11.2 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ALA DE ZAFIRO

(*Pterophanes cyanopterus*)

Great Sapphirewing

Características

Forrajea principalmente en flores de altura baja a moderada, bien sea revoloteando, colgándose o posándose para libar. Solitario y territorial pero se une a bandadas mixtas.



2800 - 3800
MSNM



16 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PELLAR DE PÁRAMO

(*Vanellus resplendens*)

Andean Lapwing

Características

Puede ser observada solitaria, en pareja o en grupos laxos. Es un ave bastante territorial, forma pareja estable y defiende su territorio con vuelos rasantes y fuertes vocalizaciones, ante la presencia de intrusos. Generalmente se le encuentra cerca de lagos o ríos y en terrenos parcialmente inundados.



**2800 - 3800
MSNM**



34 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CÓNDOR DE LOS ANDES

(*Vultur gryphus*)

Andean Condor

Características

Pueden encontrarse individuos, parejas o tríos, remontándose majestuosamente; a veces siguiendo paredes de cañones o elevándose a grandes alturas. Duermen en escarpes y suelen realizar vuelos a media mañana.



**300 - 5000
MSNM**



120 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ÁGUILA PARAMUNA

(*Geranoaetus melanoleucus*)

Black-Chested Buzzard-Eagle

Características

Casi siempre se ve remontando a gran altura sobre terreno accidentado, frecuentemente en pareja. Posee un vuelo de remonte elegante y en círculos. Se posa en rocas o en el suelo. Se alimenta de variedad de presas.



1600 - 3500
MSNM



60 - 75 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CARPINTERO PARAMUNO

(*Dryobates nigriceps*)

Bar-Bellied Woodpecker

Características

Muy similar a otros del género. Picotea en cortezas y explora musgos, principalmente en ramas, a nivel bajo del dosel. Regularmente se ve en bandadas mixtas pero también se encuentra solitario.



**2200 - 3500
MSNM**



16.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PERIQUITO DE LOS NEVADOS

(*Bolborhynchus ferrugineifrons*)

Rufous-Fronted Parakeet

Características

Como muy pocos loros, se alimenta en el suelo donde obtiene semillas de pasto y de frutos; forma bandadas y es una especie muy rara, de la cual se desconocen muchos aspectos de su biología. Habita en bosques húmedos y semihúmedos de montaña; también habita en áreas cultivadas.



**3000 - 3800
MSNM**



18.5 Cm



Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



LORITO DE FUERTES

(*Hapalopsittaca fuertesi*)

Fuertes's Parrot

Características

Es una especie muy rara y difícil de observar, que habita en bosques alto-andinos y subpáramos frecuentemente nublados. Se caracteriza, principalmente, por el azul de la coronilla y se encuentra en grupos de 6 a 25 individuos; por lo general prefiere alimentarse de semillas.



**3000 - 3500
MSNM**



23.5 Cm



Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PERICO PARAMUNO

(*Leptosittaca branickii*)

Golden-Plumed Parakeet

Características

Es muy común verlo en bandadas pequeñas y parloteantes. Forrajea en el dosel del bosque y realiza movimientos estacionales, como respuesta a cambios en la disponibilidad de alimento. Normalmente habita en bosques húmedos de montaña, bosques secundarios en estados avanzados de la sucesión, bosques enanos y matorrales, en el límite de la vegetación arbórea.



1800 - 3500
MSNM



35 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TOROROI ONDULADO

(*Grallaria squamigera*)

Undulated Antpitta

Características

Terrestre. Salta de marañas densas a claros, pastos y áreas con alguna sombra, para buscar alimento. Usualmente solitario y más bien escondidizo; vuela bajo y directo.



**2200 - 3500
MSNM**



21.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TOROROI LEONADO

(*Grallaria quitensis*)

Tawny Antpitta

Características

Habita en bosque enano y páramos con arbustos y frailejones o en matorrales densos. Se alimenta principalmente de insectos como escarabajos y larvas. Corre rápidamente o salta por el suelo y se refugia en matorrales o pastos pero, a diferencia de otras especies similares, a menudo es confiado y fácil de ver.



**2800 - 3800
MSNM**



17 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TOROROI MEDIALUNA

(*Grallaricula lineifrons*)

Crescent-Faced Antpitta

Características

Suele encontrarse usualmente solitario o en pareja, corriendo, caminando o rebotando a saltos por el suelo del bosque o en troncos. Se alimenta de insectos como chapulines y escarabajos, también de arañas y, en general, busca sus presas a lo largo de troncos y ramas sobre el suelo.



**2800 - 3600
MSNM**



11.5 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CÍNCOLODES CAVADOR

(*Cinclodes excelsior*)

Stout-Billed Cinclodes

Características

Terrestre; suele hallarse solitario o en pareja. Corre rápidamente por el suelo, con el cuerpo bajo, se detiene abruptamente y cabecea, a menudo levantando la cola y a veces las alas. Picotea en el barro y excava en el suelo blando.




3200 - 4500
MSNM



20.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CORRETRONCOS PERLADO

(*Margarornis squamiger*)

Pearled Treerunner

Características

Permanece solo, en pareja, en grupos familiares de hasta ocho individuos y, comúnmente, también en bandadas mixtas. Forrajea desde el nivel medio de la vegetación hasta el dosel, en donde trepa por troncos y ramas cubiertas de musgo, efectuando maniobras acrobáticas o colgando cabeza abajo para buscar en la superficie inferior de las ramas.



1800 - 3500
MSNM



15.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



COLUDITO FRAILEJONERO

(*Leptasthenura andicola*)

Andean Tit-Spinetail

Características

Más bien furtivo, a menudo escapa volando bajo por corta distancia y se deja caer repentinamente. A veces se observa en bandadas mixtas.



3000 - 4000
MSNM



16.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



RASTROJERO CEJIBLANCO

(*Hellmayrea gularis*)

White-Browed Spinetail

Características

Similar a un cucarachero cuando se mueve discretamente en marañas bajas y rebusca en ramitas y bambú o picotea en musgo. Usualmente solitario y ocasionalmente se observa en bandadas mixtas.



2300 - 3500
MSNM



12 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CANASTERO FLAMULADO

(*Asthenes flammulata*)

Many-Striped aCanastero

Características

Habita en el límite de la vegetación arbórea y en el páramo, en pendientes rocosas con cobertura de pastos y arbustos. Su dieta está compuesta principalmente por artrópodos. Permanece solo o en pareja. Captura presas mediante espigado en el suelo y en la vegetación baja.



**2800 - 4000
MSNM**



16.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CHAMICERO ANDINO

(*Asthenes fuliginosa*)

White-Chinned Thistletail

Características

Permanece solo, en pareja y, rara vez, en bandadas mixtas. Captura sus presas mediante espigado en el follaje y en ramas pequeñas del sotobosque, efectuando maniobras acrobáticas. Cuando se alarma, mantiene la cola erguida. Habita en la zona de transición, desde el bosque enano hasta el páramo.



2600 - 3500
MSNM



19 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TIRANUELO CAPINEGRO

(*Phyllomyias nigrocapillus*)

Black-Capped Tyrannulet

Características

Activo, se comporta como una reinita al moverse y buscar en el follaje desde nivel medio-bajo hasta el dosel; Puede encontrarse solitario, en pareja o en bandadas mixtas. A veces mantiene la cola ligeramente levantada.



1500 - 3400
MSNM



11.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TIRANUELO GORGIBLANCO

(*Mecocerculus leucophrys*)

White-Throated Tyrannulet

Características

Es una de las aves características de los montes de zonas templadas. Se observa en grupos de 3 a 5 individuos o en bandadas mixtas que se mueven activamente por arbustos y árboles.



2600 - 3600
MSNM



13 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PITAJO CORONADO

(*Ochthoeca frontalis*)

Crowned Chat-Tyrant

Características

Presente en bosque achaparrado, bordes de bosque denso y matorrales. Es una especie silenciosa. Se alimenta de insectos; perchá, por lo general, en maleza cercana al suelo. Salta en las ramas y el follaje, atrapando insectos voladores y también puede alimentarse en troncos y musgos.



**2300 - 3400
MSNM**



12.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PITAJO PECHIRRUFO

(*Ochthoeca rufipectoralis*)

Rufous-Breasted Chat-Tyrant

Características

Poco visible: Suele verse en pareja, solitario o en bandadas mixtas, desde nivel medio-alto hasta dosel; vuela corto al aire dentro del dosel o captura en el follaje.




2500 - 3200
MSNM



14 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PITAJO AHUMADO

(*Ochthoeca fumicolor*)

Brown-Backed Chat-Tyrant

Características

Presente en una amplia variedad de áreas abiertas, como pastizales con bordes de arbustos. Se alimenta de insectos, usa perchas en ramas gruesas cerca del tronco principal o se posa sobre el tronco principal. Realiza vuelos cortos, a veces retornando a la misma percha o a veces cambiando a perchas un poco alejadas; captura sus presas en el aire o en el follaje.



**2500 - 3800
MSNM**



15 Cm



Residente



**1300
Msnm Aprox.**

**5000
Msnm Aprox.**



FRUTERO BARRADO

(*Pipreola arcuata*)

Barred Fruiteater

Características

Es un ave confiada, generalmente solitaria o en pareja y forrajea en el nivel medio o bajo del bosque. Su dieta es principalmente a base de frutos. Habita en bosque tropical húmedo y muy húmedo, generalmente en el interior de bosque.



2000 - 3400
MSNM



22.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



COTINGA CRESTADA

(*Ampelion rubrocristatus*)

Red-Crested Cotinga

Características

Generalmente solitaria, posada en las perchas más altas en árboles o en arbustos grandes. Usualmente se alimenta de frutas mientras está posada; ocasionalmente vuela al aire por insectos. Relativamente común en selva húmeda.



2400 - 3800
MSNM



21.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CUCARACHERO PARAMUNO

(*Cistothorus platensis*)

Sedge Wren

Características

Presente en áreas pantanosas o abiertas con pastos. Consume arañas y gran variedad de insectos como hormigas, polillas y orugas. Suele verse en pareja y en bandadas mixtas durante la migración.



**2400 - 3800
MSNM**



10.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



GORRIÓN AFELPADO

(*Catamblyrhynchus diadema*)

Plushcap

Características

Usualmente se encuentra en pares o grupos pequeños, casi siempre siguiendo una bandada de especies mixtas. Es especialista en bambúes, salta por sus tallos o cuelga cabeza abajo y busca en el follaje y los tallos.



2000 - 3500
MSNM



14 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



GORRIÓN PARAMUNO

(*Phrygilus unicolor*)

Plumbeous Sierra-Finch

Características

Suele observarse en parejas dispersas o en bandadas laxas; camina por el suelo; se levanta a corta distancia del observador y vuela para buscar refugio nuevamente o, con menos frecuencia, se posa expuesto en arbustos bajos o rocas. No es arisco.



3000 - 4200
MSNM



14.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



SEMILLERO ANDINO

(*Catamenia inornata*)

Plain-Coloured Seedeater

Características

El semillero más común en alta montaña. Se encuentra en parejas separadas durante la reproducción pero el resto del tiempo usualmente se encuentra en grupos monoespecíficos, de tamaño variable. Come en el suelo, en pastizales cortos y abiertos.



2200 - 3600
MSNM



14 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



SEMILLERO PARAMUNO

(*Catamenia homochroa*)

Paramo Seedeater

Características

Usualmente come a baja altura en matorrales densos o saltando por el suelo cerca de arbustos; Suele verse solitario, en pareja o en pequeñas bandadas y a menudo con bandadas mixtas de tángaras, diglosas y atlapetes.



**2200 - 3500
MSNM**



13.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



DIGLOSA LUSTROSA

(*Diglossa lufresnayii*)

Glossy Flowerpiercer

Características

A veces canta desde la parte alta de un arbusto pero en general es una especie furtiva; se mueve rápidamente por vegetación densa. Se mantiene a baja altura cuando sigue bandadas mixtas. Perfora corolas o come insectos.



2500 - 3800
MSNM



14.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



DIGLOSA NEGRO

(*Diglossa humeralis*)

Black Flowerpiercer

Características

Picaflor bastante pequeño, encontrado en los Andes. Completamente negro. Suele hallarse en matorrales secos, en elevaciones altas. Suele verse solo o en pareja y forrajea en niveles bajos a medios.



2300 - 3800
MSNM



13 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



DIGLOSA DE ANTIFAZ

(*Diglossa cyanea*)

Maked Flowerpiercer

Características

Suele hallarse solitaria o en bandadas mixtas. Menos activa y más frugívora que otras diglosas más pequeñas: usualmente en dosel, aunque ocasionalmente a baja altura. Medianamente común en selva húmeda y bordes.



1500 - 3500
MSNM



15 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



HEMISPINGUS CEJIBLANCO

(*Thlypopsis superciliaris*)

Superciliaried Hemispingus

Características

Usualmente se encuentra en bandadas mixtas. Salta activamente y busca en el follaje y, con menor frecuencia, en el dosel.



2400 - 3400
MSNM



14 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



MONTERO PARAMUNO

(*Urothraupis stolzmanni*)

Black-Backed Bush-Tanager

Características

Colecta insectos desde la percha o se estiran para buscar encima y debajo de las hojas. Suele encontrarse solitario o en bandadas mixtas y puede ser difícil de ver debido a su hábito de mantenerse a baja altura en arbustos densos.



3000 - 3800
MSNM



15 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CLARINERO LACRIMOSO

(*Anisognathus lacrymosus*)

Lachrymose Mountain-Tanager

Características

Se observa en pareja o en bandadas mixtas. Salta y busca cuidadosamente en el follaje, come frutas y ocasionalmente vuela, torpemente, al aire en búsqueda de insectos.



2000 - 3600
MSNM



16.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CLARINERO ESCARLATA

(*Anisognathus igniventris*)

Scarlet-Bellied Mountain-Tanager

Características

Suele hallarse en parejas o en grupos pequeños, ocasionalmente de 15 o más individuos. Se desliza silencioso a lo largo de setos densos, mediante vuelos cortos y ondulantes.



2400 - 3600
MSNM



16 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ATLAPETES CABECIBLANCO

(*Atlapetes pallidinucha*)

Pale-Naped Brush-Finch

Características

Suele observarse en pareja o en familia, saltando cerca del suelo o buscando en el follaje y comiendo frutas; principalmente se ve a menos de 3 metros. Regularmente se encuentra en bandadas mixtas y es fácil de ver pues es curioso.



2500 - 3600
MSNM



18 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ARAÑERO CABECINEGRO

(*Myiothlypis nigrocristata*)

Black-Crested Warbler

Características

Activo pero difícil de ver, usualmente en matorrales más densos de bambú; Generalmente se observan 1 o 2 individuos, en bandadas mixtas.



2400 - 3500
MSNM



13.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ABANICO CARIBLANCO

(*Myioborus ornatus*)

Golden-Fronted Whitestart

Características

Se observa con frecuencia en pequeñas bandadas de su propia especie o como núcleo de bandadas mixtas. Revolotea y vuela corto activamente. Suele ser tranquilo.



2000 - 3600
MSNM



13 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



JILGUERO ENCAPUCHADO

(*Spinus magellanicus*)

Hooded Siskin

Características

Suele observarse en pareja o en pequeñas bandadas. Come desde el suelo hasta las copas de los árboles; Tiene un vuelo ondulado como otros del género.



2200 - 3400
MSNM



11 Cm




Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.

Zona Media Hortícola



VEREDAS

La Floresta, Tejares, Alto Arroyo,
Alto Castillo, La Florida, Gallinazo,
El Pindo, Montaño, La Paz, Papayal,
La Guayana, Santo Domingo, Valles

LUGAR	ATRACTIVO	DISTANCIA DESDE CABECERA
Hostal la laguna-Vereda Papayal	Cabalgata, restaurante, zona de camping, alojamiento en cabaña, recorrido a la Cascada Molinos con una caída de agua de más de 80mts de altura.	1 hora
Nido del Cónedor Vereda Papayal	Avistamiento de aves, posibilidad de ver la pareja de cónedores. Acceso por senderos y cable aéreo a una altura de más de 300mts sobre el cañón del Rio Molinos.	40 min.
Glamping El Color de mis Revés Vereda Montaño	Sendero ecológico, hospedaje, avistamiento de aves	40 min.

Zona Media Hortícola

LUGAR	ATRACTIVO	DISTANCIA DESDE CABECERA
Vereda Papayal	Zona gastronómica, oferta de platos típicos de la región y un mirador llamado Barro Azul	1 hora
Vereda Santo Domingo	Observación de cultivos hortícolas, ruta del ser, en el que se encuentran afloramientos de agua termal, actividades de meditación y medicinas ancestrales, pasadía o noche	1 hora
Vereda la Telaraña, sector la Zulia	Cascadas el Caimán, caminatas de 6 horas pasando por caídas de agua de más de 50mts y encontrando diversidad de fauna y flora, sitio para realizar también avistamiento	1 hora
Vereda Valles, finca las Palmas	Zona de camping, restaurante, cuenta con cabalgata, avistamiento de aves, animales de granja, diferentes especies de fauna: aves, mono aullador, mono nocturno, pasadía	1 hora
Vereda el Pindo, sector el parnaso, finca la merced	Cuenta con pesca deportiva, senderos ecológicos, hospedaje. Pasadía y noche	40 min
Vereda el Castillo	Vuelos en parapente con aterrizaje en la vereda llanitos	30 min
Vereda el Pindo	Cabañas en el Bosque de Niebla, zona de camping, senderos ecológicos, entrada a la reserva la Carpeta y la Carpetica	40 min
Mirador la Inesita, Vereda Tejares	Servicio de restaurante, visualización del paisaje	20 min
La Montaña del Oso, Vereda Tejares	Cuenta con cabañas, sendero ecológico, lago de pesca, zona de camping y restaurante.	20 min
Ecolodge Glamping Tejares	Hospedaje y sendero ecológico	15 min.
Ecoparque Tejares. Vereda Tejares	Hospedaje en cabañas, restaurante, avistamiento de aves, senderos ecológicos, piscina	15 min.
Mirador Alto del Roble, Vereda Tejares	Posibilidad de realizar senderismo, avistamiento de aves y con vista del 80% de Villamaría y el 50% de Manizales.	40 min



PATO DE TORRENTE

(*Merganetta armata*)

Torrent Duck

Características

Son patos territoriales que se encuentran normalmente en parejas o en pequeños grupos familiares. Por lo general, descansan en piedras en medio de arroyos y bucean con destreza en aguas rápidas y turbulentas, sumergiéndose por períodos cortos para encontrar alimento en el fondo del río.



1000 - 3500
MSNM



40 - 46 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PAVA ANDINA

(*Penelope montagnii*)

Andean Guan

Características

Habitan en bosques secundarios y en bordes de bosques de niebla; allí se encuentran en grupos pequeños de 3 a 7 individuos; son de hábitos arborícolas y de comportamiento arisco y asustadizo. Su dieta se compone, principalmente, de frutas y elaboran el nido en los árboles.



**2000 - 3700
MSNM**



50 - 60 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PALOMA - PERDIZ BIGOTUDA

(*Zentrygon frenata*)

White-Throated Quail-Dove

Características

Semiterrestre. Se alimenta en el suelo; suele posarse en ramas bajas, donde mueve la cola nerviosamente hacia abajo y la abre, luego se deja caer al suelo y se aleja caminando silenciosamente. Habita en bosques montañosos húmedos y en bosques secundarios.



900 - 3000
MSNM



32 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



BIENPARADO COMÚN

(*Nyctibius griseus*)

Common Potoo

Características

Durante el día, suele posar inmóvil en las ramas altas de los árboles pero, a veces, también puede observarse a baja altura o posado en postes de cerca. Es activo durante la noche, especialmente justo después del atardecer, cuando se posa expuesto en perchas prominentes desde las cuales hace vuelos frecuentes para capturar grandes insectos voladores.



< 2600
MSNM



38 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PICO DE LANZA FRENTIVERDE

(*Doryfera ludovicae*)

Green-Fronted Lancebill

Características

Suele alimentarse en grupos de flores pendulares de corolas largas, frente a las cuales revolotea sin colgarse; a menudo caza insectos en pequeños claros. Vuela rápido y directo.



700 - 3000
MSNM



10 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PICO DE CUÑA

(*Schistes albogularis*)

Choco Daggerbill

Características

Solitario, habita usualmente en sotobosque denso y cañadas sombrías. Forrajea principalmente en flores tubulares, revoloteando y a veces colgándose; Suele ser un ruttero de flores dispersas.



800 - 2600
MSNM



8.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CHILLÓN VERDE

(*Colibri cyanotus*)

Lesser Violetear

Características

Ampliamente distribuido en las montañas, desde sotobosque hasta dosel. A menudo se reúne con otras especies en árboles florecidos. Canta solitario o en pequeños leks dispersos.



600 - 3200
MSNM



9.3 Cm




Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CHILLÓN COMÚN

(*Colibri coruscans*)

Sparkling Violetear

Características

Colibrí característico de tierras altas semiabiertas. Altamente territorial y vocal. Se despliega, vuela verticalmente unos pocos metros, canta, cierra las alas, abre la cola y regresa en picada a la percha.



1200 - 3600
MSNM



13 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



COLIBRÍ PECHIPUNTEADO

(*Adelomyia melanogenys*)

Speckled Hummingbird

Características

Usualmente se observa solitario. Revolotea al libar, a menudo colgado o perchado. Es uno de los colibríes más comunes a elevación media y se encuentra en selvas húmedas y bordes de montaña.



1000 - 3000
MSNM



8.8 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



SILFO COLIVERDE

(*Aglaiaocercus kingii*)

Long-Tailed Sylph

Características

Prefiere bordes de selva y áreas más abiertas. Forrajea a cualquier altura, rutero o territorial. Revolotea y, ocasionalmente, se cuelga para libar; caza insectos al aire, desde perchas expuestas.



1600 - 3000
MSNM



18 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



HELECHERO COMÚN

(*Haplophaedia aureliae*)

Greenish Puffleg

Características

Se encuentra, usualmente solitario, entre pequeños grupos de flores o cazando insectos en follaje a baja altura. Rara vez, se le ve en follaje más alto o al interior de la selva. Se cuelga para libar y, generalmente, no mantiene las alas abiertas al posarse.



1500 - 2500
MSNM



9 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



INCA BRONCÍNEO

(*Coeligena coeligena*)

Bronzy Inca

Características

"Rutea" principalmente en flores de estrato medio o bajo, al interior de la selva y más frecuentemente en sus bordes. Prefiere flores rojas, largas y tubulares. Común en selvas húmedas y muy húmedas de montaña.



1400 - 2600
MSNM



10.7 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



COLIBRÍ TERCIOPELO

(*Lafresnaya lafresnayi*)

Mountain Velvetbreast

Características

Forrajea a baja altura en flores con largas corolas tubulares, adecuadas para su pico decurvado. Su coronilla se encuentra, a menudo, cubierta de polen.



2000 - 3500
MSNM



10 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PICO DE SABLE

(*Ensifera ensifera*)

Sword-Billed Hummingbird

Características

Se encuentra, usualmente solitario, en estratos medio a alto. Se posa con el pico dirigido hacia arriba. Revolotea al libar, manteniendo el pico verticalmente hacia arriba. Ocasionalmente atrapa insectos en el aire.



2400 - 3500
MSNM



13.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



COLIBRÍ CHUPASAVIA

(*Boissonneaua flavescens*)

Buff-Tailed Coronet

Características

Es territorial y suele encontrarse en flores de nivel medio a alto; también captura insectos al aire, en largos vuelos, desde perchas altas. Como lo hacen otros del género, al posarse, mantiene las alas abiertas momentáneamente.



1400 - 3000
MSNM



10.7 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



COLA DE RAQUETA

(*Ocreatus underwoodii*)

Booted Racket-Tail

Características

Al libar, revolotea y ocasionalmente cuelga de las flores. Tiene un vuelo ondulado, como de abeja. Suele encontrarse desde estrato alto hasta dosel. Puede hallarse solitario en niveles bajos al interior del bosque o en grupo con otros colibríes, en árboles florecidos del dosel.



1000 - 2700
MSNM



12 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



HELIODOXA LEONADO

(*Heliodoxa rubinoides*)

Fawn-Breasted Brilliant

Características

Se encuentra, usualmente solitario, en estrato bajo o medio al interior de la selva y ocasionalmente a lo largo de bordes sombríos. No se congrega en grupos de árboles con flor. Es poco común pero suele hallarse en selva húmeda y muy húmeda.



1400 - 2600
MSNM



10.6 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ZUMBADOR VENTRIBLANCO

(*Chaetocercus mulsant*)

White-Bellied Woodstar

Características

Usualmente solitario, revolotea en arbustos y árboles en flor, altos y bajos. Puede congregarse en árboles en flor. A menudo se posa alto, en percha expuesta.



1500 - 3300
MSNM



7 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ZUMBADOR PECHIBLANCO

(*Philodice mitchellii*)

Purple-Throated Woodstar

Características

Puede verse a cualquier altura, a menudo perchado alto o libando a menor nivel, en arbustos en flor. Solitario o puede congregarse con otros individuos.



700 - 2000
MSNM



7.3 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



AMAZILIA ANDINO

(*Amazilia franciae*)

Andean Emerald

Características

Usualmente solitario, rutero en flores dispersas a alturas variables; ocasionalmente se congrega en árboles en flor; también caza insectos al aire, en vuelos cortos, cerca del follaje. Los machos cantan, desde perchas expuestas, a 7-10 metros de altura.



1000 - 2100
MSNM



9 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CARACOLERO SELVATIVO

(*Chondrohierax uncinatus*)

Hook-Billed Kite

Características

Sedentario y perezoso. Generalmente se le observa posado en el follaje del dosel. Remonta ocasionalmente con aleteos pero rara vez lo hace durante mucho rato o a gran altura. Caza principalmente caracoles de tierra y árboreos; eventualmente puede alimentarse de ranas, insectos y orugas.




< 3000
MSNM



40 - 50 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ÁGUILA MIGRATORIA

(*Buteo platypterus*)

Broad-Winged Hawk

Características

En Colombia se observa en bordes de bosque, bosques en sucesión secundaria y rastrojos. Los individuos de esta especie vuelan en círculos, siguiendo corrientes de aire, por lo que los patrones de migración están altamente relacionados con la velocidad y la dirección del viento.



< 3500
MSNM



38 - 42 Cm



Migratoria Boreal



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



BUHÍTO ANDINO

(*Glaucidium jardinii*)

Andean Pygmy-Owl

Características

Activo de día o de noche. Permanece en dosel o niveles medios. Se encuentra en algunas localidades dispersas en selvas húmedas de montaña. A menudo pasa desapercibido.



2000 - 3500
MSNM



15 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TROGÓN ENMASCARADO

(*Trogon personatus*)

Maked Trogon

Características

Generalmente se le observa solo o en pareja, silencioso y en posición vertical. Captura artrópodos o frutos en el follaje mediante vuelos sostenidos para, posteriormente, comerlos perchado en una rama. Habita principalmente en bosques húmedos y muy húmedos de montaña, en áreas abiertas y en bosques en crecimiento secundario.



1300 - 3000
MSNM



25 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



BARRANQUERO ANDINO

(*Momotus aequatorialis*)

Andean Motmot

Características

Generalmente permanece solitario o en pareja, en el nivel medio o bajo de la vegetación. Se percha silenciosamente y, en momentos de alarma, se queda quieto y mueve su cola como un péndulo. Captura sus presas al vuelo y en ocasiones también en el suelo.



1300 - 3000
MSNM



48 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TORITO CABECIRROJO

(*Eubucco bourcierii*)

Red-Headed Barbet

Características

Se mueve activamente entre ramas y follaje a altura variable; a menudo se cuelga cabeza abajo para explorar hojas enrolladas y desplazan a otras aves de los árboles con fruta.



900 - 2500
MSNM



15.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TUCANCITO ESMERALDA

(*Aulacorhynchus albivitta*)

Emerald Toucanet

Características

Suele encontrarse en pareja o grupos pequeños, desde los niveles más bajos hasta el dosel. Activo, ruidoso y a veces curioso. A menudo se mueve por los estratos más altos en fila india. Omnívoro, a menudo roba nidos de otras aves.



1500 - 3300
MSNM



31 - 37 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TERLAQUE ANDINO

(*Andigena hypoglaucum*)

Grey-Breasted Mountain-Toucan

Características

Esta especie habita en bosques húmedos y muy húmedos andinos. Su dieta es a base de frutos y ocasionalmente también consume vertebrados pequeños. Puede permanecer solo pero es más frecuente hallarlo en pareja o en grupos de hasta 6 individuos; en ocasiones se une a bandadas mixtas. Es un ave poco conspicua y bastante silenciosa.



2000 - 3500
MSNM



46 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TERLAQUE PECHIAZUL

(*Andigena nigrirostris*)

Black-Billed Mountain-Toucan

Características

Suele encontrarse en pareja y, ocasionalmente, en pequeños grupos, en niveles altos de los árboles. Fácil de observar. Relativamente común en selva húmeda y bordes.



1200 - 3000
MSNM



48 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CARPINTERO AHUMADO

(*Dryobates fumigatus*)

Smoky-Brown Woodpecker

Características

Permanece principalmente en pareja pero, en ocasiones, también puede ser observado solitario, en grupos familiares o en bandadas mixtas. Su técnica de forrajeo más utilizada es el picoteo y el martilleo de ramas gruesas y delgadas. Se alimenta principalmente de escarabajos adultos y en estadios larvales y, ocasionalmente, de frutos.



800 - 2800
MSNM



17 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CARPINTERO CARIBLANCO

(*Colaptes rubiginosus*)

Golden-Olive Woodpecker

Características

Se encuentra usualmente solitario o en pareja, desde nivel medio hasta dosel. Forrajea principalmente perforando ramas y enredaderas, trepando troncos y explorando en ramas con musgo.



900 - 3000
MSNM



23 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CARPINTERO CARMESÍ

(*Colaptes rivolii*)

Crimson-Mantled Woodpecker

Características

Se encuentra usualmente solitario o en pareja y a menudo también en bandadas mixtas. Busca en agujeros, picotea y explora el follaje, usualmente sin perforar. Se alimenta en casi todos los niveles, en superficies cargadas de musgo.



1500 - 3500
MSNM



26 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



COTORRA MONTAÑERA

(*Hapalopsittaca amazonina*)

Rusty-Faced Parrot

Características

Se encuentra en pareja o en grupos pequeños de hasta 5 individuos. En vuelo, comparada con otras especies de la familia, parece más pequeña, con cola proporcionalmente más larga y aletazos más someros. Es un poco rara y local.



1500 - 3500
MSNM



23 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



LORA ANDINA

(*Amazona mercenarius*)

Scaly-Naped Parrot

Características

Se observa en pareja o en múltiples de 2, en grupos de hasta 30 o 40 individuos. Es arisca. Suele verse en selvas húmedas de montaña y, en vuelo, sobre terreno parcialmente deforestado.



1200 - 3500
MSNM



34 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



HORMIGUERITO TIZNADO

(*Dysithamnus mentalis*)

Plain Antvireo

Características

Suele encontrarse en pareja o en pequeños grupos, también solos o asociados a bandadas mixtas de otros hormigueritos y reinitas, en estrato bajo o medio - bajo. Se mueve lentamente, saltando a lo largo de pequeñas ramas.



400 - 2300
MSNM



12 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



HORMIGUERITO RABILARGO

(*Drymophila striaticeps*)

Streak-Headed Antbird

Características

Este impresionante hormiguero de cola larga es aficionado a los matorrales de bambú, dentro o en el borde del bosque montañoso. Suele hallarse en pareja o en pequeños grupos y, con menor frecuencia, solitario. Canta frecuentemente y no es arisco pero puede ser difícil de ver.



1700 - 3000
MSNM



15 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TOROROI COMPRAPÁN

(*Grallaria ruficapilla*)

Chestnut-Crowned Antpitta

Características

Esta ave es principalmente terrestre, salta por el suelo o corre rápidamente. Usualmente mantiene escondido en el sotobosque enmarañado pero puede salir a pequeños claros y orillas de carretera, temprano en la mañana o al atardecer. Escarba e introduce el pico en el lodo suave, en busca de lombrices, insectos grandes, otros invertebrados y ranitas.



1200 - 3200
MSNM



19 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TOROROI RUFOCENIZO

(*Grallaria rufocinerea*)

Bicoloured Antpitta

Características

Habita en bosques montañosos húmedos maduros y, con menor frecuencia, en bosques en sucesión secundaria y bordes de bosque. Su dieta la componen insectos y otros artrópodos. Forrajea sola o en pareja y se mueve por el suelo del bosque, entre vegetación densa.



2000 - 3200
MSNM



16 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TOROROI CHUSQUERO

(*Grallaria nuchalis*)

Chestnut -Naped Antpitta

Características

Difícil de ver. Usualmente canta a intervalos durante el día, desde percha baja y oculta. Suele hallarse en suelo y sotobosque de selva húmeda, especialmente chusquea.



2000 - 3000
MSNM



20 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TOROROI ENANO

(*Grallaricula nana*)

Slate-Crowned Antpitta

Características

Como otros del género Grallaricula, salta por perchas en arbustos de sotobosque abierto, desde cerca del suelo hasta el nivel del ojo. Picotea en follaje desde percha o baja, momentáneamente, al suelo. Difícil de ver.



1700 - 3200
MSNM



11 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TREPADOR GIGANTE

(*Xiphocolaptes promeropirhynchus*)

Strong-Billed Woodcreeper

Características

Es un ave bastante cautelosa, de movimientos poco energéticos. Con frecuencia se le observa perforando troncos muertos con su pico, en búsqueda de presas. Su dieta se basa principalmente en el consumo de artrópodos y cantidades menores de pequeños vertebrados. Habita en selvas húmedas y muy húmedas de montaña y tierras bajas.



< 3300
MSNM



34 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



XENOPS ESTRIADO

(*Xenops rutilans*)

Streaked Xenops

Características

Rebusca en ramitas delgadas sin follaje, usualmente colgado o moviéndose de lado. Se observa en pareja o tríos y en ocasiones en bandadas mixtas.



1500 - 3000
MSNM



12 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



RASTROJERO DE AZARA

(*Synallaxis azarae*)

Azara's Spinetail

Características

Furtivo: se esconde por matorrales enmarañados y se oye con más frecuencia de lo que se ve. Trepa y salta activamente por la vegetación densa. Se encuentra usualmente en pareja.



1300 - 3200
MSNM



16 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TIRANUELO COLIBLANCO

(*Mecocerculus poecilocercus*)

White-Tailed Tyrannulet

Características

Activo, parecido a una reinita por su postura horizontal. Rebusca desde la perchta o vuela corto al follaje, en dosel o subdosel. Se observa solitario, en pareja y, con frecuencia, en bandadas mixtas.



1800 - 3000
MSNM



11 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CACHUDITO RABILARGO

(*Uromyias agilis*)

Agile Tit-Tyrant

Características

Suele verse en parejas o en grupos de 3-5 individuos de bandadas mixtas. Rebusca rápidamente en el follaje. Rara vez hace vuelos cortos de captura. Es muy tranquilo.



2500 - 3500
MSNM



12.5 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TIRANUELO CORONADO

(*Pseudotriccus ruficeps*)

Rufous-Headed Pygmy-Tyrant

Características

Poco visible y furtivo. Suele verse solitario o en pareja. Vuela corto hacia el follaje desde el interior del sotobosque denso y, ocasionalmente, salta por el suelo.



2200 - 3300
MSNM



11 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



MIONECTES ESTRIADO

(*Mionectes striaticollis*)

Streak-Necked Fruit-Tyrant

Características

Ave pequeña, bastante común en las estribaciones andinas. Típicamente se encuentra en niveles bajos a medios de bosques nublados o bordes. A menudo se encuentra en bandadas de especies mixtas.



1300 - 2700
MSNM



13.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TIRANUELO CAPIRRUFO

(*Poecilotriccus ruficeps*)

Rufous-Crowned Tody-Flycatcher

Características

Suele encontrarse solitario o en pareja y, ocasionalmente, en grupos de varios individuos; se posa o salta en matorrales y vuela corto y rápido. A menudo oculto y difícil de ver.



1500 - 2600
MSNM



9.5 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PITAJO DIADEMA

(*Ochthoeca diadema*)

Yellow-Bellied Chat-Tyrant

Características

Es el único atrapamoscas pequeño que posee una línea superciliar de color amarillo. Presente en bosque muy húmedo, bosque de niebla, interior de bosque montano denso y enmalezado y, menos frecuentemente, en bordes de bosque cerca de arroyos. Se alimenta de insectos, principalmente escarabajos pequeños.



1800 - 3000
MSNM



12.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PITAJO TORRENTERO

(*Ochthoeca cinnamomeiventris*)

Slaty-Backed Chat-Tyrant

Características

Es relativamente común en o cerca de pequeños claros de selva, bordes, matorrales densos o pendientes enmalezadas, y siempre cerca de arroyos rápidos de montañas. Se alimenta de insectos pero la composición de su dieta es poco conocida. Permanece solitario o en parejas separadas.



1600 - 3200
MSNM



12.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ATRAPAMOSCAS LAGARTERO

(*Myiodynastes chrysocephalus*)

Golden-Crowned Flycatcher

Características

Suele verse solitario o en pareja. A menudo cabecea mientras se posa erecto pero ligeramente encorvado. Se encuentra usualmente alto y expuesto en ramas desnudas, cerca del follaje. Revolotea y atrapa insectos en las copas de los árboles.



1000 - 3000
MSNM



20.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ATRAPAMOSCAS SULFURADO

(*Myiodynastes luteiventris*)

Sulphur-Bellied Flycatcher

Características

Pasa mucho tiempo en niveles medios o altos de los árboles pero a veces se observa a nivel más bajo. Suele verse solitario o en pareja y generalmente no se deja ver, excepto cuando llama. Captura insectos grandes en vuelos cortos hacia follaje o ramas.



< 2600
MSNM



20.5 Cm



Migratoria Boreal



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ATRAPAMOSCAS MONTANERO

(*Myiarchus cephalotes*)

Pale-Edged Flycatcher

Características

Se posa a baja altura, a menudo expuesto. Poco común en bordes de selva húmeda, claros con arbustos y árboles dispersos y cerca de parches de monte claro.



1500 - 2700
MSNM



18.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



FRUTERO VERDINEGRO

(*Pipreola riefferii*)

Green-And-Black Fruiteater

Características

Suele verse en parejas o en grupos familiares laxos, de 3-6 individuos. Se posa en silencio o moviéndose perezosamente, desde el sotobosque hasta niveles medios; a veces sigue bandadas mixtas. Come fruta, posado o en vuelo suspendido.



1400 - 3200
MSNM



19 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



GALLO DE ROCA ANDINO

(*Rupicola peruvianus*)

Andean Cock-Of-The-Rock

Características

El macho es polígamo y pasa la mayor parte del día, durante la prolongada estación reproductiva, en leks comunales en estrato medio o subdósíel. Arisco pero se expone temprano en la mañana. Frugívoro.



500 - 2500
MSNM



32 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



GUARDABOSQUE CENIZO

(*Lipaugus fuscocinereus*)

Dusky Piha

Características

Más bien inactivo y lento, en dosel o subdosel pero a veces se posa en sitios abiertos o ramas del dosel y vuela entre los árboles mientras llama. Arranca fruta con un revoloteo breve.



1900 - 3000
MSNM



33 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CABEZÓN BARRADO

(*Pachyramphus versicolor*)

Barred Becard

Características

Suele hallarse en pareja y regularmente sigue bandadas mixtas, en niveles bajo a medio de selva y montes claros. Vuela corto al follaje o salta a lo largo de las ramas.



1500 - 3000
MSNM



13 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CABEZÓN ALIBLANCO

(*Pachyramphus polychopterus*)

White-Winged Becard

Características

Individuos solitarios o parejas se mueven deliberadamente, siguiendo bandadas mixtas en selva o áreas más abiertas. Revolotean en el follaje y comen pequeñas frutas.



< 2200
MSNM



15 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



REY DEL QUNIDÍO

(*Sericossypha albocristata*)

White-Capped Tanager

Características

Bandadas ruidosas de 5-20 individuos recorren grandes distancias por el dosel o se posan en los arbustos y árboles pequeños; generalmente se escuchan mucho antes de ser vistos.



1800 - 3300
MSNM



24 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



DIGLOSA ALBILÁTERA

(*Diglossa albilateralis*)

White-Sided Flowerpiercer

Características

Muy activa, frecuentemente mueve las alas mientras perfora flores a nivel medio o más bajo, especialmente en árboles. A menudo se halla en pareja y en ocasiones se ve en bandadas mixtas.



1400 - 3500
MSNM



12 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



DIGLOSA CANELA

(*Diglossa sittooides*)

Rusty Flowerpiercer

Características

Se encuentra en áreas arbustivas bastante abiertas y jardines; no en el bosque. Perfora flores y a veces caza insectos al aire. A menudo se encuentra en pareja y, muy rara vez, en bandadas mixtas.



1300 - 3400
MSNM



11 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PARLOTERO MALCASADO

(*Tachyphonus rufus*)

White-Lined Tanager

Características

Se encuentra casi siempre en pareja; permanece a baja altura y se posa expuesto. A menudo las parejas se persiguen, en vuelo bajo, a través de claros.



< 2200
MSNM



17 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



DACNIS TURQUESA

(*Dacnis hartlaubii*)

Turquoise Dacnis

Características

Generalmente se le ve solitaria, en pareja y en ocasiones se une a bandadas mixtas. Se alimenta principalmente de frutos y de algunos artrópodos; es una especie que se encuentra en bordes de bosque húmedo o de crecimiento secundario y en cafetales con sombra.



1000 - 2200
MSNM



11 Cm



Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ESPIGUERO NEGRIBLANCO

(*Sporophila luctuosa*)

Black-And-White Seedeater

Características

Se encuentra usualmente en parejas o en pequeñas bandadas, de una sola especie, en pastos o arbustos bajos.



1300 - 2600
MSNM



11 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



SALTÁTOR ALINEGRO

(*Saltator atripennis*)

Black-Winged Saltator

Características

Más difícil de ver que otros saltators colombianos. Se observa solitario o en grupos ruidosos; con frecuencia se halla también en bandadas mixtas, principalmente en busca de fruta, desde nivel medio a dosel.



600 - 2300
MSNM



20.5 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



HEMISPINGUS CABECINEGRO

(*Kleinothraupis atropileus*)

Black-Capped Hemispingus

Características

Suele hallarse en pareja o en pequeños grupos, activos y reminescentes de reinitas. Busca en el follaje más denso de arbustos y bambús, o desde cerca del suelo a niveles medios en árboles más altos; una especie principal de bandadas mixtas, en zonas templadas.



2000 - 3500
MSNM



16 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CLOROCRISA MULTICOLOR

(*Chlorochrysa nitidissima*)

Multicoloured Tanager

Características

Habitualmente busca en el follaje externo, colgando de las hojas. También busca en ramas externas desde sotobosque alto a subdósself. Se encuentra en selva húmeda, monte secundario avanzado y bordes.



800 - 2200
MSNM



12 Cm



Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



MUSGUERITO PARAMUNO

(*Iridosornis rufivertex*)

Golden-Crowned Tanager

Características

Se observa en pareja o en grupos hasta de 4 individuos y en bandadas mixtas de tángaras y gorriones en zonas templadas. Es común verlo en matorrales espesos y bordes de monte bajo.



2400 - 3600
MSNM



15 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



DUBUSIA DIADEMA

(*Dubusia taeniata*)

Buff-Breasted Mountain-Tanager

Características

Es más fácil escucharla que observarla. Suele verse solitaria, en pares o en bandadas mixtas. Cubre extensas áreas, buscando y saltando deliberadamente a todos los niveles; a veces se posa, por unos minutos, en la copa de algún arbusto.



**2200 - 3400
MSNM**



20 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CLARINERO PRIMAVERA

(*Anisognathus somptuosus*)

Blue-Winged Mountain-Tanager

Características

Suele encontrarse en parejas o en grupos de 3 a 10 individuos, saltando activamente por ramas externas o en el follaje terminal, donde cogen fruta y buscan insectos. Se observan solitarios o en bandadas mixtas; generalmente en niveles medios del dosel.



1300 - 2800
MSNM



16.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



AZULEJO REAL

(*Butthraupis montana*)

Hooded Mountain-Tanager

Características

Es usual verla en grupos de 3 - 10 individuos que recorren distancias considerables por escarpes o cañones selváticos. Salta por ramas externas y follaje del dosel y come fruta. También suele hallarse en bandadas mixtas.



2000 - 3600
MSNM



21 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TANGARA DIADEMA

(*Chalcothraupis ruficervix*)

Golden-Naped Tanager

Características

Busca debajo de las ramas cabeza abajo, aunque también busca en el follaje. Suele observarse solitaria o en pareja. Usualmente se encuentra alta y come una variedad de frutas.



1300 - 2500
MSNM



13 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TANGARA RASTROJERA

(*Stilpnia vitriolina*)

Scrub Tanager

Características

Suele verse solitaria o en pareja. Ocasionalmente se observa en árboles o arbustos con fruta.



300 - 2500
MSNM



14 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TANGARA BERILINA

(*Tangara nigroviridis*)

Beryl-Spangled Tanager

Características

Usualmente busca debajo de ramas pequeñas y a veces en mechones de musgo de ramas delgadas; Se encuentra en pareja o en grupos de 12 o más individuos y en bandadas mixtas. Es notablemente frugívora.



1100 - 3000
MSNM



12 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TANGARA CORONADA

(*Tangara xanthocephala*)

Safron-Crowned Tanager

Características

A menudo avanza por pequeñas ramas y, a veces, por ramitas expuestas. Generalmente se encuentra en bordes o en monte secundario alto y, con menor frecuencia, al interior de la selva. Es frugívora.



1200 - 2400
MSNM



13 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TANGARA DORADA

(*Tangara arthus*)

Golden Tanager

Características

Explora en ramas desnudas o en musgo, en busca de insectos. Suele verse en bandadas mixtas con otras especies. Se observa solitario, en pareja y a veces en pequeños grupos.



1200 - 2500
MSNM



13 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



AZULEJO MONTAÑERO

(*Thraupis cyancephala*)

Blue-Capped Tanager

Características

Se observa en pareja o, con menos frecuencia, en grupos de 3-8 individuos. Usualmente se halla en niveles medios de los árboles pero desciende a arbustos en fruta.



1700 - 3200
MSNM



16 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



GORRIÓN LISTADO

(*Arremon assimilis*)

Grey-Browed Brush-Finch

Características

Es semiterrestre. Suele observarse solitario o en pareja, oculto en sotobosque denso o cerca del suelo. Voltea hojas con su pico. Usualmente es difícil de ver.



2200 - 3600
MSNM



19.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



GORRIÓN COLLAREJO

(*Arremon brunneinucha*)

Chestnut-Capped Brush-Finch

Características

Semiterrestre y muy escondidizo, fácilmente pasa desapercibido pero es curioso y puede exponerse. Suelen observarse solitario o en pareja. Es muy silencioso, salta por el suelo o a baja altura en sotobosque; volteá hojas con el pico.



800 - 2600
MSNM



18 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



COPETÓN COMÚN

(*Zonotrichia capensis*)

Rufous-Collared Sparrow

Características

Habita en áreas abiertas desde el nivel del mar hasta altas elevaciones. Con frecuencia se observa en bordes de carreteras, en parques y viviendas. También se ve en áreas agrícolas y terrenos abiertos con árboles dispersos. Es una especie bastante conspicua que permanece cerca del suelo.



< 3600
MSNM



12.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PIRANGA ROJA

(*Piranga rubra*)

Summer Tanager

Características

Suele encontrarse solitario o en bandadas mixtas. Permanece al interior de árboles más bien ralos; busca en el follaje y con frecuencia vuela al aire en pos de insectos; ocasionalmente se encuentra en árboles de fruta.



< 3200
MSNM



17.5 Cm



Migratoria Boreal



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



REINITA TREPADORA

(*Mniotilla varia*)

Black-And-White Warbler

Características

Solitaria o en bandadas mixtas; trepa por troncos y ramas grandes desde sotobosque a subdosel. Es una especie migratoria.



< 2700
MSNM



13 Cm



Migratoria Boreal



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



REINITA TROPICAL

(*Setophaga pityayumi*)

Tropical Parula

Características

Suele hallarse solitaria o en pareja y busca en follaje de subdosoel y, a veces, en arbustos.



< 2700
MSNM



11 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



REINITA NARANJA

(*Setophaga fusca*)

Blackburnian Warbler

Características

Se encuentra generalmente sola o en bandadas mixtas a nivel medio o superior; Es visible. Residente de invierno y transeúnte muy común y de amplia distribución.



600 - 3500
MSNM



13 Cm



Migratoria Boreal



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ARAÑERO CABECILISTADO

(*Basileuterus tristriatus*)

Three-Striped Warbler

Características

Suele encontrarse en pareja o en pequeños grupos en nivel bajo, buscando acrobáticamente en el follaje y parloteando ruidosamente; a menudo en bandadas mixtas. Común en sotobosque de selva húmeda y muy húmeda.



500 - 2600
MSNM



13 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



REINITA DEL CANADÁ

(*Cardellina canadensis*)

Canada Warbler

Características

Usualmente se ve a 1 - 10 metros en el follaje más denso; a menudo en bandadas mixtas. Transeúnte y residente de invierno común. Habita en áreas de bosque, especialmente en bordes con matorral en las montañas.



< 3000
MSNM



13 Cm



Migratoria Boreal



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ABANICO PECHINEGRO

(*Myioborus miniatus*)

Slate-Throated Whiststart

Características

Visible, activo y constantemente abriendo la cola en abanico y entreabriendo las alas, mientras vuela distancias cortas. Salta a lo largo de ramas altas o bajas, o cuelga momentáneamente de troncos o enredaderas.



600 - 2700
MSNM



13 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



JILGUERO ALIBLANCO

(*Spinus psaltria*)

Lesser Goldfinch

Características

Suele observarse errante, en pareja o en pequeñas bandadas, desde el suelo hasta las copas de los árboles; con frecuencia come en cunetas o áreas enmalezadas y en el suelo.



500 - 3100
MSNM



10 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



EUFONIA COMÚN

(*Euphonia xanthogaster*)

Orange-Bellied Euphonia

Características

Se observa en parejas o en pequeñas familias que siguen bandadas mixtas de otros frugívoros. Come principalmente frutas; Se encuentra de sotobosque alto a dosel, a menudo a baja altura en bordes y en arbustos con fruta.



< 2600
MSNM



10 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CLOROFONIA FERRUGÍNEA

(*Chlorophonia pyrrhophrys*)

Chestnut-Breasted Chlorophonia

Características

Generalmente permanece en pareja y, con menor frecuencia, en grupos familiares. Forrajea en el dosel, en donde pasa largos períodos de tiempo moviéndose muy poco entre cúmulos de epífitas. Se alimenta principalmente de frutos tipo baya como los de algunas especies de las familias Loranthaceae y Ericaceae e higos de especies del género *Ficus*.



1600 - 3400
MSNM



12 Cm




Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.

Zona Baja Cafetera



VEREDAS

Bajo Arroyo, Bajo castillo, El Avion,
Rio Claro, Llanitos, Nueva Primavera,
Los Cuervos, Miraflores,
Villarazo, La Batea, Rincon Santo,
San Julian, Corozal, Partidas, El Yarumo

LUGAR	ATRACTIVO	DISTANCIA DESDE CABECERA
Casa en el Árbol, Vereda bajo Arroyo	Zona de camping piscina, zona BBQ, senderos ecológicos	1 hora
Vereda el Bajo Arroyo	Como atractivo el campanario de una de las primeras Iglesias que tuvo el municipio en la zona rural.	1 hora
Vereda Llanitos, finca la Toscana	Hospedaje, cabañas, salón de eventos, piscina, restaurante y sendero ecológico	1 hora 15 min.
Vereda Llanitos Hostal la Riveria	hospedaje restaurante jacuzzi al aire libre	1 hora 15 min.

LUGAR	ATRACTIVO	DISTANCIA DESDE CABECERA
Vereda antiguo Rio Claro	Ruinas del antiguo poblado Rio Claro, que dejo la avalancha del Nevado del Ruiz en 1985	1 hora y 1/2
Nuevo Rio Claro, Hostal la Estancia.	Hospedaje, jacuzzi al aire libre, sendero ecológico.	1 hora y 1/2
Mirador Alto de Villarazo	Avistamiento del PCC, oferta gastronómica.	1 hora y 1/2
Mirador Alto de Miraflores	Servicio de restaurante, visualización del paisaje.	1 hora y 1/2
Vereda San Julián, finca demostrativa Don Miguel	Lago de pesca, restaurante, sendero proceso del café, avistamiento de aves. Pasadía.	1 hora y 1/2
Mirador la Cuchilla de San Julián.	Servicio de restaurante, visualización del paisaje.	1 hora y 1/2
Vereda Rincón Santo, Finca la Selva	Hospedaje zona de camping sendero ecológico, restaurante, proceso del café. Granja pinares (lugar fuera de servicio)	2 horas
Vereda Partidas, Finca la Monarca	Hospedaje, recorrido por jardín de mariposas, cabalgata avistamiento de aves, restaurante.	2 horas
Vereda Cuervos, Hacienda el Jardín	Hospedaje avistamiento aves, sendero del café, proceso del café, restaurante salón de eventos, piscina. Pasadía y noche.	1 hora y 1/2
Vereda el Avión, túneles del ferrocarril	la ruta patrimonio industrial túneles del ferrocarril (a futuro) turismo accesible personas con discapacidad.	2 horas
Vereda Nuevo Rio Claro, santuario de la virgen de Guadalupe	Visita al santuario de la virgen de Guadalupe.	1 hora y 1/2



GUACHARACA COLOMBIANA

(*Ortalischachalaca*)

Colombian chachalaca

Características

Se encuentra en bosques húmedos y bordes de bosque; usualmente se le puede ver perchada en parejas o pequeños grupos; su alimentación se compone principalmente de frutos, teniendo un papel importante en la dispersión de semillas. Es tímida pero tolerante a la perturbación y es una especie muy activa vocalmente.



300 - 2000
MSNM



50 - 55 Cm



Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TORCAZA MORADA

(*Patagioenas cayennensis*)

Pale-Vented Pigeon

Características

Permanece sola, en parejas o en grupos grandes de individuos. Con frecuencia, se le encuentra posada en árboles frutales. Se alimenta de frutos pequeños y de semillas. Habita en bordes de bosques secos y húmedos, sabanas inundables de árboles dispersos, manglares, bosques de galería y bosques secundarios.



< 2000
MSNM



34 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CAMINERA RABIBLANCA

(*Leptotila verreauxi*)

White-Tipped Dove

Características

Es un ave terrestre que permanece sola o en parejas. Camina silenciosamente por el suelo, en donde cabecea con frecuencia cuando picotea. Su dieta es a base de semillas y de algunos insectos, como orugas y polillas. Habita en áreas abiertas con cobertura arbustiva, bordes de bosque y matorrales.



< 2800
MSNM



28 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TORCAZA NAGÜIBLANCA

(*Zenaida auriculata*)

Eared Dove

Características

En Colombia, es común encontrarla en áreas abiertas y secas, prados, jardines y zonas pobladas. Es un ave bastante sociable y confiada que se alimenta en el suelo mientras está en pareja o en grupos numerosos; camina con pasos rápidos y cortos. Cuando vuela, produce un aleteo sonoro.



< 3500
MSNM



26 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TORTOLITA COMÚN

(*Columbina talpacoti*)

Ruddy Ground-Dove

Características

Notablemente social y confiada. Se alimenta principalmente en el suelo, solitaria, en pares o en grupos de tamaño variable. Camina con pasos cortos y rápidos. Se levanta con un aleteo sonoro y vuela corta distancia.



< 2500
MSNM



18 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



COLIBRÍ COLLAREJO

(*Florisuga mellivora*)

White-Necked Jacobin

Características

Usualmente se encuentra solitario pero puede congregarse en árboles con flores. Forrajea a alturas variables; a menudo revolotea sobre ríos o árboles, a la caza de insectos. Los machos efectúan un despliegue llamativo con ascensos y clavados, con la cola abierta en abanico.



< 2000
MSNM



10 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ERMITAÑO VERDE

(*Phaethornis guy*)

Green Hermit

Características

Solitario, se mueve rápidamente emitiendo chillidos. Ocasionalmente, revolotea en la cara del observador para alejarse luego con una sacudida de la cola. Los machos cantan en leks.



600 - 2200
MSNM



12.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



MANGO PECHINEGRO

(*Anthracothorax nigricollis*)

Black-Throated Mango

Características

Bien conocido por su hábito de revolotear estático, en áreas abiertas, en busca de insectos. Ocasionalmente se encuentra, en grupos pequeños, en árboles florecidos pero, generalmente, es más bien solitario.



< 2000
MSNM



10.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PICUDO CORONADO

(*Heliodomaster longirostris*)

Long-Billed Starthroat

Características

Se encuentra, usualmente solitario u ocasionalmente en pareja, en alturas medias o altas. A veces se encuentra a alturas más bajas, en arbustos en flor. Se posa cerca del extremo de ramas desnudas y expuestas. A menudo caza insectos al aire, en revoloteo.



< 2000
MSNM



10 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



AMAZILIA COLIRRUFO

(*Amazilia tzacatl*)

Rufous-Tailed Hummingbird

Características

Liba en flores y caza insectos en follaje, ramas y telas de araña, a alturas bajas a moderadas. Colibrí característico de jardines y zonas habitadas de muchas regiones.



< 1900
MSNM



9 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



AMAZILIA COLIAZUL

(*Amazilia saucerottei*)

Steely-Vented Hummingbird

Características

Se observa principalmente en arbustos bajos. Notablemente agresivo. Relativamente común en áreas secas de matorral, bordes de monte, tierras cultivadas y jardines. Suele ser estacional y localmente muy común.



< 2100
MSNM



8.7 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CHILACOA COLINEGRA

(*Aramides cajaneus*)

Gray-Cowled Wood-Rail

Características

Generalmente furtiva y difícil de ver, pero se oye a menudo. Ocasionalmente camina en terreno abierto. Se encuentra en pareja o en pequeños grupos. Suele verse principalmente en el suelo y, a veces, en arbustos. Parcialmente nocturna. Reposa en perchas elevadas.



< 2000
MSNM



35 - 40 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PELLAR COMÚN

(*Vanellus chilensis*)

Southern Lapwing

Características

Suele verse solitario o en pareja. Visible en pastizales cortos o crecidos. De vuelo lento y con altibajos, por lo general no sostenido por largos períodos. Su dieta incluye principalmente saltamontes, larvas de insectos, lombrices de tierra, peces pequeños e invertebrados terrestres.



< 3300
MSNM



37 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



COQUITO

(*Phimosus infuscatus*)

Bare-Faced Ibis

Características

Se observa en grupos de tamaño variable (desde unos pocos individuos hasta varias docenas o más), caminando, explorando pisos blandos en dehesas pantanosas o en orillas de lagunas.



< 3000
MSNM



55 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



GUALA COMÚN

(*Cathartes aura*)

Turkey Vulture

Características

Se encuentra usualmente solitaria y, a veces, en grupos ampliamente dispersos. Remonta a gran altura y tiene un gran dominio en el aire. Es carroñera y puede concentrarse en grandes grupos, haciendo "remolinos" en el aire con otras aves, como los gallinazos.



< 2600
MSNM



75 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



GALLINAZO COMÚN

(*Coragyps atratus*)

Black Vulture

Características

Carroñero común en áreas pobladas; a menudo duerme en árboles o en edificios. Se puede encontrar alimentándose en los basureros. Activo desde el amanecer o incluso desde antes.



< 4000
MSNM



65 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



GAVILÁN CAMINERO

(*Rupornis magnirostris*)

Roadside Hawk

Características

En Colombia es el ave rapaz más común. Habita en bosques secos y húmedos en crecimiento secundario, sabanas con bosques de galería, rastrojos y zonas abiertas con árboles dispersos. Se alimenta de insectos, anfibios, roedores, peces y reptiles (culebras y lagartos).



< 2700
MSNM



33 - 40 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CURRUCUTÚ COMÚN

(*Megascops choliba*)

Tropical Screech-Owl

Características

Es una especie nocturna y casi siempre se observa en pareja. Suele descansar en una cavidad o en una rama a una altura moderada.



< 2700
MSNM



23 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



BÚHO DE ANTEOJOS

(*Pulsatrix perspicillata*)

Spectacled Owl

Características

Principalmente nocturno, aunque ocasionalmente es activo en días nublados. Descansa a alturas variables, en el dosel.



< 1500
MSNM



43 - 52 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



BIGOTUDO CANOSO

(*Malacoptila mystacalis*)

Moustached Puffbird

Características

Es un ave poco activa y bastante confiada que, generalmente, se posa a baja altura en el sotobosque. Captura sus presas en el follaje o el suelo mediante vuelos desde una perchta a la cual, generalmente, regresa. En ocasiones se le encuentra en barrancos, bordes de bosque y en áreas abiertas arboladas.



**800 - 2300
MSNM**



21.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TUCANCITO RABIRROJO

(*Aulacorhynchus haematopygus*)

Crimson-Rumped Toucanet

Características

Suele encontrarse en pareja o grupos pequeños, desde los niveles más bajos hasta el dosel. Activo, ruidoso y a veces curioso. A menudo se mueve por los estratos más altos en fila india. Omnívoro, a menudo roba nidos de otras aves.



**600 - 2200
MSNM**



40 - 45 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CARPINTERO PUNTEADO

(*Picumnus granadensis*)

Greyish Piculet

Características

Habita en bordes de bosques secos a moderadamente húmedos, en matorrales y cafetales con sombrío. Permanece solo, en pareja o en grupos familiares y, en ocasiones, se une a bandadas mixtas. Perfora pequeños agujeros en búsqueda de insectos. Presenta dimorfismo sexual, donde el macho tiene pinitos amarillos en la frente y la hembra los tiene blancos.



500 - 2200
MSNM



9.5 Cm




Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CARPINTERO DE LOS ROBLES

(*Melanerpes formicivorus*)

Acorn Woodpecker

Características

Activo: Suele encontrarse en pareja o en grupos ruidosos de hasta 12 individuos. Visible en árboles altos y muertos. A menudo atrapa insectos al aire, en vuelos cortos.



1400 - 2700
MSNM



23 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CARPINTERO HABADO

(*Melanerpes rubricapillus*)

Red-Crowned Woodpecker

Características

Visible en áreas abiertas. Usualmente se le ve solitario o en pareja, a altura media o baja. Cincela superficies de corteza, inspecciona extremos de ramas rotas y, a menudo, come fruta.



< 2000
MSNM



18 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CARPINTERO BUCHIPECOSO

(*Colaptes punctigula*)

Spot-Breasted Woodpecker

Características

Es una especie que tolera áreas fuertemente intervenidas, ya que a veces se le puede ver en zonas verdes, dentro de ciudades. Se alimenta principalmente de insectos. Suele encontrarse solitario o en pareja. A menudo puede verse en el suelo, cazando hormigas.



< 1800
MSNM



20 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PIGUA

(*Milvago chimachima*)

Yellow -Headed Caracara

Características

Ave visible en terreno abierto, vista a menudo sobre árboles o caminando a lo largo de carreteras y orillas de los ríos. Come carroña. A menudo se posa sobre el ganado para buscar garrapatas.



< 2700
MSNM



40 - 45 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



PERIQUITO DE ANTEOJOS

(*Forpus conspicillatus*)

Spectacled Parrotlet

Características

Suele encontrarse en pareja o en pequeñas bandadas, usualmente ruidosas y visibles. Tiene un vuelo ondulado, errático y generalmente no tan sostenido como en otras especies de la familia. Come semillas de gramíneas, malezas y pequeñas frutas.



< 2600
MSNM



12.5 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



BATARÁ MAYOR

(*Taraba major*)

Great Antshrike

Características

Se encuentra usualmente en pareja, salta y rebusca en marañas de enredaderas y, generalmente, permanece fuera de vista. Rara vez sigue marchas de hormigas o se une a bandadas mixtas. Mientras busca alimento, hace crujir las hojas secas, ruidosamente.



< 1500
MSNM



19.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



BATARÁ CARCAJADA

(*Thamnophilus multistriatus*)

Bar-Crested Antshrike

Características

Se encuentra usualmente en pareja, bien escondida en el follaje. Rebusca artrópodos grandes; ocasionalmente sigue marchas de hormigas. Se le detecta más fácilmente por su canto fuerte y acelerado. Utiliza áreas cultivadas, jardines y parques con matorrales y árboles dispersos.



< 2000
MSNM



16 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



HORMIGUERO DE PARKER

(*Cercomacroides parkeri*)

Parker's Antbird

Características

Esta especie es endémica de Colombia. Es un ave bastante activa, que avanza mediante saltos, en ocasiones por ramas verticales, y captura sus presas en el follaje.



1200 - 2000
MSNM



14 Cm



Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TREPADOR CAMPESTRE

(*Lepidocolaptes souleyetii*)

Streak-Headed Woodcreeper

Características

Usualmente solitario, trepa troncos y ramas, a nivel medio a alto; a menudo trepa por debajo de ramas horizontales. Atrapa sus presas mediante espiguelo en la superficie de troncos y ramas o sondeando en el interior de cortezas y cúmulos de musgo.



< 1400
MSNM



19.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



RASTROJERO RUBICUNDO

(*Cranioleuca erythrops*)

Red-Faced Spinetail

Características

Activo: trepa acrobáticamente por marañas de enredaderas y a lo largo de ramas musgosas. Se encuentra solitario, en pareja o en bandadas mixtas, desde estrato medio hasta subbosel.



1000 - 2200
MSNM



14.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



RASTROJERO PÁLIDO

(*Synallaxis albescens*)

Pale-Breasted Spinetail

Características

Furtivo: se oye con más frecuencia de lo que se ve. Puede llamar desde perchas bajas expuestas, temprano en la mañana, pero usualmente permanece oculto.



< 2000
MSNM



14 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ELAENIA COPETONA

(*Elaenia flavogaster*)

Yellow-Bellied Elaenia

Características

Vivaz y ruidosa. Rebusca insectos y fruta en los matorrales; ocasionalmente da vuelos cortos. Suele encontrarse solitaria, en pareja o en grupos familiares, en arbustos con fruta.



< 2300
MSNM



16.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TIRANUELO SILBADOR

(*Campstostoma obsoletum*)

Southern Beardless-Tyrannulet

Características

Suele encontrarse solitario o en pareja; rebusca, como los vireos, en ramitas y follaje de 2-10 metros; Confiado, llamativo, de cola ligeramente levantada; Canta con frecuencia.



< 1900
MSNM



10 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TIRANUELO SALTARROYO

(*Serpophaga cinerea*)

Torrent Tyrannulet

Características

Vivaz y alerta. Las parejas patrullan pequeñas secciones de arroyos rocosos y se ven, a menudo, posadas en piedras grandes en los lechos o en ramas sobre el agua. A menudo mueven la cola hacia arriba.



1000 - 3300
MSNM



11 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ATRAPAMOSCAS OREJINEGRO

(*Leptopogon superciliaris*)

Slaty-Capped Flycatcher

Características

Con frecuencia aletea nerviosamente en reposo. Se posa erguido, en nivel bajo a medio. Hace vuelos cortos al follaje y cambia de percha con frecuencia.



500 - 2000
MSNM



13.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ESPATULILLA RASTROJERA

(*Poecilotriccus sylvia*)

Slate-Headed Tody-Flycatcher

Características

A menudo manso pero oculto en matorrales densos. Vuela corto entre el follaje. Brinca por los alrededores, a veces quedándose quieto por largos periodos. Tiene el pico doblado.



< 1300
MSNM



9.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ESPATULILLA COMÚN

(*Todirostrum cinereum*)

Common Tody-Flycatcher

Características

Revolotea y salta con la cola levantada, desde los arbustos hasta la copa de los árboles, deteniéndose a mirar hacia arriba en el follaje denso; hace vuelos cortos y rápidos al envés de las hojas.



< 2200
MSNM



9.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ATRAPAMOSCAS PECHIRRAYADO

(*Myiophobus fasciatus*)

Bran-Coloured Flycatcher

Características

Suele verse solitario o en pareja, usualmente posado más bien a nivel bajo y no es tan fácil de ver en matorrales. Busca y atrapa insectos en el aire y regresa a la percha.



< 2000
MSNM



12 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ATRAPAMOSCAS PECHIRROJO

(*Pyrocephalus rubinus*)

Vermilion Flycatcher

Características

Confiado; usualmente posado en percha prominente de ramas externas de árbol o arbusto; también suele verse en cercas y cables. Vuela al aire o al suelo para cazar insectos.



< 2700
MSNM



13 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



SUELDA CRESTINEGRA

(*Myiozetetes cayanensis*)

Rusty-Margined Flycatcher

Características

Se observa en parejas o en grupos familiares, a menudo ruidosos. Vuela corto al aire o al follaje, desde perchas a altura media, a veces más alto o más bajo.



< 2200
MSNM



17 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ATRAPAMOSCAS MACULADO

(*Myiodynastes maculatus*)

Streaked Flycatcher

Características

Pasa mucho tiempo en niveles medios o altos de los árboles pero a veces se observa a nivel más bajo. Suele verse solitario o en pareja y generalmente no se deja ver, excepto cuando llama. Captura insectos grandes en vuelos cortos hacia follaje o ramas.



< 1600
MSNM



20.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



VERDERÓN CASTAÑO

(*Pachysylvia semibrunnea*)

Rufous-Naped Greenlet

Características

Suele hallarse solitario, en pareja o en familia; a menudo en bandadas mixtas. Busca activamente en follaje externo, desde nivel medio hasta subdosoel.



700 - 2700
MSNM



12.5 Cm



Casi Endémica



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



VERDERÓN MONTAÑERO

(*Vireo leucophrys*)

Brown-Capped Vireo

Características

Se encuentran solitarios o en pareja, en ocasiones forman grupos familiares durante la época de cría. Forrajea activamente en el follaje en busca de insectos. Se le encuentra en bordes de bosque, monte secundario alto y plantaciones de café.



1000 - 2800
MSNM



12 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CUCARACHERO COMÚN

(*Troglodytes aedon*)

House Wren

Características

Pequeña ave vivaz y alegre que se encuentra con frecuencia en compañía del hombre. Mantiene la cola erecta mientras salta activamente a lo largo de setos o matorrales y, ocasionalmente, en árboles altos.



< 3300
MSNM



12 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



MIRLA PARDA

(*Turdus grayi*)

Clay-Cloured Thrush

Características

Son agresivos en las cercanías de su nido, pero no defienden territorios grandes. Fuera de la época de reproducción, penetran a los bosques y bosques secundarios maduros a forrajejar. Se alimentan de lombrices, babosas, larvas e insectos adultos.



< 1600
MSNM



25 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



MIRLA OLLERA

(*Turdus ignobilis*)

Black-Billed Thrush

Características

Común y visible en áreas ocupadas por el hombre. Individuos o parejas saltan por el suelo en los prados y en general en áreas abiertas; También suelen verse en arbustos o árboles en áreas con más vegetación.
"



< 2600
MSNM



23 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



SICALIS CORONADO

(*Sicalis flaveola*)

Saffron Finch

Características

Presente en sabanas con presencia de árboles dispersos, bordes de monte claro o pantanos, prados y jardines, bosques secos abiertos, cultivos, áreas urbanas. Se alimenta principalmente de semillas y artrópodos pequeños; suele comer en el suelo y se posa en los arbustos y árboles bajos.



< 2600
MSNM



14.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



VOLATINERO NEGRO

(*Volatinia jacarina*)

Blue-Black Grassquit

Características

Ave de terrenos abiertos y solitarios. Come semillas de gramíneas. Su salto de despliegue es parte del comportamiento de formación de pareja y de defensa territorial.



< 2300
MSNM



10 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



GÜICHA HORMIGUERA

(*Eucometis penicillata*)

Grey-Headed Tanager

Características

Suele observarse en pareja o en grupos de 3-4 individuos que siguen marchas de hormigas legionarias o buscan insectos a 1-10 metros en la selva. Poco común. Usualmente se encuentra a bajo nivel, en monte secundario húmedo.



< 1700
MSNM



16.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ASOMA CANDELA

(*Ramphocelus flammigerus*)

Flame-Rumped Tanager

Características

Ruidoso y visible. Usualmente se observa en grupos pequeños, en matorrales o en pequeños árboles y arbustos de fruta. El macho con frecuencia se posa expuesto con las alas caídas y la rabadilla expuesta.



< 2200
MSNM



18 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ESPIGUERO LADRILLO

(*Sporophila minuta*)

Ruddy-Breasted Seedeater

Características

Suele observarse en pareja durante la reproducción, el resto del tiempo en bandadas, a menudo con otros espigueros y semilleros. Come semillas de gramíneas desde los tallos.



< 2300
MSNM



9.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ESPIGUERO GRIS

(*Sporophila intermedia*)

Grey Seedeater

Características

Suele verse en pareja o en pequeños grupos (laxos) que, con frecuencia, se agrupan con otros espigueros y semilleros.



< 2300
MSNM



11 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



SALTÁTOR PÍO-JUDÍO

(*Saltator striatipectus*)

Streaked Saltator

Características

Canta en la mañana, desde perchas expuestas, pero el resto del día prefiere estar oculto cerca de o en matorrales. Se observa solitario, en pareja o en tríos y es frugívoro.



< 2500
MSNM



19.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



MIELERO COMÚN

(*Coereba flaveola*)

Bananaquit

Características

Ave pequeña, muy activa. Se encuentra solitaria o en pareja, a casi cualquier altura sobre el suelo; busca néctar en flores y come pequeñas bayas. Es tranquila. Es común verla en jardines, plantaciones y áreas de matorral.



< 2000
MSNM



11 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



SEMILLERO CARIAMARILLO

(*Tiaris olivaceus*)

Yellow-Faced Grassquit

Características

Se observa usualmente en pareja y, con menos frecuencia, en pequeños grupos. Come semillas en el suelo o colgando de los tallos. Tiene un vuelo corto y zumbante.



700 - 2400
MSNM



10.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TANGARA CAPIROTADA

(*Stilpnia heinei*)

Black-Capped Tanager

Características

Suele hallarse en pareja o en grupos hasta de 6 individuos y, con frecuencia, en bandadas mixtas. Se encuentra especialmente en árboles y arbustos con fruta. Salta y revolotea en el follaje.



1400 - 2300
MSNM



13 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TANGARA REAL

(*Stilpnia cyanicollis*)

Blue-Necked Tanager

Características

Suele hallarse solitaria, en pareja o en familia, a alturas variables en los árboles. Vuela, torpemente, al aire para cazar insectos o salta por el follaje y en árboles y arbustos de fruta.
"



700 - 2200
MSNM



12 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TANGARA LACRADA

(*Tangara gyrola*)

Bay-Headed Tanager

Características

Suele hallarse en árboles y arbustos en fruta, usualmente en nivel medio o más alto, buscando cabeza abajo en las ramas. Se observa solitaria, en pareja o en familia y, con frecuencia, en bandadas mixtas.



< 2200
MSNM



12 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



AZULEJO COMÚN

(*Thraupis episcopus*)

Blue-Grey Tanager

Características

Es una de las aves más comunes de Colombia en áreas pobladas. Sociable, se encuentra en pareja o en pequeños grupos. Caza insectos al aire y visita árboles en flor y fruta.



< 2600
MSNM



16 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



AZULEJO PALMERO

(*Thraupis palmarum*)

Palm Tanager

Características

Común en las copas de los árboles al interior de la selva y, con menor frecuencia, en zonas urbanas. Regularmente se cuelga de los ápices de las palmas.



< 2600
MSNM



17 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



REINITA ENLUTADA

(*Geothlypis philadelphica*)

Mourning Warbler

Características

Furtiva en pastos, como otras de su género, pero normalmente no es difícil de ver.



< 3000
MSNM



13 Cm



Migratoria Boreal



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



ARAÑERO RIBEREÑO

(*Myiothlypis fulvicauda*)

Buff-Rumped Warbler

Características

Es terrestre. Salta, rara vez camina, por las orillas de charcos o arroyos y mueve la cola abierta en abanico de un lado a otro. Canta desde el suelo o los troncos.



< 1600
MSNM



13.5 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



TURPIAL MONTAÑERO

(*Icterus chrysater*)

Yellow-Backed Oriole

Características

Suele hallarse en pareja o en grupos de hasta 10 individuos. Actúa como otros turiales, saltando a lo largo de las ramas, explorando flores y ocasionalmente cantando fuertemente.



< 2800
MSNM



21 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



CHAMÓN PARÁSITO

(*Molothrus bonariensis*)

Shiny Cowbird

Características

Camina con la cola ligeramente erecta. A menudo forrajea en el suelo en sitios abiertos. Suele hallarse solitario o, más frecuentemente, en pequeños grupos. No muestra preferencia especial por el ganado.



< 2600
MSNM



19 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.



EUFONIA GORGIAMARILLA

(*Euphonia laniirostris*)

Thick-Billed Euphonia

Características

Se observa solitaria, en pareja y ocasionalmente en pequeños grupos y en bandadas mixtas, especialmente con otras eufonias. Principalmente se encuentra a nivel medio o alto en los árboles.



< 2000
MSNM



10 Cm



Residente



1300
Msnm Aprox.

5000
Msnm Aprox.

**ANDRÉS FELIPE ARISTIZÁBAL PARRA
ALCALDE MUNICIPAL DE VILLAMARÍA**

**John James Hernández Quintero
Director de Turismo Villamaría**

**Director de la guía
Fabio Nelson Arias Ortiz**

**Investigación y recopilación de textos:
Daniel Felipe Aristizábal Salazar,
Estudiante de Biología
Fabio Nelson Arias Ortiz,
Tecnólogo en Guianza Turística
Yinna Paola Rendón Aranzazu,
Tecnóloga en gestión de Recursos
Naturales**

**Fotografía
Fabio Nelson Arias Ortiz
Yinna Paola Rendón Aranzazu**

**Diseño y diagramación
Andrés Valencia Ramírez
Publicista**

**Cítese como:
Arias, F.N., Rendón, Y.P., Aristizábal, D.F. 2021.
Guía de Aves Representativas del Municipio de
Villamaría. Alcaldía de Villamaría.**



RNT VILLAMARIA

ALAN TOURS AGENCIA DE VIAJES ANA MARIA BELTRAN 3106522283
REFUGIO AMBACHEKE VIVIENDAS TURÍSTICAS JAIME PEREZ 3117202138
BATARÁ TRAVEL S.A.S AGENCIA DE VIAJES JAIME PEREZ 3117202138
COLOMBIA ECO TRAVEL AGENCIA DE VIAJES COLMART HELENE 3503542500
HOSTAL LA MARULA ALOJAMIENTO TURÍSTICO TATIANA AMAYA 3184688737
PAULA TUR AGENCIA DE VIAJES STIVEN SERNA 3016111516
OPERADORA MARY Y SOL AGENCIA DE VIAJES MARISOL GARCIA 8777854
COLOR DE MIS REVES ALOJAMIENTO TURÍSTICO ADRIANA ISAZA 3007217995
IKIGAI GLAMPING ALOJAMIENTO TURÍSTICO ANDERSON GALLEG 3105459774
MIKU TRAVEL AGENCIA DE VIAJES COLMART HELENE 3503542500
TERMALES EL OTOÑO ALOJAMIENTO TURÍSTICO JEANETTE GAMBOA 8740280
TRAVELLING GROUP AGENCIA DE VIAJES JEFFERSON BUITRAGO 3146327624
CASONA SUITES ALOJAMIENTO TURÍSTICO LINA SALAZAR 3127676026
ALISTE LA MALETA AGENCIA DE VIAJES LESLY OSPINA 3182355467
GATO CHIVAS DEL EJE AGENCIA DE VIAJES DEISY GOMEZ 3117765156
VIVO GLAMPING VIVIENDAS TURÍSTICAS ANDRES PATIÑO 3013904013
TRAVEL BY COLOMBIA DESTINATION CALDAS AGENCIA DE VIAJES
CLAUDIA GUZMAN 3113039227
ACUAPARQUE DE LA MONTAÑA PARQUES TEMÁTICOS CETINA GALLEG 8741213
VOLCANO ADVENTURES AGENCIA DE VIAJES LAURA HIRS 3195398301
CASA EN EL ARBOL ALOJAMIENTO TURÍSTICO BLANCA ARANGO 3177773000
PINO TERMINAL ALOJAMIENTO TURÍSTICO EDGAR GONZALEZ 3177238878
EL JARDIN ALOJAMIENTO TURÍSTICO AURISTELA RODRIGUEZ 3148883108
BIOHAUS MANIZALES ALOJAMIENTO TURÍSTICO FEDERICO DIAZ 3002622616
EL NIDO DEL CONDOR ALOJAMIENTO TURÍSTICO JAIME BOTERO 8745262
ECOPARQUE TEJARES VIVIENDAS TURÍSTICAS RAFAEL SABOGAL 3147077663
BOSQUES DE TERMALIA VIVIENDAS TURÍSTICAS DIANA HURTADO 3207010114
HOTEL Y PASADIA PANAMERICANA
ALOJAMIENTO TURÍSTICO DANIEL BOTERO 3113250307
HOSTAL VILLAMARIA PLAZA ALOJAMIENTO
TURÍSTICO HERMINIA SANCHEZ 3166262086
BOSQUES DE TERMALIA VIVIENDAS TURÍSTICAS DIANA HURTADO 3207010114
DON MIGUEL AGENCIA DE VIAJES JOHN MURILLO 3136461948
ECOTERMALES EL OTOÑO ALOJAMIENTO TURÍSTICO CRISTINA ESTRADA 3104510176
HOTEL TERMALES DEL RUIZ ALOJAMIENTO TURÍSTICO SERGIO SALAZAR 8930300
LAGUNA NEGRA PARQUES TEMÁTICOS JAIME MONTES 3105152992
HOSTAL LA LAGUNA ALOJAMIENTO TURÍSTICO ALEXANDRA JARAMILLO 3104546593
TIERRA VIVA VIVIENDAS TURÍSTICAS LUZ NELLY SALGADO 8743089
GRANJA PINARES VIVIENDAS TURÍSTICAS YOLANDA BUITRAGO 3043731674
VILLANUEVA ALOJAMIENTO TURÍSTICO KEVIN JARAMILLO 3104157722
VILLATOURS AGENCIA DE VIAJES LAURA GIRALDO 3117529144
ALTURA COLOMBIA SPA AGENCIA DE VIAJES FRANCIA QUINTERO 3113106879
TERMALES LA QUINTA VIVIENDAS TURÍSTICAS ALEJANDRO ECHEVERRI 8874458
DIANA PATRICIA ECHEVERRY GUIA DE TURISMO 3104597255
JOHN FREDY CARDONA GUIA DE TURISMO 3137423695
PAULA ANDREA ZAPATA GUIA DE TURISMO 8906541
JUAN CARLOS HENAO GUIA DE TURISMO 3185491408
ANGELA VIVIANA RIOS GUIA DE TURISMO 3113103803
OSCAR ANDRES HERRERA VIVIENDAS TURÍSTICAS 8754041
HECTOR JAIME MARIN VIVIENDAS TURÍSTICAS 8873920
GILBERTO ANDRES GIL HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES 8402624
JOHNY FLAVIO JIMENEZ VIVIENDAS TURÍSTICAS 8743153
CARLOS GIRALDO HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES 8402532
MARIA ZENAIDA RIVERA HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES 3522753

BIBLIOGRAFÍA

- Ayerbe-Quiñones, F. (2018). Guía ilustrada de la avifauna colombiana. Wildlife Conservation Society, Bogotá, Colombia
- Casas, C., Teske, U., Botero, J. E., & de Ornitología, S. C. Aviturismo en Caldas.
- Chaparro-Herrera, S., Echeverry-Galvis, M. Á., Córdoba-Córdoba, S., & Sua-Becerra, A. (2013). Listado actualizado de las aves endémicas y casi-endémicas de Colombia. Biota colombiana, 14(2)
- Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, S. M. Billerman, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. (2019). The eBird/Clements Checklist of Birds of the World: v2019. Descargado de <https://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/download/>
- Etter, A. y Van wyngaarden, W., (2000). Patterns of Landscape Transformation in Colombia, with Emphasis in the Andean Region. AMBIO: A Journal of the Human Environment, 29(7): 432.
- IUCN, (2019). IUCN Red List of Threatened species. Versión 2019-2. Recuperado de www.iucnredlist.org
- León, R. Á. Y González, JV (2017). Observaciones sobre la distribución y ecología del pato de los torrentes *Merganetta armata* Gould, 1842 (Aves: Anatidae) en Colombia. Revista Comunicaciones Científicas y Técnicas, 2 (1), 98-104.
- Newton, I. (2003). Speciation and biogeography of birds. Academic Press.
- Ocampo, D. (2018). Estado actual del conocimiento de las aves en Caldas. Sociedad Caldense de Ornitología. Caldas, Colombia.
- Restrepo-Cardona, J. S., Betancur López, A., & Cano Castaño, N. (2015). Abundancia y nuevos registros de búhos simpátricos en Manizales y Villamaría (Caldas, Colombia). Boletín Científico. Centro de Museos. Museo de Historia Natural, 19(2), 220-229
- Salaman, P., Bayly, N., Burridge, R., Grantham, M., Gurney, M., Quevedo, A. y Donegan, T. (2008). Diecisésis especies de aves nuevas para Colombia. Conservación Colombiana , 5 , 80-85.
- Villarreal, H., (2006). Ecosistemas terrestres naturales: 43-66 (en) Chávez, M.E. & Santamaría, M. (eds.) Informe sobre el avance en el conocimiento y la información de la biodiversidad 1998-2004. Tomo II. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá.

Villamaría,
mucho por
descubrir



