



## QCM THLR 2

Nom et prénom, lisibles :

DEVILLE Vincent A2

Identifiant (de haut en bas) :

☐0 ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9  
☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9  
☐0 ☒1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9  
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☒8 ☐9  
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☒8 ☐9

**Q.1** Ne rien écrire sur les bords de la feuille, ni dans les éventuels cadres grisés « ». Noircir les cases plutôt que cocher. Renseigner les champs d'identité. Les questions marquées par « » peuvent avoir plusieurs réponses justes. Toutes les autres n'en ont qu'une; si plusieurs réponses sont valides, sélectionner la plus restrictive (par exemple s'il est demandé si 0 est nul, non nul, positif, ou négatif, cocher nul). Il n'est pas possible de corriger une erreur, mais vous pouvez utiliser un crayon. Les réponses justes créditent; les incorrectes pénalisent; les blanches et réponses multiples valent 0.

J'ai lu les instructions et mon sujet est complet: les 1 entêtes sont +13/1/xx+...+13/1/xx+.

**Q.2** Pour toute expression rationnelle  $e$ , on a  $\varepsilon e \equiv e\varepsilon \equiv e$ .

☐  $L(e) \supseteq L(f)$     ☐  $L(e) \not\subseteq L(f)$   
☒  $L(e) = L(f)$     ☐  $L(e) \subseteq L(f)$

**Q.3** Pour toutes expressions rationnelles  $e, f$ , on a  $e + f \equiv f + e$ .

☐ faux    ☒ vrai

**Q.8** Soit  $\Sigma$  un alphabet. Pour tout  $a \in \Sigma$ ,  $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ , on a  $L_1^* = L_2^* \implies L_1 = L_2$ .

☐ vrai    ☒ faux

**Q.4** À quoi est équivalent  $\varepsilon^*$ ?

☐  $\emptyset$     ☐  $\Sigma^*$     ☒  $\varepsilon$

**Q.9** L'expression Perl  $'[-+]?[0-9A-F]+([+/*] [-+]?[0-9A-F]+)^*$  n'engendre pas :

☐  $'-42'$     ☐  $'42+42'$     ☒  $'42+(42*42)'$   
☐  $'-42-42'$

**Q.5** Pour toutes expressions rationnelles  $e, f$ , on a  $(ef)^*e \equiv e(fe)^*$ .

☒ vrai    ☐ faux

**Q.6** Pour  $e = (a + b)^*$ ,  $f = a^*b^*$  :

☐  $L(e) \not\subseteq L(f)$     ☒  $L(e) \supseteq L(f)$   
☐  $L(e) = L(f)$     ☐  $L(e) \subseteq L(f)$

**Q.10** Soit  $A, L, M$  trois langages. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont suffisantes pour garantir  $L = M$ ?

☐  $AL = AM$     ☐  $\forall n > 1, L^n = M^n$   
☒  $\{a\} \cdot L = \{a\} \cdot M$   
☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Q.7** Pour  $e = (a + b)^* + \varepsilon$ ,  $f = (a^*b^*)^*$  :

Fin de l'épreuve.