



+111/1/9+

## QCM THLR 2

Nom et prénom, lisibles :

LOYAU  
Nicolas

Identifiant (de haut en bas) :

☐0 ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9  
☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9  
☐0 ☒1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9  
☐0 ☒1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9  
☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

**Q.1** Ne rien écrire sur les bords de la feuille, ni dans les éventuels cadres grisés « ». Noircir les cases plutôt que cocher. Renseigner les champs d'identité. Les questions marquées par « » peuvent avoir plusieurs réponses justes. Toutes les autres n'en ont qu'une; si plusieurs réponses sont valides, sélectionner la plus restrictive (par exemple s'il est demandé si 0 est nul, non nul, positif, ou négatif, cocher nul). Il n'est pas possible de corriger une erreur, mais vous pouvez utiliser un crayon. Les réponses justes créditent; les incorrectes pénalisent; les blanches et réponses multiples valent 0.

J'ai lu les instructions et mon sujet est complet: les 1 entêtes sont +111/1/xx+...+111/1/xx+.

**Q.2** Pour toute expression rationnelle  $e$ , on a  $\emptyset + e \equiv e + \emptyset \equiv \emptyset$ .

☒ faux ☒ vrai

**Q.3** Pour toute expression rationnelle  $e$ , on a  $\varepsilon e \equiv e$ .

☐ faux ☒ vrai

**Q.4** Il est possible de tester si une expression rationnelle engendre un langage vide.

☐ Souvent vrai ☐ Souvent faux  
☐ Toujours faux ☒ Toujours vrai

**Q.5** Pour toutes expressions rationnelles  $e, f$ , on a  $(e + f)^* \equiv (e^* f^*)^*$ .

☐ faux ☒ vrai

**Q.6** Pour  $e = (ab)^*$ ,  $f = a^* b^*$  :

☐  $L(e) = L(f)$  ☒  $L(e) \not\subseteq L(f)$   
☒  $L(e) \subseteq L(f)$  ☐  $L(e) \supseteq L(f)$

**Q.7** L'expression Perl '[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]\*' n'engendre pas :

☒ '\_STDC\_' ☐ 'main'  
☐ 'eval\_expr' ☐ 'exit\_42'

**Q.8** Soit  $\Sigma$  un alphabet. Pour tout  $A, L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ , on a  $A \cdot L_1 = A \cdot L_2 \implies L_1 = L_2$ .

☒ faux ☐ vrai

**Q.9** L'expression Perl '[+]?[0-9]+(,[0-9]+)?(e[+]?[0-9]+)' n'engendre pas :

☐ '42,42e42' ☐ '42e42'  
☐ '42,4e42' ☒ '42,e42'

**Q.10** Soit  $A, L, M$  trois langages. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont suffisantes pour garantir  $L = M$ ?

☒  $\{a\} \cdot L = \{a\} \cdot M$  ☐  $AL = AM$   
☒  $\forall n > 1, L^n = M^n$   
☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Fin de l'épreuve.