ALGO QCM

- 1. Quels éléments composent la signature d'un type abstrait?
 - (a) Les TYPES
 - (b) Les OPERATIONS
 - (c) Les PRECONDITIONS
 - (d) Les variables AVEC
- 2. Pour la déclaration

TYPES du, avec UTILISE beurre, les, croissants

l'opération et : du x beurre x avec x les -> croissants est?

- (a) Un observateur
- (b) Une opération interne
- (c) Une opération externe
- (d) Un observeur
- 3. Quels problèmes se posent lors de la conception d'un type algébrique abstrait?
 - (a) Complétude
 - (b) Conséquence
 - (c) Consistance
 - (d) Complémentation
- 4. Une opération qui n'est pas définie partout est?
 - (a) Une opération ponctuelle
 - (b) Une opération auxiliaire
 - (c) Une opération partielle
 - (d) Une précondition
- 5. Pour la déclaration

TYPES vrai UTILISE mais, incroyable

l'opération c'est : incroyable x mais -> vrai est?

- (a) Un observateur
- (b) Une opération interne
- (c) Une opération externe
- (d) Un observeur

- 6. Les éléments qui ne composent pas la signature d'un type abstrait sont?
 - (a) Les TYPES
 - (b) Les OPERATIONS
- Les AXIOMES
- (1) Les PRECONDITIONS
- 7. Les TYPES servent à préciser?
 - (a) Les types définis
 - (b) Les types prédéfinis
- 8. Un type algébrique abstrait est composé?
 - (a) d'une signature ou d'un système d'axiomes
 - (b) d'une signature et d'un système d'axiomes
- 9. Les AXIOMES?
 - (a) permettent de déduire une valeur pour toute application des observateurs aux opérations internes
 - (b) permettent de déduire une valeur pour toute application d'une opération interne aux observateurs
- 10. Les PRECONDITIONS servent à préciser le domaine de définition?
 - (a) Des opérations ponctuelles
 - (b) Des opérations auxiliaires
 - (c) Des opérations partielles





QCM N°8

lundi 15 octobre 2018

Question 11

Soient A et B deux événements indépendants quelconques. Alors

a.
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$b P(A \cup B) = P(A)P(B)$$

c.
$$P(A \cap B) = P(A) + P(B)$$

$$\underbrace{\operatorname{d.}P(A\cap B)} = P(A)P(B)$$


e.
$$P(A \cap B) = P(A \cup B)$$

Question 12

On lance un dé. On note A et B les événements suivants :

A: « on obtient un numéro pair » et B: « on obtient un multiple de 4 ». Alors

a. A et B sont incompatibles



c. A et B sont indépendants



Question 13

Soit X une variable aléatoire discrète quelconque à valeurs dans $\{0,...,n\}$. Alors

a.
$$E(X^2) = \sum_{k=0} k^2 P(X^2 = k)$$

$$\widehat{\text{b}} E(X^2) = \sum_{k=0}^n k^2 P(X=k)$$

c.
$$E(X^2) = \sum_{k=0} k^2 [P(X=k)]^2$$

$$E(X^2) = \left(\sum_{k=0}^n kP(X=k)\right)^2$$

Question 14

On suppose que si on choisit au hasard un individu dans la population française, la probabilité que cette personne soit gauchère est 0,10. On observe un groupe de 256 étudiants de l'EPITA. On note N la variable aléatoire égale au nombre de gauchers dans cette échantillon. Alors

a.
$$P(N=200) = C_{200}^{266}(0,10)^{256}(1-0,10)^{56}$$

b.
$$P(N = 200) = C_{256}^{200}(0, 10)^{256}(1 - 0, 10)^{56}$$

c.
$$P(N = 200) = C_{200}^{200}(0, 10)^{200}(1 - 0, 10)^{56}$$

d.
$$P(N = 200) = C_{256}^{200}(0, 10)^{200}(1 - 0, 10)^{56}$$

e. rien de ce qui précède

Question 15

Soit (u_n) une suite réelle. Alors (u_n) est majorée si

a.
$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists M \in \mathbb{R} \text{ tel que } u_n \leqslant M$$

b.
$$\exists M \in \mathbb{R}$$
 tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leqslant M$

c. rien de ce qui précède

Question 16

Soit $(n,p) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n \geqslant p$. Alors C_n^p est égal à

a.
$$\frac{n!}{(n-p)!}$$

$$n(n-1)(n-2)\dots(n-p+1)$$

$$p!$$

$$\begin{array}{c}
c. \quad p! \\
\hline
(d.) \quad n!
\end{array}$$

rien de ce qui précède

Question 17

Soit $(n, m) \in \mathbb{N}^2$. Alors

(a.)
$$(2n)! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times (2n)$$

$$(2n)! = 2 \times n!$$

$$\underbrace{n!}_{n!} = 2!$$

$$d(n+m)! = n! + m!$$

e. rien de ce qui précède

Question 18

Soient A un événement et (B_1, B_2, B_3) un système complet d'événements tel que pour tout $i \in [1, 3], P(B_i) \neq 0$. Alors

$$(A) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + P(A \cap B_3)$$

$$(b) P(A) = P(A \mid B_1)P(B_1) + P(A \mid B_2)P(B_2) + P(A \mid B_3)P(B_3)$$

$$P(A) = P(A \cup B_1)P(B_1) + P(A \cup B_2)P(B_2) + P(A \cup B_3)P(B_3)$$

$$P(A \cup B_1) + P(A \cup B_2) + P(A \cup B_3)$$

e.
$$P(A) = P(A \cap B_1)P(B_1) + P(A \cap B_2)P(B_2) + P(A \cap B_3)P(B_3)$$

Question 19

Soit $f: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ définie pour tout $x \in \mathbb{Z}$ par f(x) = x + 3. Alors

- a. f est injective
- b. f n'est pas injective
- c. f est surjective
- d. f n'est pas surjective

Question 20

Soit $I = \int_0^1 \ln \left(1 + x^2\right) \mathrm{d}x$. Alors, la formule d'intégration par parties donne

a.
$$f(2) - \int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} \, \mathrm{d}x$$

b.
$$I = \ln(2) + \int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} dx$$

$$(c.) = \ln(2) - \int_0^1 \frac{2x^2}{1+x^2} dx$$

d.
$$I = \ln(2) + \int_0^1 \frac{2x^2}{1+x^2} dx$$

e. rien de ce qui précède

QCM Azar Chap 1 (Overview tenses WB prac1-6) Choose the appropriate response.

21. What do you do every day before you come to class?

a. I have eaten breakfast.
B leat breakfast.
c. I am eating breakfast.
d. I've taken the bus.

	What did you do last night? a I studied for a while and called my parents. b. I have eaten dinner. I was watching TV. d. I had gone out with some friends. What is the boss doing right now? He's been checking the most recent sales figures. B He's having his hair cut.	
	c. He trains the new sales manager. A and B.	
24.	Where were you at this exact time yesterday? a. At a bookstore. I was looking for the books I needed to buy for this class b. At a café. I read the book I bought for this class. c. At a diner. I was having lunch. d. A and C.	s.
25.	How many questions has the teacher asked since she began this exercise? a. I think she asked 5 questions since we began this exercise. b. I think I was asked 5 questions since we began this exercise. c. I think she has asked 5 questions since we began this exercise. d. I think she had asked 5 questions since we began this exercise.	
26.	 a. There are sharks in the water. They swim near the shore. b. There are sharks in the water. They have swum near the shore. c. There are sharks in the water. They swam near the shore. d. There are sharks in the water. They are swimming near the shore. 	
27.	Rupsha, hello! I of you just a minute ago when the phone rang. a. have been thinking b. was thinking c. thought am thinking	
28.	John doesn't want to go to Disneyland because he all those rides twice. _a. has already done _b. had already done _c. already did _d: A and B.	
29.	Johan is watching the movie. It started 5 minutes ago so a. Johan has watched the movie for five minutes. b. Johan has been watched the movie for five minutes. c. Johan has been watching the movie for five minutes. x d. A and C.	
30.	"We have been practicing our presentation all night." This sentence means a. We are still practicing our presentation. b. We practiced our presentation until a little while ago. c. We have stopped practicing our presentation. d. We want to stop practicing our presentation now.	


The following questions are about the last six videos of Unit 1 of the MOOC "Public Speaking" $\,$

31.	you shoul a. b. c.	paring a speech, whether you already have substantial experience on the subject or have to do additional research, d (check all that apply) trust your knowledge. analyze your subject. improvise your content.
		None of the above
32.		naterial used in a talk can be: (check all that apply)
		quotes statistics
		testimonies
	(d.)	All of the above
33.		p examples would lead to: (check all that apply)
ř		a bad grade accusation of plagiarism
		a loss of credibility from fellow students
	d.	All of the above
34.	When the professor says: "You want to make sure that the information is sound", the word "sound" implies:	
		approximate theoretical
		accurate
	d.	Believable
35.	The differ	rent types of plagiarism are (check all that apply)
	(a.)	global incremental
	8	patchwork
	d.	A and C
36.		g to professor Jenkins, the ultimate goal of a persuasive speech is
		identifying a need visualizing results
	c.	getting the attention of the audience
25		None of the above
37.	Jenkins' e	example of using a poem in his communication class corresponds to what part of the BomberB format?
	а.	bridge
	b.	opening bang /
	d.	message
38.		g to the lecture, humor can be used in a speech on the condition that it is
		appropriate for the subject.
		understood by everyone in the audience. funny.
		not used in the main part of the talk.
39.	The profe	essor says that when a speaker concludes an informative speech, it is essential to
		summarize the main points.
		use humor well. challenge the audience's knowledge.
		test the audience with some questions.
40.	In the pro	ocess of outlining a speech, the term "parallelism" refers to
	a.	making sure the speaker covers both sides of an issue (arguments for, arguments against).
	a. X (c.)	making sure the speaker covers both sides of an issue (arguments for, arguments against). dividing the talk into an equal number of points. making sure the speaker balances the various parts of the speech with an equal amount of time given to each.

EPITA-S₁ 2018/2019

Q.C.M n°2 de Physique

41- Les composantes du vecteur force \vec{F}_1 sur le schéma ci-dessous sont :



a)
$$\vec{F}_1 = \begin{pmatrix} -F_1 \cos(\alpha) \\ F_1 \sin(\alpha) \end{pmatrix}$$
 c) $\vec{F}_1 = \begin{pmatrix} -F_1 \sin(\alpha) \\ F_1 \cos(\alpha) \end{pmatrix}$
b) $\vec{F}_1 = \begin{pmatrix} F_1 \cos(\alpha) \\ F_2 \sin(\alpha) \end{pmatrix}$ d) $\vec{F}_1 = \begin{pmatrix} F_1 \cos(\alpha) \\ F_2 \sin(\alpha) \end{pmatrix}$

42- Les composantes de la force \vec{F}_2 représentée sur le schéma de la question 41 sont :

a)
$$\vec{F}_2 = \begin{pmatrix} F_2 \\ 0 \end{pmatrix}$$
 b) $\vec{F}_2 = \begin{pmatrix} -F_2 \\ 0 \end{pmatrix}$ c) $\vec{F}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -F_2 \end{pmatrix}$ d) $\vec{F}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ F_2 \end{pmatrix}$

43- La norme de la résultante \vec{R} de deux vecteurs forces $\vec{F_1}$ et $\vec{F_2}$ non nuls, colinéaires et de sens opposé est

sens oppose est
a)
$$R = 0$$
 (b) $R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$ (c) $R = F_1 + F_2$ (d) $R = |F_1 - F_2|$

44- La dérivée par rapport à la variable t de la fonction $f(\theta(t)) = K(\theta(t))^2$, K étant une constante, est

a)
$$\frac{df}{dt} = 2K \theta(t)$$
. $\theta(t)$

(b)
$$\frac{\partial f}{\partial t} = 2K \theta(t)$$
). $\dot{\theta}(t)$

c)
$$\frac{df}{dt} = \frac{K}{2} \theta(t) \cdot \dot{\theta}(t)$$

45- La dérivée par rapport à la variable t de la fonction $f(\dot{\theta}(t)) = \cos(a.\dot{\theta}(t))$, a étant une constante, est :

a)
$$\frac{df}{dt} = \frac{1}{a} sin(a \dot{\theta}(t)) \cdot \dot{\theta}(t)$$

b) $\frac{df}{dt} = -a sin(a \dot{\theta}(t)) \cdot \dot{\theta}(t)$
c) $\frac{df}{dt} = -a sin(a \dot{\theta}(t)) \cdot \dot{\theta}(t)$

46- Le vecteur position en coordonnées polaires s'écrit :

a)
$$O\vec{M} = \rho \vec{u}_{\rho} + \rho \theta \vec{u}_{\theta}$$
 b) $O\vec{M} = \rho . \vec{u}_{\rho} + \theta . \vec{u}_{\theta}$ c) $O\vec{M} = \rho . \vec{u}_{\rho}$

47- Le vecteur unitaire \vec{u}_{θ} des coordonnées cylindriques vérifie

a)
$$\frac{d\vec{u}_{\theta}}{dt} = \dot{\theta} \vec{u}_{\rho}$$
 c) $\frac{d\vec{u}_{\theta}}{dt} = -\dot{\theta} \vec{u}_{\theta}$ b) $\frac{d\vec{u}_{\theta}}{dt} = -\dot{\theta} \vec{u}_{\rho}$ d) $\frac{d\vec{u}_{\theta}}{dt} = \vec{0}$

48- Le vecteur unitaire \vec{u}_{ρ} des coordonnées cylindriques vérifie :

(a)
$$\frac{d\vec{u}_{\rho}}{dt} = \dot{\theta} \vec{u}_{\theta}$$
 (c) $\frac{d\vec{u}_{\rho}}{dt} = \vec{0}$ (d) $\frac{d\vec{u}_{\rho}}{dt} = -\dot{\theta} \vec{u}_{\theta}$ (e) $\frac{d\vec{u}_{\rho}}{dt} = -\dot{\theta} \vec{u}_{\theta}$

49- Le vecteur vitesse en coordonnées cylindriques s'écrit :

a)
$$\vec{V} = \dot{\rho}\vec{u}_{\rho} + \dot{z}\vec{u}_{z}$$
 b) $\vec{V} = \dot{\rho}\vec{u}_{\rho} + \rho\dot{\theta}\vec{u}_{\theta} + \dot{z}\vec{u}_{z}$ c) $\vec{V} = \dot{\rho}\vec{u}_{\rho} + \dot{\theta}\vec{u}_{\theta} + \dot{z}\vec{u}_{z}$

50- Le vecteur vitesse d'un mouvement d'uations horaires : $O\vec{M}\begin{pmatrix} x(t) = -2t^3 - t \\ y(t) = 4t^2 \end{pmatrix}$

s'écrit:

a)
$$\vec{V} = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) = -6t^{-1} \\ \dot{y}(t) = 8t \end{pmatrix}$$
 b) $\vec{V} = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) = -6t^2 - 1 \\ \dot{y}(t) = -8t \end{pmatrix}$ c) $\vec{V} = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) = -6t^2 - 1 \\ \dot{y}(t) = 8t \end{pmatrix}$

QCM Electronique – InfoS1


Pensez à bien lire les questions ET les réponses proposées


Q1. L'intensité du courant qui entre dans un dipôle passif est supérieure à l'intensité de celui qui en ressort.


a- VRAI


b- FAUX

Q2. Quelles caractéristiques sont associées à un dipôle passif?









Q3. Si deux dipôles sont soumis à la même tension, on dit qu'ils sont :

a. En série

b. En parallèle


Q4. Soit le circuit ci-contre. Si $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = R$, quelle est l'expression de la résistance équivalente vue par E?

a- 6*R*

 $(c-)^{\frac{12}{7}.R}$

b- $\frac{7}{13}$. R

 $d - \frac{7}{12.R}$




Q5. Quelle est la résistance vue entre A et B?

b. 16*R*


c. $\frac{3}{5}$. R

d. $\frac{2}{5}R$




2

Q6. On considère le schéma suivant :



Le dipôle est un dipôle générateur si I_{AB} et U_{AB} sont de signes opposés


- b- Le dipôle est un dipôle générateur si I_{AB} et U_{AB} sont de même signe
- Le dipôle est un dipôle récepteur si I_{AB} et U_{AB} sont de même signe
- Le fléchage courant/tension correspond à la convention récepteur.
- Q7. Soit le circuit ci-contre. Quelle est l'égalité correcte ?



Q8. Dans le circuit ci-contre, que vaut U?



- Q9. Un interrupteur ouvert a:
 - a- un courant infini qui le traverse
 - b- une tension nulle à ses bornes
- c- une tension infinie à ses bornes
- d-Aucune de ces réponses —
- **Q10.** Quelle est la formule forcément fausse ? (E_i et U en Volts, I_i en Ampères, R_i en Ohms)



c.
$$U = \frac{R_1.E_1 - R_2.I_2}{R_1.R_2 + R_1.R_3 + R_2.R_3}$$

$$d. U = \frac{E}{\frac{R_1}{R_2} + \frac{R_3}{R_4} + 1}$$

QCM 2

Architecture des ordinateurs

Lundi 15 octobre 2018


- 11. Quel est le rang du chiffre 3 dans le nombre suivant : 4975827312₁₀ ?
 - A. 3
 - B. 100
 - C. 300
 - D. 2
- 12. Quel est le résultat de la soustraction suivante : $2000_{17} 1_{17}$?
 - A. 1GGG₁₇
 - B. 1FFF₁₇
 - C. 1666₁₇
 - D. 1999₁₇
- 13. Quel est le résultat de l'addition suivante : 999₁₆ + 1₁₆ ?
 - A. $99A_{16}$
 - B. 1000₁₆
 - C. AAA₁₆
 - D: 999,6₁₆
- 14. Quel nombre est égal à 2¹⁶?
 - (A) $2^{17} 2^{16}$
 - B. 32768₁₀

 - (D.) 200000₁₆
- 15. Choisir la réponse correcte :
 - $(A.) 111111111_2 = 255_{10}$
 - $B = 110000_2 = 50_{10}$
 - $1101011_2 = 106_{10}$
 - $D. 1001000_2 = 74_{10}$

- 16. Pour convertir la partie entière d'un nombre en base 10 vers une autre base :
 - A. On utilise la méthode des multiplications successives.
 - B. On utilise la méthode des divisions successives.
 - On multiplie chaque chiffre par son poids.
 - D. On divise chaque chiffre par son poids.
- 17. En supposant que $110_b = 14_{16}$, quelle est la valeur de la base b?




- D. Impossible
- 18. Quel nombre est égal à 2⁻⁴?



D. 0,0078125

19. Quel nombre est égal à 999,9916?



D: 4631,461₈

20. Quel nombre est égal à 127,25₁₀?